

**Tabella 1** - Persone di 6-64 anni con disabilità che vivono in famiglia (valori assoluti in migliaia, tassi specifici per 100 persone della stessa età e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e classe di età - Anni 2004-2005

Regioni	Classi d'età					
	6-24		25-64		6-64	
	N	Tassi	N	Tassi	N	Tassi
Piemonte	3.547	0,5 (0,1-0,9)	30.179	1,2 (0,9-1,6)	33.726	1,1 (0,8-1,3)
Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste	*	*	622	0,9 (0,3-1,5)	788	0,9 (0,4-1,4)
Lombardia	17.042	1,1 (0,6-1,6)	54.299	1,0 (0,7-1,3)	71.341	1,0 (0,8-1,2)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>790</i>	<i>0,8 (0,0-1,6)</i>	<i>1.034</i>	<i>0,4 (0,1-0,7)</i>	<i>1.824</i>	<i>0,5 (0,2-0,8)</i>
<i>Trento</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>1.430</i>	<i>0,5 (0,0-1,0)</i>	<i>1.609</i>	<i>0,4 (0,1-0,8)</i>
Veneto	6.993	0,9 (0,4-1,3)	25.757	1,0 (0,7-1,2)	32.750	0,9 (0,7-1,2)
Friuli-Venezia Giulia	1.864	1,0 (0,1-1,9)	8.335	1,2 (0,7-1,7)	10.200	1,2 (0,8-1,6)
Liguria	3.199	1,4 (0,4-2,5)	5.808	0,7 (0,3-1,0)	9.007	0,8 (0,5-1,2)
Emilia-Romagna	4.490	0,7 (0,2-1,2)	20.613	0,9 (0,6-1,2)	25.103	0,8 (0,6-1,1)
Toscana	5.920	1,1 (0,4-1,7)	24.273	1,2 (0,9-1,6)	30.193	1,2 (0,9-1,5)
Umbria	1.305	0,9 (0,0-1,8)	6.397	1,4 (0,8-1,9)	7.702	1,3 (0,8-1,7)
Marche	819	*	9.163	1,1 (0,7-1,5)	9.983	0,9 (0,6-1,2)
Lazio	10.744	1,1 (0,5-1,7)	38.728	1,3 (0,9-1,7)	49.472	1,2 (0,9-1,6)
Abruzzo	2.778	1,1 (0,4-1,8)	8.831	1,3 (0,8-1,7)	11.609	1,2 (0,8-1,6)
Molise	625	1,0 (0,1-1,8)	1.660	1,0 (0,4-1,5)	2.285	1,0 (0,5-1,4)
Campania	28.847	2,0 (1,5-2,6)	53.311	1,7 (1,4-2,1)	82.158	1,8 (1,5-2,1)
Puglia	7.903	0,9 (0,4-1,3)	38.882	1,8 (1,4-2,2)	46.785	1,5 (1,2-1,8)
Basilicata	1.717	1,3 (0,4-2,2)	5.028	1,6 (1,0-2,2)	6.745	1,5 (1,0-2,0)
Calabria	5.322	1,1 (0,5-1,8)	17.642	1,7 (1,1-2,2)	22.964	1,5 (1,1-1,9)
Sicilia	9.997	0,9 (0,4-1,3)	46.232	1,7 (1,3-2,2)	56.229	1,5 (1,2-1,8)
Sardegna	2.199	0,7 (0,2-1,2)	14.814	1,6 (1,1-2,0)	17.013	1,3 (1,0-1,7)
<b>Italia</b>	<b>116.447</b>	<b>1,1 (0,9-1,2)</b>	<b>413.038</b>	<b>1,3 (1,2-1,4)</b>	<b>529.485</b>	<b>1,2 (1,1-1,3)</b>

\*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 2** - *Persone di 6-64 anni che vivono in famiglia e che dichiarano di percepire il loro stato di salute male o molto male (tassi grezzi per 100 persone e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e presenza di disabilità - Anni 2004-2005*

<b>Regioni</b>	<b>Persone con disabilità</b>	<b>Persone senza disabilità</b>
Piemonte	35,0 (19,7-50,3)	2,1 (1,7-2,5)
Valle d'Aosta- Vallée d'Aoste	*	2,9 (2,0-3,8)
Lombardia	24,5 (13,3-35,7)	1,5 (1,3-1,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	*	1,1 (0,6-1,6)
<i>Trento</i>	*	2,3 (1,5-3,1)
Veneto	29,7 (15,5-44,0)	1,6 (1,3-1,9)
Friuli-Venezia Giulia	47,3 (22,7-71,9)	1,8 (1,3-2,3)
Liguria	45,1 (15,4-74,7)	2,2 (1,6-2,7)
Emilia-Romagna	45,2 (25,4-65,1)	2,1 (1,7-2,4)
Toscana	46,8 (28,8-64,8)	2,8 (2,3-3,3)
Umbria	37,9 (14,6-61,2)	2,8 (2,1-3,4)
Marche	54,5 (26,9-82,2)	2,5 (2,0-3,1)
Lazio	44,6 (27,7-61,6)	2,4 (2,0-2,8)
Abruzzo	37,9 (18,4-57,3)	2,0 (1,5-2,5)
Molise	45,2 (13,3-77,1)	2,0 (1,3-2,7)
Campania	31,6 (22,2-41,0)	2,1 (1,8-2,4)
Puglia	44,1 (30,7-57,5)	1,7 (1,4-2,0)
Basilicata	32,5 (12,8-52,1)	2,3 (1,7-3,0)
Calabria	51,2 (31,9-70,5)	3,0 (2,4-3,6)
Sicilia	55,3 (38,8-71,8)	2,9 (2,4-3,4)
Sardegna	55,9 (35,7-76,2)	3,1 (2,6-3,7)
<b>Italia</b>	<b>40,0 (35,8-44,2)</b>	<b>2,1 (2,0-2,3)</b>

\*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

**Fonte dei dati ed anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 3** - *Tassi di occupazione (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) delle persone di 15-64 anni per ripartizione geografica, sesso e presenza di disabilità - Anni 2004/2005*

<b>Ripartizione geografica</b>	<b>Maschi</b>		<b>Femmine</b>		<b>Totale</b>	
	<b>Disabili</b>	<b>Non Disabili</b>	<b>Disabili</b>	<b>Non Disabili</b>	<b>Disabili</b>	<b>Non Disabili</b>
Nord-Ovest	31,7 (19,7-43,7)	76,6 (75,6-77,6)	16,5 (7,9-25,2)	55,3 (54,1-56,5)	23,3 (16,0-30,7)	66,1 (65,3-66,9)
Nord-Est	33,9 (22,4-45,4)	77,3 (76,4-78,3)	12,7 (4,1-21,3)	58,0 (56,9-59,1)	23,8 (16,4-31,3)	67,8 (67,1-68,5)
Centro	24,1 (14,1-34,1)	74,5 (73,4-75,6)	20,3 (9,6-31,1)	52,4 (51,2-53,7)	22,5 (15,2-29,7)	63,3 (62,5-64,2)
Sud	18,4 (12,0-24,8)	65,5 (64,6-66,5)	6,9 (2,9-10,9)	32,2 (31,2-33,1)	12,4 (8,7-16,2)	48,7 (48,0-49,4)
Isole	11,0 (2,5-19,5)	64,6 (63,0-66,3)	*	32,2 (30,6-33,7)	7,3 (2,6-12,0)	48,2 (47,1-49,4)
<b>Italia</b>	<b>23,7 (19,1-28,2)</b>	<b>72,3 (71,9-72,8)</b>	<b>11,7 (8,3-15,0)</b>	<b>46,9 (46,4-47,5)</b>	<b>17,5 (14,7-20,3)</b>	<b>59,6 (59,3-60,0)</b>

\*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.