

**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per regione - Anno 2006**

Regioni	Fumatori %	Ex-Fumatori %	Non Fumatori %	Fumatori di sigarette %	Numero medio sigarette al giorno
Piemonte	22,2 (20,9-23,5)*	23,2 (21,9-24,4)	52,8 (51,4-54,3)	96,9 (95,8-98,1)	13,0 (12,8-13,2)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	19,4 (17,4-21,3)	21,8 (19,7-23,8)	56,4 (54,1-58,8)*	97,1 (95,2-99,1)	14,3 (13,9-14,6)
Lombardia	22,3 (21,1-23,6)	25,1 (23,7-26,4)*	51,0 (49,5-52,5)	98,0 (97,1-98,9)	12,1 (11,9-12,3)
Trentino-Alto Adige	19,5 (18,2-20,8)*	23,1 (21,8-24,5)	54,0 (52,5-55,5)	96,7 (95,3-98,1)	12,0 (11,8-12,2)
Bolzano-Bozen	19,8 (18,1-21,5)*	24,0 (22,2-25,8)	54,1 (52,1-56,1)	96,5 (94,7-98,4)	12,4 (12,2-12,7)
Trento	19,2 (17,4-21,1)*	22,3 (20,4-24,2)	53,8 (51,7-56,0)	96,9 (94,9-98,8)	11,6 (11,3-11,9)
Veneto	20,0 (18,7-21,4)*	25,3 (23,9-26,8)*	53,0 (51,4-54,6)	97,6 (96,4-98,8)	11,3 (11,1-11,5)
Friuli-Venezia Giulia	21,2 (19,5-22,8)	24,2 (22,4-25,9)	49,8 (47,8-51,7)*	99,1 (98,2-100,0)*	13,2 (12,9-13,4)
Liguria	19,5 (17,9-21,1)*	23,8 (22,0-25,5)	55,9 (54,0-57,8)*	98,0 (96,6-99,3)	13,8 (13,5-14,1)
Emilia-Romagna	23,9 (22,4-25,3)	25,5 (24,0-27,0)*	49,5 (47,8-51,1)*	97,5 (96,4-98,7)	12,6 (12,4-12,8)
Toscana	22,6 (21,3-23,9)	25,2 (23,8-26,6)*	50,8 (49,3-52,4)	97,3 (96,2-98,5)	13,8 (13,6-14,0)
Umbria	22,9 (21,1-24,7)	25,7 (23,8-27,5)*	49,8 (47,8-51,8)*	97,6 (96,1-99,0)	13,2 (12,9-13,4)
Marche	20,9 (19,4-22,4)	26,2 (24,6-27,8)*	52,2 (50,5-53,9)	96,0 (94,4-97,7)	13,1 (12,9-13,3)
Lazio	25,7 (24,1-27,3)*	22,3 (20,8-23,9)	48,0 (46,3-49,8)*	97,7 (96,6-98,8)	14,2 (14,0-14,4)
Abruzzo	20,7 (19,0-22,5)	20,6 (18,9-22,4)	57,2 (55,1-59,2)*	96,1 (94,3-98,0)	13,6 (13,2-13,9)
Molise	19,1 (17,2-21,0)*	20,1 (18,1-22,0)*	59,8 (57,5-62,0)*	96,5 (94,5-98,6)	13,8 (13,5-14,1)
Campania	26,9 (25,4-28,3)*	19,3 (18,0-20,6)*	52,9 (51,3-54,5)	98,4 (97,6-99,2)	14,9 (14,7-15,1)
Puglia	20,0 (18,5-21,4)*	19,6 (18,2-21,1)*	58,4 (56,7-60,2)*	98,6 (97,6-99,6)	13,5 (13,3-13,8)
Basilicata	21,8 (20,0-23,6)	19,4 (17,7-21,1)	57,1 (55,1-59,1)*	99,3 (98,5-100,1)*	13,3 (13,1-13,6)
Calabria	18,7 (17,2-20,2)*	19,3 (17,8-20,9)*	59,5 (57,6-61,3)*	98,3 (97,1-99,5)	13,7 (13,4-14,0)
Sicilia	25,5 (24,0-27,0)*	18,5 (17,2-19,9)*	54,7 (53,0-56,3)	98,5 (97,7-99,3)	15,0 (14,8-15,2)
Sardegna	21,6 (20,0-23,1)	25,5 (23,8-27,2)*	50,0 (48,1-51,9)*	99,1 (98,3-99,9)*	14,6 (14,3-14,8)
<b>Italia</b>	<b>22,7 (22,3-23,1)</b>	<b>22,8 (22,4-23,2)</b>	<b>52,6 (52,1-53,1)</b>	<b>97,9 (97,6-98,2)</b>	<b>13,4 (13,4-13,5)</b>

\*Valori significativamente differenti rispetto alla media nazionale.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per classe di età, sesso e abitudine al fumo - Anno 2006**

Classi di età	Maschi			Femmine		
	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori
14-17	9,1 (6,6-11,6)	4,0 (2,2-5,8)	84,8 (82,1-87,6)	5,9 (3,7-8,0)	4,7 (2,7-6,6)	88,0 (85,4-90,5)
18-19	25,8 (20,5-31,1)	7,0 (3,6-10,4)	64,9 (59,4-70,4)	13,8 (9,3-18,3)	7,8 (4,2-11,5)	75,4 (70,3-80,6)
20-24	33,8 (30,5-37,1)	8,9 (6,7-11,0)	54,2 (50,8-57,6)	23,5 (20,4-26,6)	7,2 (5,2-9,3)	67,6 (64,4-70,9)
25-34	36,9 (35,0-38,9)	16,6 (15,0-18,1)	43,7 (41,7-45,6)	21,9 (20,2-23,7)	14,7 (13,2-16,2)	61,7 (59,7-63,6)
35-44	36,6 (34,9-38,3)	24,0 (22,5-25,6)	37,6 (35,9-39,3)	22,7 (21,1-24,2)	20,4 (19,0-21,9)	55,4 (53,7-57,2)
45-54	33,4 (31,4-35,3)	32,3 (30,4-34,3)	32,7 (30,7-34,7)	24,3 (22,5-26,2)	21,1 (19,4-22,8)	53,1 (51,0-55,1)
55-59	30,9 (28,0-33,8)	40,4 (37,4-43,4)	26,9 (24,1-29,7)	21,1 (18,6-23,5)	17,6 (15,2-19,9)	59,6 (56,8-62,4)
60-64	25,5 (22,4-28,5)	45,5 (42,1-48,8)	27,4 (24,3-30,4)	14,9 (12,3-17,5)	17,8 (15,1-20,6)	65,2 (62,0-68,4)
65-74	18,2 (16,2-20,1)	52,7 (50,3-55,1)	27,6 (25,4-29,9)	7,9 (6,6-9,2)	15,7 (14,0-17,4)	74,5 (72,6-76,4)
75 ed oltre	9,2 (7,2-11,1)	59,0 (56,1-61,9)	30,1 (27,3-33,0)	3,4 (2,4-4,3)	10,7 (9,2-12,2)	84,3 (82,7-85,9)
<b>Totale</b>	<b>28,8 (28,2-29,5)</b>	<b>30,5 (29,8-31,1)</b>	<b>38,7 (38,0-39,4)</b>	<b>17,0 (16,5-17,6)</b>	<b>15,7 (15,2-16,3)</b>	<b>65,5 (64,9-66,2)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 3 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione - Anni 2005-2006**

Regioni	2005				2006			
	Consumavano	Mai	Tot. non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Tot. non consumatori	Consumatori
Piemonte	1,6 (1,1-2,1)*	23,4 (22,1-24,8)*	25,0 (23,7-26,4)*	72,5 (71,1-73,9)*	1,8 (1,3-2,3)	25,6 (24,3-26,9)	27,4 (26,1-28,7)	70,8 (69,5-72,1)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,5 (0,8-2,2)	23,0 (21,0-25,0)	24,5 (22,4-26,6)	73,6 (71,6-75,7)
Lombardia	1,4 (1,0-1,9)	23,5 (22,2-24,8)	24,9 (23,6-26,3)	72,6 (71,3-73,9)	1,9 (1,5-2,4)	25,9 (24,6-27,2)	27,8 (26,5-29,1)	70,3 (69,0-71,7)
Trentino-Alto Adige	1,9 (1,4-2,4)	19,0 (17,9-20,1)	20,9 (19,8-22,1)	75,4 (74,2-76,5)	2,4 (1,8-3,0)	19,2 (17,9-20,4)	21,6 (20,3-22,9)	75,1 (73,8-76,4)
Bolzano-Bozen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,3 (1,6-3,1)	14,8 (13,3-16,4)	17,2 (15,6-18,8)	80,8 (79,3-82,3)
Trento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,5 (1,6-3,3)	23,3 (21,4-25,2)	25,8 (23,8-27,7)	69,7 (67,7-71,6)
Veneto	1,7 (1,2-2,2)	20,8 (19,4-22,1)	22,4 (21,1-23,8)	76,2 (74,8-77,5)	1,6 (1,1-2,1)	21,4 (20,1-22,8)	23,0 (21,7-24,4)	75,2 (73,9-76,6)
Friuli-Venezia Giulia	1,9 (1,2-2,6)	20,8 (19,2-22,5)	22,7 (21,0-24,4)	73,7 (72,0-75,4)	1,9 (1,3-2,6)	22,6 (20,9-24,3)	24,6 (22,8-26,3)	70,2 (68,4-71,9)
Liguria	2,1 (1,4-2,8)	26,9 (25,1-28,7)	29,0 (27,2-30,9)	69,8 (68,0-71,6)	1,3 (0,7-1,8)	28,3 (26,5-30,0)	29,5 (27,8-31,3)	69,4 (67,6-71,1)
Emilia-Romagna	1,6 (1,1-2,1)	22,9 (21,4-24,3)	24,4 (23,0-25,9)	74,2 (72,8-75,6)	1,8 (1,2-2,3)	20,7 (19,3-22,1)	22,4 (21,0-23,9)	76,1 (74,7-77,5)
Toscana	2,0 (1,4-2,5)	21,9 (20,3-23,4)	23,8 (22,3-25,4)	72,4 (70,8-74,0)	2,0 (1,5-2,6)	23,1 (21,8-24,4)	25,1 (23,8-26,5)	73,3 (71,9-74,6)
Umbria	1,1 (0,6-1,6)	27,5 (25,6-29,4)	28,6 (26,7-30,5)	70,3 (68,5-72,1)	1,2 (0,6-1,8)	25,6 (23,8-27,4)	26,8 (25,0-28,6)	71,7 (69,9-73,4)
Marche	1,3 (0,8-1,9)	24,3 (22,6-26,0)	25,6 (23,9-27,4)	72,3 (70,7-74,0)	1,0 (0,5-1,5)	24,7 (23,2-26,2)	25,7 (24,2-27,2)	73,5 (72,0-74,9)
Lazio	1,6 (1,0-2,1)	27,6 (26,0-29,2)	29,1 (27,5-30,7)	66,6 (65,0-68,3)	1,8 (1,3-2,4)	27,3 (25,8-28,9)	29,2 (27,6-30,8)	66,6 (65,0-68,2)
Abruzzo	1,5 (0,9-2,0)	29,2 (27,3-31,0)	30,6 (28,8-32,5)	68,1 (66,3-70,0)	1,1 (0,6-1,6)	33,2 (31,3-35,2)	34,4 (32,4-36,4)	64,2 (62,2-66,2)
Molise	1,5 (0,9-2,2)	32,3 (30,1-34,6)	33,9 (31,6-36,1)	64,7 (62,4-66,9)	2,0 (1,3-2,8)	31,7 (29,5-33,8)	33,7 (31,5-35,9)	64,9 (62,8-67,0)
Campania	1,8 (1,3-2,3)	31,3 (29,8-32,9)	33,1 (31,6-34,7)	65,3 (63,8-66,8)	2,0 (1,5-2,5)	34,4 (32,9-35,9)	36,4 (34,9-37,9)	62,1 (60,6-63,6)
Puglia	1,6 (1,1-2,1)	28,6 (27,0-30,2)	30,2 (28,6-31,8)	66,8 (65,2-68,5)	1,5 (1,0-2,0)	30,6 (29,0-32,2)	32,1 (30,5-33,8)	65,7 (64,1-67,3)
Basilicata	1,5 (0,9-2,1)	29,1 (26,9-31,2)	30,6 (28,4-32,8)	67,0 (64,8-69,2)	1,3 (0,7-1,8)	32,8 (30,9-34,8)	34,1 (32,2-36,1)	64,3 (62,4-66,3)
Calabria	1,5 (1,0-2,0)	29,1 (27,4-30,8)	30,6 (28,9-32,4)	66,6 (64,9-68,3)	2,4 (1,7-3,0)	30,9 (29,1-32,6)	33,2 (31,5-35,0)	64,2 (62,4-66,0)
Sicilia	1,4 (1,0-1,8)	35,8 (34,3-37,3)	37,2 (35,7-38,7)	61,2 (59,7-62,7)	1,9 (1,4-2,4)	39,8 (38,2-41,4)	41,6 (40,0-43,3)	56,9 (55,3-58,5)
Sardegna	2,0 (1,4-2,6)	30,5 (28,7-32,4)	32,5 (30,6-34,4)	64,0 (62,1-65,8)	1,8 (1,2-2,3)	30,4 (28,6-32,1)	32,1 (30,4-33,9)	64,4 (62,7-66,2)
<b>Italia</b>	<b>1,6 (1,5-1,8)</b>	<b>26,3 (25,9-26,7)</b>	<b>27,9 (27,5-28,4)</b>	<b>69,7 (69,3-70,1)</b>	<b>1,8 (1,6-1,9)</b>	<b>27,8 (27,4-28,2)</b>	<b>29,6 (29,2-30,0)</b>	<b>68,3 (67,9-68,7)</b>

n.d. = non disponibile.

\*Dato fornito per Piemonte e Valle d'Aosta accorpate.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 4 - Prevalenza di consumatori a rischio (criterio ISS) (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di 11-18 anni per regione e sesso - Anno 2006**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	18,1 (10,2-26,0)	13,0 (6,2-19,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	29,1 (15,2-43,0)	18,8 (6,3-31,3)
Lombardia	18,9 (11,9-26,0)	13,6 (7,3-20,0)
Trentino-Alto Adige	32,1 (24,1-40,2)	19,1 (11,3-26,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>39,3 (28,4-50,3)</i>	<i>27,1 (16,7-37,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>24,9 (13,6-36,2)</i>	*
Veneto	33,1 (23,3-43,0)	17,6 (9,1-26,0)
Friuli-Venezia Giulia	23,7 (11,3-36,1)	19,9 (9,2-30,6)
Liguria	17,7 (7,5-27,8)	11,2 (0,5-21,8)
Emilia-Romagna	16,9 (9,2-24,6)	16,2 (7,5-24,9)
Toscana	26,4 (17,6-35,1)	14,6 (6,1-23,1)
Umbria	27,3 (14,6-40,1)	*
Marche	16,0 (7,0-25,1)	17,6 (8,3-27,0)
Lazio	20,3 (11,4-29,2)	12,7 (5,0-20,4)
Abruzzo	19,9 (11,7-28,2)	7,0 (0,9-13,0)
Molise	30,6 (19,1-42,1)	10,8 (1,8-19,7)
Campania	17,8 (11,6-23,9)	11,3 (6,4-16,2)
Puglia	23,4 (15,8-31,1)	13,9 (6,9-20,9)
Basilicata	28,4 (18,6-38,1)	16,9 (8,7-25,1)
Calabria	17,1 (10,0-24,2)	7,5 (2,4-12,6)
Sicilia	16,8 (10,8-22,7)	9,9 (4,5-15,3)
Sardegna	18,9 (10,7-27,1)	13,7 (5,8-21,7)
<b>Italia</b>	<b>20,7 (18,5-23,0)</b>	<b>13,1 (11,1-15,1)</b>

\*Dato non attendibile.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 5** - Prevalenza di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e sesso - Anno 2006

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	23,0 (20,7-25,4)	6,0 (4,5-7,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	34,0 (29,9-38,0)	8,3 (5,7-11,0)
Lombardia	23,9 (21,6-26,2)	6,5 (5,1-7,9)
Trentino-Alto Adige	33,1 (30,5-35,7)	9,0 (7,2-10,7)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>38,6 (35,1-42,2)</i>	<i>10,6 (8,1-13,1)</i>
<i>Trento</i>	<i>27,8 (24,1-31,5)</i>	<i>7,4 (5,0-9,8)</i>
Veneto	23,8 (21,2-26,3)	7,7 (5,9-9,4)
Friuli-Venezia Giulia	31,2 (27,8-34,6)	10,2 (7,7-12,6)
Liguria	17,7 (14,7-20,7)	4,1 (2,4-5,7)
Emilia-Romagna	18,8 (16,3-21,2)	5,8 (4,3-7,4)
Toscana	23,4 (20,9-25,9)	6,9 (5,3-8,6)
Umbria	22,1 (18,8-25,4)	5,4 (3,4-7,4)
Marche	22,6 (19,8-25,5)	5,4 (3,6-7,1)
Lazio	20,0 (17,3-22,7)	5,2 (3,6-6,8)
Abruzzo	28,4 (25,1-31,8)	3,7 (2,2-5,2)
Molise	33,9 (29,9-37,9)	7,6 (5,2-10,0)
Campania	14,2 (12,2-16,3)	3,6 (2,4-4,8)
Puglia	20,2 (17,6-22,8)	2,9 (1,8-4,1)
Basilicata	30,8 (27,2-34,4)	6,3 (4,2-8,3)
Calabria	20,4 (17,6-23,3)	3,2 (1,9-4,5)
Sicilia	12,3 (10,2-14,4)	2,6 (1,5-3,6)
Sardegna	31,0 (27,9-34,1)	5,3 (3,7-6,9)
<b>Italia</b>	<b>21,4 (20,6-22,1)</b>	<b>5,3 (4,9-5,8)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 6** - Prevalenza di consumatori eccedenti i limiti indicati dalle Linee Guida INRAN e binge drinkers di 19-64 anni (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e sesso - Anno 2006

Regioni	Maschi		Femmine	
	A rischio	Binge drinkers	A rischio	Binge drinkers
Piemonte	10,5 (8,7-12,3)	17,9 (15,7-20,1)	1,9 (1,0-2,8)	5,1 (3,8-6,5)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	12,9 (9,9-15,9)	27,3 (23,4-31,1)	2,7 (1,1-4,4)	6,4 (4,0-8,8)
Lombardia	8,4 (6,8-9,9)	19,4 (17,2-21,5)	1,9 (1,0-2,7)	5,1 (3,8-6,4)
Trentino-Alto Adige	6,1 (4,6-7,6)	31,3 (28,7-33,9)	1,0 (0,3-1,7)	8,2 (6,5-9,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>6,0 (4,0-8,0)</i>	<i>36,7 (33,1-40,2)</i>	*	<i>10,4 (7,9-12,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>6,2 (4,0-8,5)</i>	<i>26,1 (22,4-29,7)</i>	<i>1,7 (0,4-3,0)</i>	<i>6,1 (3,9-8,3)</i>
Veneto	8,8 (7,0-10,5)	18,9 (16,6-21,3)	2,7 (1,5-3,8)	6,3 (4,7-7,9)
Friuli-Venezia Giulia	10,4 (8,0-12,8)	26,2 (22,9-29,5)	3,8 (2,1-5,5)	7,2 (5,0-9,3)
Liguria	7,9 (5,7-10,1)	12,5 (9,9-15,2)	1,7 (0,5-2,9)	2,7 (1,3-4,2)
Emilia-Romagna	8,0 (6,2-9,8)	13,7 (11,6-15,9)	1,5 (0,7-2,4)	4,8 (3,4-6,3)
Toscana	12,4 (10,4-14,5)	15,4 (13,2-17,6)	3,3 (2,1-4,6)	3,9 (2,6-5,2)
Umbria	9,5 (7,0-11,9)	14,7 (11,8-17,6)	1,0 (0,0-2,0)	4,7 (2,8-6,5)
Marche	10,0 (7,8-12,1)	15,9 (13,3-18,5)	2,0 (0,8-3,2)	3,4 (1,9-4,9)
Lazio	6,9 (5,1-8,7)	16,3 (13,8-18,8)	0,8 (0,1-1,6)	4,5 (3,0-5,9)
Abruzzo	11,1 (8,6-13,5)	22,0 (18,9-25,2)	1,6 (0,6-2,6)	2,3 (1,1-3,5)
Molise	12,8 (9,8-15,7)	30,0 (26,1-34,0)	3,1 (1,5-4,8)	6,0 (3,8-8,2)
Campania	5,8 (4,4-7,2)	11,1 (9,2-13,0)	1,4 (0,6-2,2)	2,4 (1,4-3,4)
Puglia	10,8 (8,7-12,8)	12,5 (10,4-14,7)	1,1 (0,3-1,9)	1,8 (0,9-2,8)
Basilicata	10,7 (8,1-13,2)	25,7 (22,3-29,1)	*	5,9 (3,9-7,9)
Calabria	8,1 (6,1-10,1)	16,3 (13,7-18,9)	1,3 (0,4-2,2)	2,2 (1,0-3,3)
Sicilia	3,6 (2,3-4,8)	10,2 (8,3-12,1)	0,6 (0,0-1,1)	2,1 (1,1-3,0)
Sardegna	9,4 (7,3-11,4)	25,4 (22,4-28,3)	0,7 (0,0-1,4)	4,8 (3,2-6,3)
<b>Italia</b>	<b>8,4 (7,8-8,9)</b>	<b>16,6 (15,9-17,2)</b>	<b>1,6 (1,4-1,9)</b>	<b>4,1 (3,7-4,5)</b>

\*Dato non attendibile.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 7** - Prevalenza consumatori a rischio (criterio ISS) di >65 anni (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e sesso - Anno 2006

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	56,5 (51,2-61,8)	15,5 (12,0-18,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	60,9 (52,1-69,7)	15,8 (10,0-21,6)
Lombardia	50,1 (44,4-55,8)	10,8 (7,7-13,9)
Trentino-Alto Adige	46,7 (40,2-53,2)	11,5 (7,8-15,3)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>48,1 (39,2-57,0)</i>	<i>15,1 (9,4-20,8)</i>
<i>Trento</i>	<i>45,5 (36,1-54,9)</i>	<i>8,6 (3,8-13,3)</i>
Veneto	58,6 (52,2-65,0)	20,6 (16,0-25,1)
Friuli-Venezia Giulia	50,1 (42,6-57,6)	17,5 (12,7-22,4)
Liguria	56,8 (50,3-63,3)	16,6 (12,4-20,8)
Emilia-Romagna	48,3 (42,5-54,1)	14,1 (10,5-17,6)
Toscana	47,0 (41,4-52,5)	16,5 (12,9-20,2)
Umbria	49,7 (42,4-57,0)	11,5 (7,3-15,8)
Marche	53,5 (47,0-60,0)	8,2 (4,8-11,7)
Lazio	45,3 (38,4-52,3)	7,4 (4,0-10,8)
Abruzzo	48,9 (41,9-56,0)	10,3 (6,5-14,1)
Molise	61,6 (53,7-69,4)	13,1 (8,2-18,1)
Campania	42,1 (35,4-48,8)	8,6 (5,2-12,1)
Puglia	43,9 (37,1-50,7)	9,4 (5,8-13,0)
Basilicata	51,2 (43,6-58,9)	9,4 (5,2-13,6)
Calabria	38,6 (31,5-45,6)	4,3 (1,5-7,1)
Sicilia	29,4 (23,6-35,3)	3,5 (1,3-5,8)
Sardegna	44,4 (36,9-51,8)	4,0 (1,2-6,9)
<b>Italia</b>	<b>47,7 (45,9-49,5)</b>	<b>11,5 (10,5-12,5)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 8** - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2006

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r>0)					Indicatore obiettivo
	Ortaggi*	Verdure*	Formaggio*	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 2-4	Dolci°	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 5 e più
Trento	54,4 (52,3-56,4)	65,6 (63,7-67,5)	39,4 (37,3-41,4)	76,4 (74,5-78,2)	46,7 (44,6-48,7)	8,6 (7,2-10,1)
Piemonte	52,9 (51,5-54,3)	61,4 (60,0-62,7)	33,4 (32,1-34,8)	79,2 (78,0-80,4)	49,2 (47,8-50,6)	7,3 (6,4-8,2)
Liguria	45,9 (44,1-47,8)	54,9 (53,0-56,7)	25,2 (23,5-26,8)	79,7 (78,1-81,3)	46,7 (44,9-48,6)	7,0 (5,8-8,2)
Trentino-Alto Adige	46,4 (45,0-47,8)	60,2 (58,8-61,6)	41,5 (40,1-42,9)	74,2 (72,8-75,6)	46,4 (45,0-47,8)	6,9 (6,0-7,9)
Veneto	47,3 (45,8-48,8)	56,7 (55,2-58,2)	31,1 (29,6-32,5)	76,5 (75,1-77,8)	55,1 (53,6-56,5)	6,2 (5,3-7,1)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	46,7 (44,5-48,9)	55,0 (52,8-57,2)	46,2 (44,0-48,4)	76,0 (73,9-78,1)	47,9 (45,7-50,1)	6,0 (4,7-7,3)
Emilia-Romagna	45,2 (43,6-46,7)	56,6 (55,1-58,2)	21,5 (20,2-22,8)	75,8 (74,3-77,2)	54,2 (52,7-55,8)	6,0 (5,1-6,9)
Lombardia	45,4 (44,0-46,8)	54,6 (53,2-56,0)	34,9 (33,5-36,2)	77,6 (76,3-78,8)	56,3 (54,9-57,6)	5,8 (5,0-6,5)
Lazio	45,5 (43,9-47,1)	56,9 (55,3-58,5)	21,7 (20,3-23,1)	78,8 (77,3-80,2)	42,4 (40,7-44,0)	5,6 (4,6-6,5)
Friuli-Venezia Giulia	46,3 (44,5-48,2)	65,2 (63,4-66,9)	33,1 (31,3-34,9)	79,0 (77,3-80,6)	49,1 (47,2-51,0)	5,4 (4,4-6,5)
Bolzano-Bozen	38,0 (36,2-39,9)	54,6 (52,7-56,4)	43,7 (41,8-45,6)	71,4 (69,5-73,3)	46,1 (44,2-47,9)	5,3 (4,2-6,5)
<b>Italia</b>	<b>41,3 (40,9-41,8)</b>	<b>50,2 (49,7-50,6)</b>	<b>25,4 (25,1-25,8)</b>	<b>77,1 (76,8-77,5)</b>	<b>49,4 (49,0-49,8)</b>	<b>5,3 (5,1-5,5)</b>
Abruzzo	44,8 (42,8-46,8)	48,5 (46,4-50,5)	18,2 (16,7-19,8)	81,3 (79,6-82,9)	53,7 (51,7-55,7)	5,1 (4,1-6,1)
Toscana	46,8 (45,3-48,2)	54,2 (52,8-55,7)	21,9 (20,7-23,2)	81,5 (80,3-82,7)	49,9 (48,5-51,4)	4,9 (4,1-5,7)
Sardegna	40,1 (38,3-41,8)	48,2 (46,5-50,0)	31,7 (30,0-33,4)	80,6 (79,0-82,1)	48,0 (46,3-49,8)	4,9 (3,9-5,8)
Umbria	44,2 (42,3-46,1)	52,3 (50,4-54,2)	18,1 (16,5-19,7)	79,6 (77,9-81,2)	50,6 (48,7-52,5)	4,8 (3,8-5,9)
Basilicata	32,3 (30,4-34,1)	34,0 (32,2-35,9)	22,4 (20,7-24,1)	70,6 (68,7-72,6)	43,4 (41,5-45,3)	4,6 (3,6-5,6)
Sicilia	31,2 (29,7-32,6)	38,7 (37,2-40,2)	23,3 (22,0-24,7)	75,6 (74,2-77,1)	42,1 (40,5-43,6)	4,6 (3,8-5,4)
Molise	30,1 (28,1-32,2)	34,0 (31,9-36,1)	22,1 (20,3-24,0)	74,3 (72,2-76,3)	51,6 (49,4-53,8)	4,5 (3,4-5,6)
Campania	29,9 (28,5-31,2)	37,2 (35,8-38,6)	13,0 (12,0-14,1)	72,6 (71,2-74,0)	48,4 (46,9-49,8)	4,4 (3,6-5,1)
Marche	45,3 (43,7-46,9)	58,3 (56,7-59,9)	14,5 (13,3-15,8)	78,7 (77,3-80,0)	52,3 (50,6-53,9)	3,8 (3,0-4,6)
Puglia	28,5 (27,0-30,0)	34,0 (32,4-35,5)	19,9 (18,5-21,2)	76,2 (74,7-77,7)	43,7 (42,1-45,3)	3,7 (2,9-4,4)
Calabria	27,8 (26,1-29,4)	35,2 (33,4-36,9)	26,3 (24,7-27,9)	73,9 (72,2-75,6)	45,3 (43,5-47,1)	2,9 (2,1-3,6)

\*Almeno una volta al giorno.

°Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 8** - (segue) *Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2006*

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r<0)											
	Legumi in scatola°	Pane, pasta, riso*	Carni di maiale°	Pesce°	Snack°	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 1	Uova°	Frutta*	Salumi°	Carni bovine°	Carni bianche°	Latte*
Trento	40,2 (38,2-42,2)	82,9 (81,4-84,4)	50,8 (48,8-52,9)	41,9 (39,8-43,9)	18,1 (16,4-19,8)	15,0 (13,3-16,8)	46,0 (44,0-48,1)	74,2 (72,4-75,9)	65,6 (63,7-67,5)	63,8 (61,8-65,7)	69,0 (67,1-70,8)	58,5 (56,5-60,5)
Piemonte	35,1 (33,7-36,4)	84,9 (83,9-85,9)	37,3 (35,9-38,7)	52,5 (51,1-53,9)	20,7 (19,5-21,9)	13,4 (12,3-14,5)	58,2 (56,9-59,6)	80,4 (79,4-81,5)	56,5 (55,1-57,8)	75,4 (74,3-76,6)	75,4 (74,2-76,6)	57,9 (56,5-59,3)
Liguria	32,8 (31,0-34,5)	84,9 (83,6-86,2)	36,6 (34,8-38,4)	66,9 (65,2-68,6)	16,5 (15,0-17,9)	13,4 (11,9-14,9)	60,7 (58,9-62,5)	80,1 (78,7-81,6)	55,7 (53,9-57,6)	76,5 (75,0-78,0)	68,5 (66,8-70,1)	55,1 (53,3-56,9)
Trentino-Alto Adige	31,7 (30,4-33,1)	77,9 (76,7-79,0)	40,3 (38,9-41,7)	36,2 (34,8-37,6)	15,2 (14,1-16,3)	18,9 (17,5-20,2)	47,8 (46,3-49,2)	68,7 (67,4-70,0)	64,0 (62,7-65,4)	54,8 (53,4-56,2)	57,0 (55,6-58,4)	61,0 (59,6-62,3)
Veneto	34,1 (32,7-35,6)	86,6 (85,6-87,6)	47,4 (45,9-48,9)	49,4 (47,9-50,9)	25,3 (23,9-26,6)	17,4 (16,1-18,7)	45,9 (44,4-47,4)	73,4 (72,1-74,7)	62,0 (60,6-63,5)	74,3 (73,1-75,6)	77,0 (75,8-78,3)	58,1 (56,6-59,5)
Valle d'Aosta	34,2 (32,0-36,3)	85,0 (83,5-86,5)	35,8 (33,7-38,0)	50,0 (47,8-52,2)	18,3 (16,5-20,1)	18,0 (16,0-20,0)	53,8 (51,6-56,0)	72,3 (70,3-74,2)	60,8 (58,7-63,0)	76,5 (74,6-78,3)	75,8 (74,0-77,7)	58,0 (55,8-60,2)
Emilia-Romagna	33,0 (31,4-34,5)	89,1 (88,1-90,1)	47,7 (46,2-49,3)	51,9 (50,3-53,5)	19,1 (17,8-20,4)	18,2 (16,9-19,6)	45,6 (44,0-47,1)	77,4 (76,1-78,7)	66,0 (64,5-67,5)	66,6 (65,1-68,1)	76,0 (74,7-77,4)	55,4 (53,8-56,9)
Lombardia	38,1 (36,7-39,5)	84,0 (83,0-85,0)	42,8 (41,4-44,1)	53,9 (52,5-55,2)	28,5 (27,2-29,8)	16,7 (15,5-17,8)	50,4 (49,0-51,8)	76,8 (75,6-77,9)	70,2 (68,9-71,4)	73,8 (72,6-75,0)	77,3 (76,1-78,4)	57,4 (56,0-58,7)
Lazio	46,7 (45,1-48,3)	81,8 (80,5-83,0)	45,0 (43,4-46,6)	61,7 (60,1-63,2)	22,8 (21,4-24,2)	15,6 (14,2-17,0)	58,2 (56,6-59,8)	76,1 (74,7-77,5)	51,0 (49,4-52,6)	76,5 (75,1-77,8)	74,0 (72,6-75,4)	65,9 (64,4-67,4)
Friuli-Venezia Giulia	31,6 (29,9-33,4)	84,1 (82,8-85,4)	48,6 (46,7-50,4)	46,6 (44,7-48,5)	20,0 (18,5-21,6)	15,6 (14,0-17,2)	47,8 (45,9-49,7)	71,9 (70,2-73,5)	61,3 (59,5-63,1)	68,1 (66,4-69,8)	73,3 (71,7-75,0)	58,9 (57,1-60,7)
Bolzano-Bozen	22,8 (21,2-24,5)	72,6 (71,0-74,2)	29,1 (27,4-30,9)	30,2 (28,5-32,0)	12,2 (10,8-13,5)	23,2 (21,3-25,2)	49,6 (47,7-51,4)	63,0 (61,3-64,8)	62,4 (60,6-64,2)	45,4 (43,6-47,3)	44,3 (42,5-46,2)	63,5 (61,7-65,2)
<b>Italia</b>	<b>46,2 (45,8-46,6)</b>	<b>86,8 (86,5-87,0)</b>	<b>48,3 (47,9-48,8)</b>	<b>58,5 (58,1-58,9)</b>	<b>24,8 (24,4-25,2)</b>	<b>17,5 (17,2-17,9)</b>	<b>54,7 (54,3-55,1)</b>	<b>77,7 (77,3-78,0)</b>	<b>62,5 (62,1-62,9)</b>	<b>74,1 (73,8-74,5)</b>	<b>74,3 (73,9-74,7)</b>	<b>59,2 (58,8-59,7)</b>
Abruzzo	53,8 (51,8-55,8)	93,5 (92,5-94,5)	55,4 (53,4-57,4)	64,9 (63,0-66,8)	25,6 (23,8-27,4)	13,7 (12,2-15,2)	66,6 (64,7-68,5)	85,6 (84,2-87,0)	64,0 (62,1-65,9)	78,2 (76,5-79,8)	80,8 (79,2-82,4)	59,4 (57,4-61,4)
Toscana	47,0 (45,6-48,5)	89,9 (89,0-90,7)	55,9 (54,4-57,3)	61,3 (59,9-62,7)	18,1 (16,9-19,2)	13,7 (12,5-14,8)	52,8 (51,4-54,3)	79,6 (78,5-80,8)	62,6 (61,2-63,9)	78,4 (77,2-79,5)	80,7 (79,6-81,8)	65,8 (64,4-67,1)
Sardegna	42,9 (41,2-44,7)	85,5 (84,3-86,8)	59,1 (57,3-60,8)	53,7 (51,9-55,5)	25,4 (23,8-26,9)	14,6 (13,1-16,0)	50,9 (49,1-52,7)	77,2 (75,7-78,7)	56,0 (54,2-57,7)	69,3 (67,7-71,0)	73,4 (71,9-74,9)	61,0 (59,3-62,7)
Umbria	58,1 (56,2-60,0)	89,5 (88,4-90,7)	64,0 (62,2-65,9)	59,6 (57,8-61,5)	18,7 (17,1-20,3)	15,7 (14,1-17,4)	55,7 (53,8-57,6)	79,3 (77,8-80,8)	67,0 (65,3-68,8)	80,1 (78,6-81,6)	83,5 (82,1-84,8)	64,5 (62,7-66,3)
Basilicata	69,8 (68,0-71,5)	90,8 (89,7-91,9)	49,5 (47,5-51,4)	61,8 (59,9-63,7)	26,9 (25,1-28,7)	24,7 (22,8-26,7)	58,0 (56,1-59,9)	78,3 (76,7-79,9)	64,2 (62,4-66,1)	64,8 (62,9-66,6)	71,2 (69,5-72,9)	60,9 (59,1-62,8)
Sicilia	50,5 (49,0-52,1)	92,3 (91,5-93,1)	48,8 (47,2-50,3)	64,4 (62,9-65,9)	25,8 (24,4-27,1)	19,7 (18,3-21,2)	62,4 (60,9-63,9)	78,8 (77,5-80,0)	62,3 (60,8-63,8)	75,6 (74,3-76,9)	68,2 (66,8-69,6)	55,8 (54,3-57,3)
Molise	59,9 (57,8-62,0)	90,1 (88,8-91,3)	59,9 (57,8-62,0)	63,8 (61,7-65,8)	31,1 (29,1-33,1)	21,3 (19,3-23,3)	67,3 (65,3-69,3)	81,1 (79,4-82,7)	68,9 (66,9-70,9)	74,4 (72,5-76,2)	78,8 (77,1-80,6)	60,3 (58,2-62,4)
Campania	72,6 (71,4-73,9)	86,8 (85,8-87,8)	59,2 (57,7-60,6)	70,9 (69,6-72,2)	34,4 (33,0-35,8)	23,1 (21,7-24,5)	63,6 (62,2-65,0)	76,0 (74,8-77,2)	66,7 (65,3-68,0)	81,2 (80,1-82,3)	75,7 (74,4-76,9)	56,4 (54,9-57,8)
Marche	38,7 (37,1-40,3)	91,3 (90,4-92,1)	59,2 (57,7-60,8)	63,4 (61,9-64,9)	20,9 (19,5-22,3)	17,5 (16,1-19,0)	52,5 (50,9-54,1)	80,0 (78,7-81,2)	68,2 (66,7-69,7)	78,7 (77,5-80,0)	82,2 (81,0-83,4)	58,4 (56,9-60,0)
Puglia	60,3 (58,7-61,8)	86,5 (85,4-87,6)	48,0 (46,4-49,6)	63,0 (61,5-64,6)	25,6 (24,2-27,1)	20,1 (18,7-21,6)	50,4 (48,8-52,0)	82,1 (80,8-83,3)	58,7 (57,2-60,3)	69,2 (67,7-70,6)	64,6 (63,1-66,2)	66,3 (64,8-67,8)
Calabria	62,4 (60,7-64,1)	91,2 (90,2-92,2)	48,8 (47,0-50,5)	60,3 (58,5-62,0)	30,8 (29,1-32,5)	23,2 (21,5-24,9)	61,1 (59,4-62,8)	79,1 (77,7-80,5)	62,2 (60,5-63,9)	69,7 (68,0-71,3)	68,1 (66,4-69,7)	53,9 (52,1-55,6)

\*Almeno una volta al giorno.

°Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.



**Tabella 9 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2006**

Regioni	Persone in sovrappeso	Persone obese
Piemonte	33,3 (31,8-34,7)	8,3 (7,4-9,3)*
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	32,0 (29,7-34,3)*	9,4 (7,9-11,0)
Lombardia	30,9 (29,4-32,3)*	9,3 (8,4-10,3)
Trentino-Alto Adige	30,6 (29,1-32,1)*	9,1 (8,1-10,1)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>30,3 (28,3-32,2)*</i>	<i>8,5 (7,2-9,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>30,9 (28,7-33,1)*</i>	<i>9,7 (8,2-11,2)</i>
Veneto	34,0 (32,5-35,6)	11,0 (9,9-12,1)
Friuli-Venezia Giulia	34,6 (32,6-36,5)	10,6 (9,2-12,0)
Liguria	33,5 (31,6-35,4)	7,3 (6,2-8,5)*
Emilia-Romagna	35,7 (34,1-37,4)	11,2 (10,0-12,3)
Toscana	33,4 (31,9-34,9)	10,4 (9,4-11,5)
Umbria	35,7 (33,7-37,8)	10,0 (8,7-11,4)
Marche	35,6 (33,8-37,3)	10,2 (9,0-11,4)
Lazio	34,6 (32,9-36,3)	9,8 (8,6-11,0)
Abruzzo	39,3 (37,2-41,4)*	10,4 (9,0-11,8)
Molise	37,7 (35,4-40,0)	11,4 (9,8-13,0)
Campania	39,8 (38,2-41,4)*	11,2 (10,1-12,3)
Puglia	37,7 (36,0-39,5)*	11,7 (10,5-13,0)
Basilicata	40,3 (38,2-42,5)*	12,0 (10,5-13,5)
Calabria	37,9 (35,9-39,8)*	10,2 (9,0-11,5)
Sicilia	38,2 (36,5-39,9)*	10,9 (9,8-12,0)
Sardegna	30,4 (28,6-32,3)*	8,4 (7,3-9,6)*
<b>Italia</b>	<b>35,0 (34,5-35,4)</b>	<b>10,2 (9,9-10,5)</b>

\*Valori significativamente differenti rispetto alla media nazionale.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 10 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per classe di età e sesso - Anno 2006**

Classi di età	Persone in sovrappeso		Persone obese	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
18-24	18,6 (16,3-20,9)	8,1 (6,3-9,9)	2,3 (1,3-3,4)	1,9 (1,0-2,9)
25-34	32,6 (30,7-34,5)	14,0 (12,5-15,5)	5,6 (4,5-6,6)	2,9 (2,1-3,7)
35-44	45,8 (44,0-47,5)	20,2 (18,7-21,7)	8,9 (7,8-10,0)	5,1 (4,2-6,0)
45-54	50,9 (48,8-52,9)	27,7 (25,8-29,5)	13,4 (11,9-14,9)	12,0 (10,5-13,4)
55-64	52,6 (50,5-54,7)	36,5 (34,4-38,5)	15,8 (14,1-17,4)	17,9 (16,2-19,5)
65-74	53,6 (51,2-56,0)	40,1 (37,9-42,3)	14,9 (13,1-16,7)	17,6 (15,8-19,3)
75+	46,7 (43,7-49,8)	38,2 (36,0-40,4)	11,6 (9,5-13,7)	11,7 (10,1-13,2)
<b>Totale</b>	<b>43,8 (43,1-44,5)</b>	<b>26,8 (26,1-27,4)</b>	<b>10,4 (10,0-10,9)</b>	<b>9,9 (9,5-10,4)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 11** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2006

Regioni	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
Piemonte	20,8 (19,6-22,0)	12,1 (11,1-13,1)*	33,1 (31,7-34,4)*	33,7 (32,3-35,0)*	0,3 (0,1-0,6)*
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	27,7 (25,6-29,7)*	16,4 (14,7-18,1)*	25,1 (23,1-27,1)	30,7 (28,6-32,8)*	-
Lombardia	24,3 (23,0-25,5)*	12,9 (11,9-13,9)*	29,9 (28,6-31,2)*	31,9 (30,5-33,2)*	1,1 (0,7-1,4)
Trentino-Alto Adige	32,3 (30,9-33,6)*	21,2 (20,0-22,4)*	30,1 (28,8-31,5)*	16,2 (15,1-17,3)*	0,1 (0,0-0,3)*
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>39,9 (38,1-41,7)*</i>	<i>21,4 (19,8-23,0)*</i>	<i>24,0 (22,3-25,6)*</i>	<i>14,5 (13,1-15,9)*</i>	<i>0,2 (0,0-0,5)*</i>
<i>Trento</i>	<i>25,0 (23,2-26,9)*</i>	<i>21,1 (19,3-22,8)*</i>	<i>36,1 (34,0-38,1)*</i>	<i>17,9 (16,2-19,5)*</i>	<i>0,0</i>
Veneto	25,8 (24,4-27,1)*	11,6 (10,5-12,6)	33,5 (32,0-34,9)*	28,8 (27,4-30,2)*	0,4 (0,1-0,6)*
Friuli-Venezia Giulia	21,6 (20,0-23,3)	14,2 (12,8-15,6)*	32,8 (31,1-34,6)*	31,0 (29,3-32,8)*	0,3 (0,0-0,5)*
Liguria	20,8 (19,2-22,4)	8,0 (6,9-9,2)*	34,8 (33,1-36,6)*	34,9 (33,1-36,7)*	1,4 (0,8-1,9)
Emilia-Romagna	24,8 (23,4-26,2)*	9,7 (8,7-10,7)	33,2 (31,7-34,7)*	31,8 (30,3-33,3)*	0,5 (0,2-0,8)
Toscana	22,9 (21,6-24,1)*	10,3 (9,3-11,2)	29,0 (27,6-30,3)	37,4 (35,9-38,8)*	0,6 (0,3-0,9)
Umbria	21,5 (19,9-23,2)	9,6 (8,4-10,9)	24,0 (22,3-25,7)*	44,8 (42,9-46,7)	-
Marche	20,6 (19,2-22,0)	8,8 (7,8-9,9)*	29,4 (27,9-30,9)*	40,7 (39,1-42,3)	0,5 (0,1-0,8)
Lazio	20,6 (19,2-22,0)	10,9 (9,8-12,0)	23,3 (21,9-24,8)*	44,4 (42,8-46,1)*	0,7 (0,4-1,1)
Abruzzo	19,2 (17,6-20,8)	9,5 (8,3-10,8)	24,8 (23,0-26,5)*	45,2 (43,2-47,2)*	1,3 (0,8-1,8)
Molise	15,7 (14,1-17,4)*	7,4 (6,1-8,6)*	24,2 (22,3-26,1)*	51,9 (49,8-54,1)*	0,8 (0,3-1,3)
Campania	15,1 (14,0-16,1)*	6,7 (5,9-7,5)*	22,9 (21,7-24,2)*	54,0 (52,6-55,5)*	1,2 (0,8-1,6)
Puglia	15,2 (14,0-16,5)*	8,9 (7,9-9,9)*	24,4 (23,0-25,9)*	50,1 (48,5-51,8)*	1,3 (0,8-1,7)
Basilicata	18,0 (16,4-19,6)	6,0 (5,0-7,1)*	23,9 (22,2-25,6)*	51,2 (49,2-53,1)*	0,9 (0,5-1,4)
Calabria	12,9 (11,7-14,2)*	9,7 (8,5-10,8)	17,8 (16,4-19,3)*	58,0 (56,3-59,8)*	1,5 (1,0-2,0)*
Sicilia	14,3 (13,1-15,4)*	7,8 (6,9-8,7)*	18,7 (17,4-19,9)*	58,5 (57,0-60,0)*	0,7 (0,4-1,1)
Sardegna	19,7 (18,3-21,2)	8,4 (7,3-9,4)*	23,4 (21,9-25,0)*	47,5 (45,7-49,3)*	1,0 (0,6-1,4)
<b>Italia</b>	<b>20,5 (20,1-20,8)</b>	<b>10,3 (10,0-10,6)</b>	<b>27,3 (26,9-27,7)</b>	<b>41,1 (40,7-41,5)</b>	<b>0,8 (0,7-0,9)</b>

-Dato non attendibile.

\*Valori significativamente differenti rispetto alla media nazionale.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 12** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per classe di età - Anno 2006

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
3-5	17,6 (15,0-20,2)	4,0 (2,5-5,4)	21,5 (18,7-24,2)	51,2 (48,0-54,4)	5,7 (4,0-7,4)
6-10	50,7 (48,2-53,1)	7,9 (6,4-9,4)	16,3 (14,3-18,2)	23,2 (21,0-25,4)	2,0 (1,1-2,8)
11-14	52,6 (49,9-55,3)	10,3 (8,5-12,2)	17,0 (14,9-19,2)	18,6 (16,4-20,8)	1,4 (0,6-2,3)
15-17	46,6 (43,4-49,8)	13,5 (11,2-15,8)	18,9 (16,3-21,5)	20,4 (17,7-23,1)	0,6 (0,0-1,3)
18-19	37,3 (33,4-41,2)	19,3 (16,0-22,6)	20,1 (16,8-23,5)	22,3 (18,9-25,8)	*
20-24	33,4 (31,2-35,7)	17,6 (15,7-19,4)	23,8 (21,7-25,8)	24,6 (22,5-26,7)	0,6 (0,1-1,1)
25-34	26,7 (25,5-27,9)	16,6 (15,5-17,6)	23,3 (22,1-24,5)	32,7 (31,4-33,9)	0,8 (0,5-1,1)
35-44	19,1 (18,1-20,1)	13,5 (12,7-14,4)	28,6 (27,5-29,7)	38,4 (37,2-39,6)	0,4 (0,2-0,6)
45-54	14,9 (13,9-16,0)	10,5 (9,5-11,4)	31,8 (30,5-33,1)	42,3 (41,0-43,7)	0,5 (0,2-0,8)
55-59	12,9 (11,4-14,3)	7,6 (6,5-8,8)	36,6 (34,6-38,5)	42,5 (40,5-44,4)	0,5 (0,1-0,9)
60-64	9,7 (8,3-11,2)	6,5 (5,2-7,8)	37,9 (35,7-40,1)	45,5 (43,2-47,8)	0,4 (0,0-0,8)
65-74	6,3 (5,5-7,2)	4,5 (3,8-5,2)	32,7 (31,2-34,2)	56,2 (54,7-57,7)	0,3 (0,1-0,5)
75+	1,8 (1,2-2,3)	1,6 (1,1-2,2)	22,9 (21,4-24,3)	72,8 (71,3-74,3)	1,0 (0,6-1,4)
<b>Totale</b>	<b>20,5 (20,1-20,8)</b>	<b>10,3 (10,0-10,6)</b>	<b>27,3 (26,9-27,7)</b>	<b>41,1 (40,7-41,5)</b>	<b>0,8 (0,7-0,9)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.