

**Tabella 1** - Tassi standardizzati (per 100.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) di dimissioni ospedaliere da istituti pubblici e privati accreditati in regime di ricovero ordinario per piede diabetico associate alla presenza della diagnosi di diabete per regione e sesso - Anno 2005

Regioni	Maschi	Femmine
Piemonte	8,80 (7,88-9,94)	5,49 (4,63-6,51)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	8,26 (2,68-19,25)	1,50 (0,04-8,36)
Lombardia	19,21 (17,94-20,57)	9,73 (8,88-10,66)
Bolzano-Bozen	4,98 (2,39-9,16)	6,19 (3,29-10,58)
Trento	12,12 (8,06-17,57)	4,79 (2,48-8,38)
Veneto	22,39 (20,49-24,47)	9,08 (7,94-10,39)
Friuli-Venezia Giulia	28,75 (24,84-33,26)	10,74 (8,55-13,48)
Liguria	9,25 (7,46-11,47)	4,50 (3,32-5,98)
Emilia-Romagna	12,12 (10,82-13,57)	6,60 (5,64-7,72)
Toscana	6,89 (5,81-8,17)	4,05 (3,27-5,01)
Umbria	9,79 (7,22-13,0)	5,14 (3,39-7,50)
Marche	8,82 (6,95-11,17)	3,67 (2,51-5,19)
Lazio	9,42 (8,27-10,73)	5,47 (4,63-6,47)
Abruzzo	11,95 (9,52-14,97)	5,70 (4,07-7,75)
Molise	19,66 (13,52-27,64)	9,80 (5,71-15,68)
Campania	8,58 (7,45-9,88)	6,01 (5,08-7,10)
Puglia	11,24 (9,77-12,93)	5,80 (4,77-7,05)
Basilicata	6,81 (4,16-10,49)	3,46 (1,66-6,37)
Calabria	18,06 (15,46-21,08)	9,20 (7,04-11,44)
Sicilia	14,78 (13,26-16,48)	8,07 (6,97-9,33)
Sardegna	9,49 (7,48-12,02)	4,55 (3,17-6,32)

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO. Anno 2008 - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

**Tabella 2** - Rapporto (valori assoluti e Intervalli di Confidenza al 95%) tra le dimissioni ospedaliere per piede diabetico associate al diabete e le dimissioni per patologie non traumatiche degli arti inferiori non associate al diabete per regione e sesso - Anno 2005

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	2,47 (2,19-2,79)	1,83 (1,54-2,17)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	0,71 (0,23-1,65)	0,33 (0,01-1,84)
Lombardia	3,23 (3,02-3,46)	2,98 (2,72-3,27)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>1,25 (0,60-2,30)</i>	<i>3,25 (1,73-5,56)</i>
<i>Trento</i>	<i>3,10 (2,06-4,50)</i>	<i>4,00 (2,07-7,00)</i>
Veneto	3,98 (3,64-4,35)	3,10 (2,58-3,72)
Friuli-Venezia Giulia	2,81 (2,43-3,25)	2,23 (1,78-2,8)
Liguria	1,74 (1,40-2,16)	1,20 (0,88-1,59)
Emilia-Romagna	3,26 (2,91-3,65)	2,10 (1,80-2,46)
Toscana	1,93 (1,63-2,29)	1,87 (1,51-2,32)
Umbria	2,09 (1,54-2,78)	1,59 (1,05-2,32)
Marche	1,41 (1,11-1,79)	0,96 (0,66-1,36)
Lazio	1,90 (1,67-2,16)	2,20 (1,86-2,60)
Abruzzo	2,63 (2,10-3,30)	1,18 (0,84-1,60)
Molise	1,38 (0,95-1,94)	2,43 (1,42-3,89)
Campania	1,78 (1,55-2,05)	1,84 (1,55-2,17)
Puglia	1,68 (1,46-1,93)	1,96 (1,61-2,38)
Basilicata	0,80 (0,49-1,23)	0,77 (0,37-1,42)
Calabria	1,39 (1,19-1,62)	1,33 (1,07-1,65)
Sicilia	2,16 (1,94-2,41)	2,61 (2,26-3,02)
Sardegna	1,24 (0,98-1,57)	3,50 (2,44-4,87)

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO. Anno 2008 - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

**Tabella 3** - Rapporti standardizzati di dimissioni ospedaliere (valori assoluti e Intervalli di Confidenza al 95%) da istituti pubblici e privati accreditati in regime di ricovero ordinario per piede diabetico associate alla presenza di diagnosi di diabete per regione e sesso - Anno 2005

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	0,83 (0,73-0,94)	0,81 (0,68-0,96)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	0,60 (0,19-1,40)	0,22 (0,01-1,23)
Lombardia	1,42 (1,33-1,52)	1,43 (1,31-1,57)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0,36 (0,17-0,66)</i>	<i>0,90 (0,48-1,54)</i>
<i>Trento</i>	<i>0,90 (0,60-1,31)</i>	<i>0,70 (0,36-1,23)</i>
Veneto	1,66 (1,52-1,81)	1,33 (1,16-1,52)
Friuli-Venezia Giulia	2,13 (1,84-2,46)	1,56 (1,24-1,96)
Liguria	0,67 (0,54-0,83)	0,63 (0,46-0,84)
Emilia-Romagna	1,00 (0,89-1,12)	0,97 (0,83-1,13)
Toscana	0,51 (0,43-0,60)	0,59 (0,48-0,73)
Umbria	0,74 (0,55-0,98)	0,77 (0,51-1,12)
Marche	0,65 (0,51-0,82)	0,54 (0,37-0,76)
Lazio	0,69 (0,61-0,79)	0,79 (0,67-0,93)
Abruzzo	0,87 (0,69-1,09)	0,83 (0,59-1,13)
Molise	1,45 (1,00-2,04)	1,40 (0,82-2,24)
Campania	0,64 (0,56-0,74)	0,88 (0,74-1,04)
Puglia	0,83 (0,72-0,95)	0,85 (0,70-1,03)
Basilicata	0,51 (0,31-0,79)	0,50 (0,24-0,92)
Calabria	1,33 (1,14-1,55)	1,35 (1,09-1,68)
Sicilia	1,09 (0,98-1,22)	1,19 (1,03-1,38)
Sardegna	0,70 (0,55-0,89)	0,68 (0,47-0,94)

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO. Anno 2008 - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

**Tabella 4** - Rapporti standardizzati di dimissioni ospedaliere (valori assoluti e Intervalli di Confidenza al 95%) da istituti pubblici e privati accreditati in regime di ricovero ordinario per patologie non traumatiche degli arti inferiori non associate alla presenza di diagnosi di diabete per regione e sesso - Anno 2005

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	0,79 (0,65-0,96)	0,96 (0,76-1,21)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	1,98 (0,79-4,08)	1,43 (0,29-4,18)
Lombardia	1,06 (0,94-1,20)	1,04 (0,89-1,22)
<i>Bolzano-Bozen</i>	0,68 (0,29-1,34)	0,59 (0,16-1,51)
<i>Trento</i>	0,67 (0,31-1,27)	0,36 (0,07-1,05)
Veneto	0,99 (0,83-1,18)	0,91 (0,72-1,15)
Friuli-Venezia Giulia	1,77 (1,38-2,27)	1,47 (1,02-2,04)
Liguria	0,88 (0,65-1,16)	1,10 (0,79-1,50)
Emilia-Romagna	0,70 (0,57-0,86)	0,96 (0,76-1,21)
Toscana	0,60 (0,47-0,76)	0,67 (0,49-0,89)
Umbria	0,80 (0,51-1,20)	1,01 (0,59-1,62)
Marche	1,04 (0,78-1,38)	1,16 (0,80-1,63)
Lazio	0,86 (0,72-1,03)	0,79 (0,61-1,01)
Abruzzo	0,75 (0,51-1,07)	1,49 (1,03-2,08)
Molise	2,39 (1,53-3,56)	1,21 (0,49-2,50)
Campania	0,85 (0,70-1,03)	1,05 (0,83-1,32)
Puglia	1,15 (0,96-1,38)	0,95 (0,72-1,25)
Basilicata	1,44 (0,93-2,13)	1,41 (0,75-2,41)
Calabria	2,20 (1,83-2,64)	2,18 (1,69-2,80)
Sicilia	1,16 (0,99-1,36)	0,99 (0,78-1,25)
Sardegna	1,33 (1,02-1,73)	0,42 (0,20-0,77)

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO. Anno 2008 - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.