

**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per regione - Anno 2006**

Regioni	Fumatori %	Ex-Fumatori %	Non Fumatori %	Fumatori di sigarette %	Numero medio sigarette al giorno
Piemonte	22,2 (20,9-23,5)*	23,2 (21,9-24,4)	52,8 (51,4-54,3)	96,9 (95,8-98,1)	13,0 (12,8-13,2)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	19,4 (17,4-21,3)	21,8 (19,7-23,8)	56,4 (54,1-58,8)*	97,1 (95,2-99,1)	14,3 (13,9-14,6)
Lombardia	22,3 (21,1-23,6)	25,1 (23,7-26,4)*	51,0 (49,5-52,5)	98,0 (97,1-98,9)	12,1 (11,9-12,3)
Trentino-Alto Adige	19,5 (18,2-20,8)*	23,1 (21,8-24,5)	54,0 (52,5-55,5)	96,7 (95,3-98,1)	12,0 (11,8-12,2)
Bolzano-Bozen	19,8 (18,1-21,5)*	24,0 (22,2-25,8)	54,1 (52,1-56,1)	96,5 (94,7-98,4)	12,4 (12,2-12,7)
Trento	19,2 (17,4-21,1)*	22,3 (20,4-24,2)	53,8 (51,7-56,0)	96,9 (94,9-98,8)	11,6 (11,3-11,9)
Veneto	20,0 (18,7-21,4)*	25,3 (23,9-26,8)*	53,0 (51,4-54,6)	97,6 (96,4-98,8)	11,3 (11,1-11,5)
Friuli-Venezia Giulia	21,2 (19,5-22,8)	24,2 (22,4-25,9)	49,8 (47,8-51,7)*	99,1 (98,2-100,0)*	13,2 (12,9-13,4)
Liguria	19,5 (17,9-21,1)*	23,8 (22,0-25,5)	55,9 (54,0-57,8)*	98,0 (96,6-99,3)	13,8 (13,5-14,1)
Emilia-Romagna	23,9 (22,4-25,3)	25,5 (24,0-27,0)*	49,5 (47,8-51,1)*	97,5 (96,4-98,7)	12,6 (12,4-12,8)
Toscana	22,6 (21,3-23,9)	25,2 (23,8-26,6)*	50,8 (49,3-52,4)	97,3 (96,2-98,5)	13,8 (13,6-14,0)
Umbria	22,9 (21,1-24,7)	25,7 (23,8-27,5)*	49,8 (47,8-51,8)*	97,6 (96,1-99,0)	13,2 (12,9-13,4)
Marche	20,9 (19,4-22,4)	26,2 (24,6-27,8)*	52,2 (50,5-53,9)	96,0 (94,4-97,7)	13,1 (12,9-13,3)
Lazio	25,7 (24,1-27,3)*	22,3 (20,8-23,9)	48,0 (46,3-49,8)*	97,7 (96,6-98,8)	14,2 (14,0-14,4)
Abruzzo	20,7 (19,0-22,5)	20,6 (18,9-22,4)	57,2 (55,1-59,2)*	96,1 (94,3-98,0)	13,6 (13,2-13,9)
Molise	19,1 (17,2-21,0)*	20,1 (18,1-22,0)*	59,8 (57,5-62,0)*	96,5 (94,5-98,6)	13,8 (13,5-14,1)
Campania	26,9 (25,4-28,3)*	19,3 (18,0-20,6)*	52,9 (51,3-54,5)	98,4 (97,6-99,2)	14,9 (14,7-15,1)
Puglia	20,0 (18,5-21,4)*	19,6 (18,2-21,1)*	58,4 (56,7-60,2)*	98,6 (97,6-99,6)	13,5 (13,3-13,8)
Basilicata	21,8 (20,0-23,6)	19,4 (17,7-21,1)	57,1 (55,1-59,1)*	99,3 (98,5-100,1)*	13,3 (13,1-13,6)
Calabria	18,7 (17,2-20,2)*	19,3 (17,8-20,9)*	59,5 (57,6-61,3)*	98,3 (97,1-99,5)	13,7 (13,4-14,0)
Sicilia	25,5 (24,0-27,0)*	18,5 (17,2-19,9)*	54,7 (53,0-56,3)	98,5 (97,7-99,3)	15,0 (14,8-15,2)
Sardegna	21,6 (20,0-23,1)	25,5 (23,8-27,2)*	50,0 (48,1-51,9)*	99,1 (98,3-99,9)*	14,6 (14,3-14,8)
<b>Italia</b>	<b>22,7 (22,3-23,1)</b>	<b>22,8 (22,4-23,2)</b>	<b>52,6 (52,1-53,1)</b>	<b>97,9 (97,6-98,2)</b>	<b>13,4 (13,4-13,5)</b>

\*Valori significativamente differenti rispetto alla media nazionale.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per classe di età, sesso e abitudine al fumo - Anno 2006**

Classi di età	Maschi			Femmine		
	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori
14-17	9,1 (6,6-11,6)	4,0 (2,2-5,8)	84,8 (82,1-87,6)	5,9 (3,7-8,0)	4,7 (2,7-6,6)	88,0 (85,4-90,5)
18-19	25,8 (20,5-31,1)	7,0 (3,6-10,4)	64,9 (59,4-70,4)	13,8 (9,3-18,3)	7,8 (4,2-11,5)	75,4 (70,3-80,6)
20-24	33,8 (30,5-37,1)	8,9 (6,7-11,0)	54,2 (50,8-57,6)	23,5 (20,4-26,6)	7,2 (5,2-9,3)	67,6 (64,4-70,9)
25-34	36,9 (35,0-38,9)	16,6 (15,0-18,1)	43,7 (41,7-45,6)	21,9 (20,2-23,7)	14,7 (13,2-16,2)	61,7 (59,7-63,6)
35-44	36,6 (34,9-38,3)	24,0 (22,5-25,6)	37,6 (35,9-39,3)	22,7 (21,1-24,2)	20,4 (19,0-21,9)	55,4 (53,7-57,2)
45-54	33,4 (31,4-35,3)	32,3 (30,4-34,3)	32,7 (30,7-34,7)	24,3 (22,5-26,2)	21,1 (19,4-22,8)	53,1 (51,0-55,1)
55-59	30,9 (28,0-33,8)	40,4 (37,4-43,4)	26,9 (24,1-29,7)	21,1 (18,6-23,5)	17,6 (15,2-19,9)	59,6 (56,8-62,4)
60-64	25,5 (22,4-28,5)	45,5 (42,1-48,8)	27,4 (24,3-30,4)	14,9 (12,3-17,5)	17,8 (15,1-20,6)	65,2 (62,0-68,4)
65-74	18,2 (16,2-20,1)	52,7 (50,3-55,1)	27,6 (25,4-29,9)	7,9 (6,6-9,2)	15,7 (14,0-17,4)	74,5 (72,6-76,4)
75 ed oltre	9,2 (7,2-11,1)	59,0 (56,1-61,9)	30,1 (27,3-33,0)	3,4 (2,4-4,3)	10,7 (9,2-12,2)	84,3 (82,7-85,9)
<b>Totale</b>	<b>28,8 (28,2-29,5)</b>	<b>30,5 (29,8-31,1)</b>	<b>38,7 (38,0-39,4)</b>	<b>17,0 (16,5-17,6)</b>	<b>15,7 (15,2-16,3)</b>	<b>65,5 (64,9-66,2)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 3 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione - Anni 2005-2006**

Regioni	2005				2006			
	Consumavano	Mai	Tot. non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Tot. non consumatori	Consumatori
Piemonte	1,6 (1,1-2,1)*	23,4 (22,1-24,8)*	25,0 (23,7-26,4)*	72,5 (71,1-73,9)*	1,8 (1,3-2,3)	25,6 (24,3-26,9)	27,4 (26,1-28,7)	70,8 (69,5-72,1)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,5 (0,8-2,2)	23,0 (21,0-25,0)	24,5 (22,4-26,6)	73,6 (71,6-75,7)
Lombardia	1,4 (1,0-1,9)	23,5 (22,2-24,8)	24,9 (23,6-26,3)	72,6 (71,3-73,9)	1,9 (1,5-2,4)	25,9 (24,6-27,2)	27,8 (26,5-29,1)	70,3 (69,0-71,7)
Trentino-Alto Adige	1,9 (1,4-2,4)	19,0 (17,9-20,1)	20,9 (19,8-22,1)	75,4 (74,2-76,5)	2,4 (1,8-3,0)	19,2 (17,9-20,4)	21,6 (20,3-22,9)	75,1 (73,8-76,4)
Bolzano-Bozen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,3 (1,6-3,1)	14,8 (13,3-16,4)	17,2 (15,6-18,8)	80,8 (79,3-82,3)
Trento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,5 (1,6-3,3)	23,3 (21,4-25,2)	25,8 (23,8-27,7)	69,7 (67,7-71,6)
Veneto	1,7 (1,2-2,2)	20,8 (19,4-22,1)	22,4 (21,1-23,8)	76,2 (74,8-77,5)	1,6 (1,1-2,1)	21,4 (20,1-22,8)	23,0 (21,7-24,4)	75,2 (73,9-76,6)
Friuli-Venezia Giulia	1,9 (1,2-2,6)	20,8 (19,2-22,5)	22,7 (21,0-24,4)	73,7 (72,0-75,4)	1,9 (1,3-2,6)	22,6 (20,9-24,3)	24,6 (22,8-26,3)	70,2 (68,4-71,9)
Liguria	2,1 (1,4-2,8)	26,9 (25,1-28,7)	29,0 (27,2-30,9)	69,8 (68,0-71,6)	1,3 (0,7-1,8)	28,3 (26,5-30,0)	29,5 (27,8-31,3)	69,4 (67,6-71,1)
Emilia-Romagna	1,6 (1,1-2,1)	22,9 (21,4-24,3)	24,4 (23,0-25,9)	74,2 (72,8-75,6)	1,8 (1,2-2,3)	20,7 (19,3-22,1)	22,4 (21,0-23,9)	76,1 (74,7-77,5)
Toscana	2,0 (1,4-2,5)	21,9 (20,3-23,4)	23,8 (22,3-25,4)	72,4 (70,8-74,0)	2,0 (1,5-2,6)	23,1 (21,8-24,4)	25,1 (23,8-26,5)	73,3 (71,9-74,6)
Umbria	1,1 (0,6-1,6)	27,5 (25,6-29,4)	28,6 (26,7-30,5)	70,3 (68,5-72,1)	1,2 (0,6-1,8)	25,6 (23,8-27,4)	26,8 (25,0-28,6)	71,7 (69,9-73,4)
Marche	1,3 (0,8-1,9)	24,3 (22,6-26,0)	25,6 (23,9-27,4)	72,3 (70,7-74,0)	1,0 (0,5-1,5)	24,7 (23,2-26,2)	25,7 (24,2-27,2)	73,5 (72,0-74,9)
Lazio	1,6 (1,0-2,1)	27,6 (26,0-29,2)	29,1 (27,5-30,7)	66,6 (65,0-68,3)	1,8 (1,3-2,4)	27,3 (25,8-28,9)	29,2 (27,6-30,8)	66,6 (65,0-68,2)
Abruzzo	1,5 (0,9-2,0)	29,2 (27,3-31,0)	30,6 (28,8-32,5)	68,1 (66,3-70,0)	1,1 (0,6-1,6)	33,2 (31,3-35,2)	34,4 (32,4-36,4)	64,2 (62,2-66,2)
Molise	1,5 (0,9-2,2)	32,3 (30,1-34,6)	33,9 (31,6-36,1)	64,7 (62,4-66,9)	2,0 (1,3-2,8)	31,7 (29,5-33,8)	33,7 (31,5-35,9)	64,9 (62,8-67,0)
Campania	1,8 (1,3-2,3)	31,3 (29,8-32,9)	33,1 (31,6-34,7)	65,3 (63,8-66,8)	2,0 (1,5-2,5)	34,4 (32,9-35,9)	36,4 (34,9-37,9)	62,1 (60,6-63,6)
Puglia	1,6 (1,1-2,1)	28,6 (27,0-30,2)	30,2 (28,6-31,8)	66,8 (65,2-68,5)	1,5 (1,0-2,0)	30,6 (29,0-32,2)	32,1 (30,5-33,8)	65,7 (64,1-67,3)
Basilicata	1,5 (0,9-2,1)	29,1 (26,9-31,2)	30,6 (28,4-32,8)	67,0 (64,8-69,2)	1,3 (0,7-1,8)	32,8 (30,9-34,8)	34,1 (32,2-36,1)	64,3 (62,4-66,3)
Calabria	1,5 (1,0-2,0)	29,1 (27,4-30,8)	30,6 (28,9-32,4)	66,6 (64,9-68,3)	2,4 (1,7-3,0)	30,9 (29,1-32,6)	33,2 (31,5-35,0)	64,2 (62,4-66,0)
Sicilia	1,4 (1,0-1,8)	35,8 (34,3-37,3)	37,2 (35,7-38,7)	61,2 (59,7-62,7)	1,9 (1,4-2,4)	39,8 (38,2-41,4)	41,6 (40,0-43,3)	56,9 (55,3-58,5)
Sardegna	2,0 (1,4-2,6)	30,5 (28,7-32,4)	32,5 (30,6-34,4)	64,0 (62,1-65,8)	1,8 (1,2-2,3)	30,4 (28,6-32,1)	32,1 (30,4-33,9)	64,4 (62,7-66,2)
<b>Italia</b>	<b>1,6 (1,5-1,8)</b>	<b>26,3 (25,9-26,7)</b>	<b>27,9 (27,5-28,4)</b>	<b>69,7 (69,3-70,1)</b>	<b>1,8 (1,6-1,9)</b>	<b>27,8 (27,4-28,2)</b>	<b>29,6 (29,2-30,0)</b>	<b>68,3 (67,9-68,7)</b>

n.d. = non disponibile.

\*Dato fornito per Piemonte e Valle d'Aosta accorpate.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 4 - Prevalenza di consumatori a rischio (criterio ISS) (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di 11-18 anni per regione e sesso - Anno 2006**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	18,1 (10,2-26,0)	13,0 (6,2-19,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	29,1 (15,2-43,0)	18,8 (6,3-31,3)
Lombardia	18,9 (11,9-26,0)	13,6 (7,3-20,0)
Trentino-Alto Adige	32,1 (24,1-40,2)	19,1 (11,3-26,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>39,3 (28,4-50,3)</i>	<i>27,1 (16,7-37,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>24,9 (13,6-36,2)</i>	*
Veneto	33,1 (23,3-43,0)	17,6 (9,1-26,0)
Friuli-Venezia Giulia	23,7 (11,3-36,1)	19,9 (9,2-30,6)
Liguria	17,7 (7,5-27,8)	11,2 (0,5-21,8)
Emilia-Romagna	16,9 (9,2-24,6)	16,2 (7,5-24,9)
Toscana	26,4 (17,6-35,1)	14,6 (6,1-23,1)
Umbria	27,3 (14,6-40,1)	*
Marche	16,0 (7,0-25,1)	17,6 (8,3-27,0)
Lazio	20,3 (11,4-29,2)	12,7 (5,0-20,4)
Abruzzo	19,9 (11,7-28,2)	7,0 (0,9-13,0)
Molise	30,6 (19,1-42,1)	10,8 (1,8-19,7)
Campania	17,8 (11,6-23,9)	11,3 (6,4-16,2)
Puglia	23,4 (15,8-31,1)	13,9 (6,9-20,9)
Basilicata	28,4 (18,6-38,1)	16,9 (8,7-25,1)
Calabria	17,1 (10,0-24,2)	7,5 (2,4-12,6)
Sicilia	16,8 (10,8-22,7)	9,9 (4,5-15,3)
Sardegna	18,9 (10,7-27,1)	13,7 (5,8-21,7)
<b>Italia</b>	<b>20,7 (18,5-23,0)</b>	<b>13,1 (11,1-15,1)</b>

\*Dato non attendibile.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 5** - Prevalenza di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e sesso - Anno 2006

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	23,0 (20,7-25,4)	6,0 (4,5-7,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	34,0 (29,9-38,0)	8,3 (5,7-11,0)
Lombardia	23,9 (21,6-26,2)	6,5 (5,1-7,9)
Trentino-Alto Adige	33,1 (30,5-35,7)	9,0 (7,2-10,7)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>38,6 (35,1-42,2)</i>	<i>10,6 (8,1-13,1)</i>
<i>Trento</i>	<i>27,8 (24,1-31,5)</i>	<i>7,4 (5,0-9,8)</i>
Veneto	23,8 (21,2-26,3)	7,7 (5,9-9,4)
Friuli-Venezia Giulia	31,2 (27,8-34,6)	10,2 (7,7-12,6)
Liguria	17,7 (14,7-20,7)	4,1 (2,4-5,7)
Emilia-Romagna	18,8 (16,3-21,2)	5,8 (4,3-7,4)
Toscana	23,4 (20,9-25,9)	6,9 (5,3-8,6)
Umbria	22,1 (18,8-25,4)	5,4 (3,4-7,4)
Marche	22,6 (19,8-25,5)	5,4 (3,6-7,1)
Lazio	20,0 (17,3-22,7)	5,2 (3,6-6,8)
Abruzzo	28,4 (25,1-31,8)	3,7 (2,2-5,2)
Molise	33,9 (29,9-37,9)	7,6 (5,2-10,0)
Campania	14,2 (12,2-16,3)	3,6 (2,4-4,8)
Puglia	20,2 (17,6-22,8)	2,9 (1,8-4,1)
Basilicata	30,8 (27,2-34,4)	6,3 (4,2-8,3)
Calabria	20,4 (17,6-23,3)	3,2 (1,9-4,5)
Sicilia	12,3 (10,2-14,4)	2,6 (1,5-3,6)
Sardegna	31,0 (27,9-34,1)	5,3 (3,7-6,9)
<b>Italia</b>	<b>21,4 (20,6-22,1)</b>	<b>5,3 (4,9-5,8)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 6** - Prevalenza di consumatori eccedenti i limiti indicati dalle Linee Guida INRAN e binge drinkers di 19-64 anni (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e sesso - Anno 2006

Regioni	Maschi		Femmine	
	A rischio	Binge drinkers	A rischio	Binge drinkers
Piemonte	10,5 (8,7-12,3)	17,9 (15,7-20,1)	1,9 (1,0-2,8)	5,1 (3,8-6,5)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	12,9 (9,9-15,9)	27,3 (23,4-31,1)	2,7 (1,1-4,4)	6,4 (4,0-8,8)
Lombardia	8,4 (6,8-9,9)	19,4 (17,2-21,5)	1,9 (1,0-2,7)	5,1 (3,8-6,4)
Trentino-Alto Adige	6,1 (4,6-7,6)	31,3 (28,7-33,9)	1,0 (0,3-1,7)	8,2 (6,5-9,9)
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>6,0 (4,0-8,0)</i>	<i>36,7 (33,1-40,2)</i>	*	<i>10,4 (7,9-12,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>6,2 (4,0-8,5)</i>	<i>26,1 (22,4-29,7)</i>	<i>1,7 (0,4-3,0)</i>	<i>6,1 (3,9-8,3)</i>
Veneto	8,8 (7,0-10,5)	18,9 (16,6-21,3)	2,7 (1,5-3,8)	6,3 (4,7-7,9)
Friuli-Venezia Giulia	10,4 (8,0-12,8)	26,2 (22,9-29,5)	3,8 (2,1-5,5)	7,2 (5,0-9,3)
Liguria	7,9 (5,7-10,1)	12,5 (9,9-15,2)	1,7 (0,5-2,9)	2,7 (1,3-4,2)
Emilia-Romagna	8,0 (6,2-9,8)	13,7 (11,6-15,9)	1,5 (0,7-2,4)	4,8 (3,4-6,3)
Toscana	12,4 (10,4-14,5)	15,4 (13,2-17,6)	3,3 (2,1-4,6)	3,9 (2,6-5,2)
Umbria	9,5 (7,0-11,9)	14,7 (11,8-17,6)	1,0 (0,0-2,0)	4,7 (2,8-6,5)
Marche	10,0 (7,8-12,1)	15,9 (13,3-18,5)	2,0 (0,8-3,2)	3,4 (1,9-4,9)
Lazio	6,9 (5,1-8,7)	16,3 (13,8-18,8)	0,8 (0,1-1,6)	4,5 (3,0-5,9)
Abruzzo	11,1 (8,6-13,5)	22,0 (18,9-25,2)	1,6 (0,6-2,6)	2,3 (1,1-3,5)
Molise	12,8 (9,8-15,7)	30,0 (26,1-34,0)	3,1 (1,5-4,8)	6,0 (3,8-8,2)
Campania	5,8 (4,4-7,2)	11,1 (9,2-13,0)	1,4 (0,6-2,2)	2,4 (1,4-3,4)
Puglia	10,8 (8,7-12,8)	12,5 (10,4-14,7)	1,1 (0,3-1,9)	1,8 (0,9-2,8)
Basilicata	10,7 (8,1-13,2)	25,7 (22,3-29,1)	*	5,9 (3,9-7,9)
Calabria	8,1 (6,1-10,1)	16,3 (13,7-18,9)	1,3 (0,4-2,2)	2,2 (1,0-3,3)
Sicilia	3,6 (2,3-4,8)	10,2 (8,3-12,1)	0,6 (0,0-1,1)	2,1 (1,1-3,0)
Sardegna	9,4 (7,3-11,4)	25,4 (22,4-28,3)	0,7 (0,0-1,4)	4,8 (3,2-6,3)
<b>Italia</b>	<b>8,4 (7,8-8,9)</b>	<b>16,6 (15,9-17,2)</b>	<b>1,6 (1,4-1,9)</b>	<b>4,1 (3,7-4,5)</b>

\*Dato non attendibile.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 7** - Prevalenza consumatori a rischio (criterio ISS) di >65 anni (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e sesso - Anno 2006

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	56,5 (51,2-61,8)	15,5 (12,0-18,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	60,9 (52,1-69,7)	15,8 (10,0-21,6)
Lombardia	50,1 (44,4-55,8)	10,8 (7,7-13,9)
Trentino-Alto Adige	46,7 (40,2-53,2)	11,5 (7,8-15,3)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>48,1 (39,2-57,0)</i>	<i>15,1 (9,4-20,8)</i>
<i>Trento</i>	<i>45,5 (36,1-54,9)</i>	<i>8,6 (3,8-13,3)</i>
Veneto	58,6 (52,2-65,0)	20,6 (16,0-25,1)
Friuli-Venezia Giulia	50,1 (42,6-57,6)	17,5 (12,7-22,4)
Liguria	56,8 (50,3-63,3)	16,6 (12,4-20,8)
Emilia-Romagna	48,3 (42,5-54,1)	14,1 (10,5-17,6)
Toscana	47,0 (41,4-52,5)	16,5 (12,9-20,2)
Umbria	49,7 (42,4-57,0)	11,5 (7,3-15,8)
Marche	53,5 (47,0-60,0)	8,2 (4,8-11,7)
Lazio	45,3 (38,4-52,3)	7,4 (4,0-10,8)
Abruzzo	48,9 (41,9-56,0)	10,3 (6,5-14,1)
Molise	61,6 (53,7-69,4)	13,1 (8,2-18,1)
Campania	42,1 (35,4-48,8)	8,6 (5,2-12,1)
Puglia	43,9 (37,1-50,7)	9,4 (5,8-13,0)
Basilicata	51,2 (43,6-58,9)	9,4 (5,2-13,6)
Calabria	38,6 (31,5-45,6)	4,3 (1,5-7,1)
Sicilia	29,4 (23,6-35,3)	3,5 (1,3-5,8)
Sardegna	44,4 (36,9-51,8)	4,0 (1,2-6,9)
<b>Italia</b>	<b>47,7 (45,9-49,5)</b>	<b>11,5 (10,5-12,5)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC *Research on Alcohol* sui dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 8 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2006**

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r>0)					Indicatore obiettivo
	Ortaggi*	Verdure*	Formaggio*	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 2-4	Dolci°	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 5 e più
Trento	54,4 (52,3-56,4)	65,6 (63,7-67,5)	39,4 (37,3-41,4)	76,4 (74,5-78,2)	46,7 (44,6-48,7)	8,6 (7,2-10,1)
Piemonte	52,9 (51,5-54,3)	61,4 (60,0-62,7)	33,4 (32,1-34,8)	79,2 (78,0-80,4)	49,2 (47,8-50,6)	7,3 (6,4-8,2)
Liguria	45,9 (44,1-47,8)	54,9 (53,0-56,7)	25,2 (23,5-26,8)	79,7 (78,1-81,3)	46,7 (44,9-48,6)	7,0 (5,8-8,2)
Trentino-Alto Adige	46,4 (45,0-47,8)	60,2 (58,8-61,6)	41,5 (40,1-42,9)	74,2 (72,8-75,6)	46,4 (45,0-47,8)	6,9 (6,0-7,9)
Veneto	47,3 (45,8-48,8)	56,7 (55,2-58,2)	31,1 (29,6-32,5)	76,5 (75,1-77,8)	55,1 (53,6-56,5)	6,2 (5,3-7,1)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	46,7 (44,5-48,9)	55,0 (52,8-57,2)	46,2 (44,0-48,4)	76,0 (73,9-78,1)	47,9 (45,7-50,1)	6,0 (4,7-7,3)
Emilia-Romagna	45,2 (43,6-46,7)	56,6 (55,1-58,2)	21,5 (20,2-22,8)	75,8 (74,3-77,2)	54,2 (52,7-55,8)	6,0 (5,1-6,9)
Lombardia	45,4 (44,0-46,8)	54,6 (53,2-56,0)	34,9 (33,5-36,2)	77,6 (76,3-78,8)	56,3 (54,9-57,6)	5,8 (5,0-6,5)
Lazio	45,5 (43,9-47,1)	56,9 (55,3-58,5)	21,7 (20,3-23,1)	78,8 (77,3-80,2)	42,4 (40,7-44,0)	5,6 (4,6-6,5)
Friuli-Venezia Giulia	46,3 (44,5-48,2)	65,2 (63,4-66,9)	33,1 (31,3-34,9)	79,0 (77,3-80,6)	49,1 (47,2-51,0)	5,4 (4,4-6,5)
Bolzano-Bozen	38,0 (36,2-39,9)	54,6 (52,7-56,4)	43,7 (41,8-45,6)	71,4 (69,5-73,3)	46,1 (44,2-47,9)	5,3 (4,2-6,5)
<b>Italia</b>	<b>41,3 (40,9-41,8)</b>	<b>50,2 (49,7-50,6)</b>	<b>25,4 (25,1-25,8)</b>	<b>77,1 (76,8-77,5)</b>	<b>49,4 (49,0-49,8)</b>	<b>5,3 (5,1-5,5)</b>
Abruzzo	44,8 (42,8-46,8)	48,5 (46,4-50,5)	18,2 (16,7-19,8)	81,3 (79,6-82,9)	53,7 (51,7-55,7)	5,1 (4,1-6,1)
Toscana	46,8 (45,3-48,2)	54,2 (52,8-55,7)	21,9 (20,7-23,2)	81,5 (80,3-82,7)	49,9 (48,5-51,4)	4,9 (4,1-5,7)
Sardegna	40,1 (38,3-41,8)	48,2 (46,5-50,0)	31,7 (30,0-33,4)	80,6 (79,0-82,1)	48,0 (46,3-49,8)	4,9 (3,9-5,8)
Umbria	44,2 (42,3-46,1)	52,3 (50,4-54,2)	18,1 (16,5-19,7)	79,6 (77,9-81,2)	50,6 (48,7-52,5)	4,8 (3,8-5,9)
Basilicata	32,3 (30,4-34,1)	34,0 (32,2-35,9)	22,4 (20,7-24,1)	70,6 (68,7-72,6)	43,4 (41,5-45,3)	4,6 (3,6-5,6)
Sicilia	31,2 (29,7-32,6)	38,7 (37,2-40,2)	23,3 (22,0-24,7)	75,6 (74,2-77,1)	42,1 (40,5-43,6)	4,6 (3,8-5,4)
Molise	30,1 (28,1-32,2)	34,0 (31,9-36,1)	22,1 (20,3-24,0)	74,3 (72,2-76,3)	51,6 (49,4-53,8)	4,5 (3,4-5,6)
Campania	29,9 (28,5-31,2)	37,2 (35,8-38,6)	13,0 (12,0-14,1)	72,6 (71,2-74,0)	48,4 (46,9-49,8)	4,4 (3,6-5,1)
Marche	45,3 (43,7-46,9)	58,3 (56,7-59,9)	14,5 (13,3-15,8)	78,7 (77,3-80,0)	52,3 (50,6-53,9)	3,8 (3,0-4,6)
Puglia	28,5 (27,0-30,0)	34,0 (32,4-35,5)	19,9 (18,5-21,2)	76,2 (74,7-77,7)	43,7 (42,1-45,3)	3,7 (2,9-4,4)
Calabria	27,8 (26,1-29,4)	35,2 (33,4-36,9)	26,3 (24,7-27,9)	73,9 (72,2-75,6)	45,3 (43,5-47,1)	2,9 (2,1-3,6)

\*Almeno una volta al giorno.

°Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 8** - (segue) *Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2006*

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r<0)											
	Legumi in scatola <sup>o</sup>	Pane, pasta, riso*	Carni di maiale <sup>o</sup>	Pesce <sup>o</sup>	Snack <sup>o</sup>	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 1	Uova <sup>o</sup>	Frutta*	Salumi <sup>o</sup>	Carni bovine <sup>o</sup>	Carni bianche <sup>o</sup>	Latte*
Trento	40,2 (38,2-42,2)	82,9 (81,4-84,4)	50,8 (48,8-52,9)	41,9 (39,8-43,9)	18,1 (16,4-19,8)	15,0 (13,3-16,8)	46,0 (44,0-48,1)	74,2 (72,4-75,9)	65,6 (63,7-67,5)	63,8 (61,8-65,7)	69,0 (67,1-70,8)	58,5 (56,5-60,5)
Piemonte	35,1 (33,7-36,4)	84,9 (83,9-85,9)	37,3 (35,9-38,7)	52,5 (51,1-53,9)	20,7 (19,5-21,9)	13,4 (12,3-14,5)	58,2 (56,9-59,6)	80,4 (79,4-81,5)	56,5 (55,1-57,8)	75,4 (74,3-76,6)	75,4 (74,2-76,6)	57,9 (56,5-59,3)
Liguria	32,8 (31,0-34,5)	84,9 (83,6-86,2)	36,6 (34,8-38,4)	66,9 (65,2-68,6)	16,5 (15,0-17,9)	13,4 (11,9-14,9)	60,7 (58,9-62,5)	80,1 (78,7-81,6)	55,7 (53,9-57,6)	76,5 (75,0-78,0)	68,5 (66,8-70,1)	55,1 (53,3-56,9)
Trentino-Alto Adige	31,7 (30,4-33,1)	77,9 (76,7-79,0)	40,3 (38,9-41,7)	36,2 (34,8-37,6)	15,2 (14,1-16,3)	18,9 (17,5-20,2)	47,8 (46,3-49,2)	68,7 (67,4-70,0)	64,0 (62,7-65,4)	54,8 (53,4-56,2)	57,0 (55,6-58,4)	61,0 (59,6-62,3)
Veneto	34,1 (32,7-35,6)	86,6 (85,6-87,6)	47,4 (45,9-48,9)	49,4 (47,9-50,9)	25,3 (23,9-26,6)	17,4 (16,1-18,7)	45,9 (44,4-47,4)	73,4 (72,1-74,7)	62,0 (60,6-63,5)	74,3 (73,1-75,6)	77,0 (75,8-78,3)	58,1 (56,6-59,5)
Valle d'Aosta	34,2 (32,0-36,3)	85,0 (83,5-86,5)	35,8 (33,7-38,0)	50,0 (47,8-52,2)	18,3 (16,5-20,1)	18,0 (16,0-20,0)	53,8 (51,6-56,0)	72,3 (70,3-74,2)	60,8 (58,7-63,0)	76,5 (74,6-78,3)	75,8 (74,0-77,7)	58,0 (55,8-60,2)
Emilia-Romagna	33,0 (31,4-34,5)	89,1 (88,1-90,1)	47,7 (46,2-49,3)	51,9 (50,3-53,5)	19,1 (17,8-20,4)	18,2 (16,9-19,6)	45,6 (44,0-47,1)	77,4 (76,1-78,7)	66,0 (64,5-67,5)	66,6 (65,1-68,1)	76,0 (74,7-77,4)	55,4 (53,8-56,9)
Lombardia	38,1 (36,7-39,5)	84,0 (83,0-85,0)	42,8 (41,4-44,1)	53,9 (52,5-55,2)	28,5 (27,2-29,8)	16,7 (15,5-17,8)	50,4 (49,0-51,8)	76,8 (75,6-77,9)	70,2 (68,9-71,4)	73,8 (72,6-75,0)	77,3 (76,1-78,4)	57,4 (56,0-58,7)
Lazio	46,7 (45,1-48,3)	81,8 (80,5-83,0)	45,0 (43,4-46,6)	61,7 (60,1-63,2)	22,8 (21,4-24,2)	15,6 (14,2-17,0)	58,2 (56,6-59,8)	76,1 (74,7-77,5)	51,0 (49,4-52,6)	76,5 (75,1-77,8)	74,0 (72,6-75,4)	65,9 (64,4-67,4)
Friuli-Venezia Giulia	31,6 (29,9-33,4)	84,1 (82,8-85,4)	48,6 (46,7-50,4)	46,6 (44,7-48,5)	20,0 (18,5-21,6)	15,6 (14,0-17,2)	47,8 (45,9-49,7)	71,9 (70,2-73,5)	61,3 (59,5-63,1)	68,1 (66,4-69,8)	73,3 (71,7-75,0)	58,9 (57,1-60,7)
Bolzano-Bozen	22,8 (21,2-24,5)	72,6 (71,0-74,2)	29,1 (27,4-30,9)	30,2 (28,5-32,0)	12,2 (10,8-13,5)	23,2 (21,3-25,2)	49,6 (47,7-51,4)	63,0 (61,3-64,8)	62,4 (60,6-64,2)	45,4 (43,6-47,3)	44,3 (42,5-46,2)	63,5 (61,7-65,2)
<b>Italia</b>	<b>46,2 (45,8-46,6)</b>	<b>86,8 (86,5-87,0)</b>	<b>48,3 (47,9-48,8)</b>	<b>58,5 (58,1-58,9)</b>	<b>24,8 (24,4-25,2)</b>	<b>17,5 (17,2-17,9)</b>	<b>54,7 (54,3-55,1)</b>	<b>77,7 (77,3-78,0)</b>	<b>62,5 (62,1-62,9)</b>	<b>74,1 (73,8-74,5)</b>	<b>74,3 (73,9-74,7)</b>	<b>59,2 (58,8-59,7)</b>
Abruzzo	53,8 (51,8-55,8)	93,5 (92,5-94,5)	55,4 (53,4-57,4)	64,9 (63,0-66,8)	25,6 (23,8-27,4)	13,7 (12,2-15,2)	66,6 (64,7-68,5)	85,6 (84,2-87,0)	64,0 (62,1-65,9)	78,2 (76,5-79,8)	80,8 (79,2-82,4)	59,4 (57,4-61,4)
Toscana	47,0 (45,6-48,5)	89,9 (89,0-90,7)	55,9 (54,4-57,3)	61,3 (59,9-62,7)	18,1 (16,9-19,2)	13,7 (12,5-14,8)	52,8 (51,4-54,3)	79,6 (78,5-80,8)	62,6 (61,2-63,9)	78,4 (77,2-79,5)	80,7 (79,6-81,8)	65,8 (64,4-67,1)
Sardegna	42,9 (41,2-44,7)	85,5 (84,3-86,8)	59,1 (57,3-60,8)	53,7 (51,9-55,5)	25,4 (23,8-26,9)	14,6 (13,1-16,0)	50,9 (49,1-52,7)	77,2 (75,7-78,7)	56,0 (54,2-57,7)	69,3 (67,7-71,0)	73,4 (71,9-74,9)	61,0 (59,3-62,7)
Umbria	58,1 (56,2-60,0)	89,5 (88,4-90,7)	64,0 (62,2-65,9)	59,6 (57,8-61,5)	18,7 (17,1-20,3)	15,7 (14,1-17,4)	55,7 (53,8-57,6)	79,3 (77,8-80,8)	67,0 (65,3-68,8)	80,1 (78,6-81,6)	83,5 (82,1-84,8)	64,5 (62,7-66,3)
Basilicata	69,8 (68,0-71,5)	90,8 (89,7-91,9)	49,5 (47,5-51,4)	61,8 (59,9-63,7)	26,9 (25,1-28,7)	24,7 (22,8-26,7)	58,0 (56,1-59,9)	78,3 (76,7-79,9)	64,2 (62,4-66,1)	64,8 (62,9-66,6)	71,2 (69,5-72,9)	60,9 (59,1-62,8)
Sicilia	50,5 (49,0-52,1)	92,3 (91,5-93,1)	48,8 (47,2-50,3)	64,4 (62,9-65,9)	25,8 (24,4-27,1)	19,7 (18,3-21,2)	62,4 (60,9-63,9)	78,8 (77,5-80,0)	62,3 (60,8-63,8)	75,6 (74,3-76,9)	68,2 (66,8-69,6)	55,8 (54,3-57,3)
Molise	59,9 (57,8-62,0)	90,1 (88,8-91,3)	59,9 (57,8-62,0)	63,8 (61,7-65,8)	31,1 (29,1-33,1)	21,3 (19,3-23,3)	67,3 (65,3-69,3)	81,1 (79,4-82,7)	68,9 (66,9-70,9)	74,4 (72,5-76,2)	78,8 (77,1-80,6)	60,3 (58,2-62,4)
Campania	72,6 (71,4-73,9)	86,8 (85,8-87,8)	59,2 (57,7-60,6)	70,9 (69,6-72,2)	34,4 (33,0-35,8)	23,1 (21,7-24,5)	63,6 (62,2-65,0)	76,0 (74,8-77,2)	66,7 (65,3-68,0)	81,2 (80,1-82,3)	75,7 (74,4-76,9)	56,4 (54,9-57,8)
Marche	38,7 (37,1-40,3)	91,3 (90,4-92,1)	59,2 (57,7-60,8)	63,4 (61,9-64,9)	20,9 (19,5-22,3)	17,5 (16,1-19,0)	52,5 (50,9-54,1)	80,0 (78,7-81,2)	68,2 (66,7-69,7)	78,7 (77,5-80,0)	82,2 (81,0-83,4)	58,4 (56,9-60,0)
Puglia	60,3 (58,7-61,8)	86,5 (85,4-87,6)	48,0 (46,4-49,6)	63,0 (61,5-64,6)	25,6 (24,2-27,1)	20,1 (18,7-21,6)	50,4 (48,8-52,0)	82,1 (80,8-83,3)	58,7 (57,2-60,3)	69,2 (67,7-70,6)	64,6 (63,1-66,2)	66,3 (64,8-67,8)
Calabria	62,4 (60,7-64,1)	91,2 (90,2-92,2)	48,8 (47,0-50,5)	60,3 (58,5-62,0)	30,8 (29,1-32,5)	23,2 (21,5-24,9)	61,1 (59,4-62,8)	79,1 (77,7-80,5)	62,2 (60,5-63,9)	69,7 (68,0-71,3)	68,1 (66,4-69,7)	53,9 (52,1-55,6)

\*Almeno una volta al giorno.

<sup>o</sup>Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.



**Tabella 9 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2006**

Regioni	Persone in sovrappeso	Persone obese
Piemonte	33,3 (31,8-34,7)	8,3 (7,4-9,3)*
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	32,0 (29,7-34,3)*	9,4 (7,9-11,0)
Lombardia	30,9 (29,4-32,3)*	9,3 (8,4-10,3)
Trentino-Alto Adige	30,6 (29,1-32,1)*	9,1 (8,1-10,1)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>30,3 (28,3-32,2)*</i>	<i>8,5 (7,2-9,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>30,9 (28,7-33,1)*</i>	<i>9,7 (8,2-11,2)</i>
Veneto	34,0 (32,5-35,6)	11,0 (9,9-12,1)
Friuli-Venezia Giulia	34,6 (32,6-36,5)	10,6 (9,2-12,0)
Liguria	33,5 (31,6-35,4)	7,3 (6,2-8,5)*
Emilia-Romagna	35,7 (34,1-37,4)	11,2 (10,0-12,3)
Toscana	33,4 (31,9-34,9)	10,4 (9,4-11,5)
Umbria	35,7 (33,7-37,8)	10,0 (8,7-11,4)
Marche	35,6 (33,8-37,3)	10,2 (9,0-11,4)
Lazio	34,6 (32,9-36,3)	9,8 (8,6-11,0)
Abruzzo	39,3 (37,2-41,4)*	10,4 (9,0-11,8)
Molise	37,7 (35,4-40,0)	11,4 (9,8-13,0)
Campania	39,8 (38,2-41,4)*	11,2 (10,1-12,3)
Puglia	37,7 (36,0-39,5)*	11,7 (10,5-13,0)
Basilicata	40,3 (38,2-42,5)*	12,0 (10,5-13,5)
Calabria	37,9 (35,9-39,8)*	10,2 (9,0-11,5)
Sicilia	38,2 (36,5-39,9)*	10,9 (9,8-12,0)
Sardegna	30,4 (28,6-32,3)*	8,4 (7,3-9,6)*
<b>Italia</b>	<b>35,0 (34,5-35,4)</b>	<b>10,2 (9,9-10,5)</b>

\*Valori significativamente differenti rispetto alla media nazionale.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 10 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per classe di età e sesso - Anno 2006**

Classi di età	Persone in sovrappeso		Persone obese	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
18-24	18,6 (16,3-20,9)	8,1 (6,3-9,9)	2,3 (1,3-3,4)	1,9 (1,0-2,9)
25-34	32,6 (30,7-34,5)	14,0 (12,5-15,5)	5,6 (4,5-6,6)	2,9 (2,1-3,7)
35-44	45,8 (44,0-47,5)	20,2 (18,7-21,7)	8,9 (7,8-10,0)	5,1 (4,2-6,0)
45-54	50,9 (48,8-52,9)	27,7 (25,8-29,5)	13,4 (11,9-14,9)	12,0 (10,5-13,4)
55-64	52,6 (50,5-54,7)	36,5 (34,4-38,5)	15,8 (14,1-17,4)	17,9 (16,2-19,5)
65-74	53,6 (51,2-56,0)	40,1 (37,9-42,3)	14,9 (13,1-16,7)	17,6 (15,8-19,3)
75+	46,7 (43,7-49,8)	38,2 (36,0-40,4)	11,6 (9,5-13,7)	11,7 (10,1-13,2)
<b>Totale</b>	<b>43,8 (43,1-44,5)</b>	<b>26,8 (26,1-27,4)</b>	<b>10,4 (10,0-10,9)</b>	<b>9,9 (9,5-10,4)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 11** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2006

Regioni	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
Piemonte	20,8 (19,6-22,0)	12,1 (11,1-13,1)*	33,1 (31,7-34,4)*	33,7 (32,3-35,0)*	0,3 (0,1-0,6)*
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	27,7 (25,6-29,7)*	16,4 (14,7-18,1)*	25,1 (23,1-27,1)	30,7 (28,6-32,8)*	-
Lombardia	24,3 (23,0-25,5)*	12,9 (11,9-13,9)*	29,9 (28,6-31,2)*	31,9 (30,5-33,2)*	1,1 (0,7-1,4)
Trentino-Alto Adige	32,3 (30,9-33,6)*	21,2 (20,0-22,4)*	30,1 (28,8-31,5)*	16,2 (15,1-17,3)*	0,1 (0,0-0,3)*
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>39,9 (38,1-41,7)*</i>	<i>21,4 (19,8-23,0)*</i>	<i>24,0 (22,3-25,6)*</i>	<i>14,5 (13,1-15,9)*</i>	<i>0,2 (0,0-0,5)*</i>
<i>Trento</i>	<i>25,0 (23,2-26,9)*</i>	<i>21,1 (19,3-22,8)*</i>	<i>36,1 (34,0-38,1)*</i>	<i>17,9 (16,2-19,5)*</i>	<i>0,0</i>
Veneto	25,8 (24,4-27,1)*	11,6 (10,5-12,6)	33,5 (32,0-34,9)*	28,8 (27,4-30,2)*	0,4 (0,1-0,6)*
Friuli-Venezia Giulia	21,6 (20,0-23,3)	14,2 (12,8-15,6)*	32,8 (31,1-34,6)*	31,0 (29,3-32,8)*	0,3 (0,0-0,5)*
Liguria	20,8 (19,2-22,4)	8,0 (6,9-9,2)*	34,8 (33,1-36,6)*	34,9 (33,1-36,7)*	1,4 (0,8-1,9)
Emilia-Romagna	24,8 (23,4-26,2)*	9,7 (8,7-10,7)	33,2 (31,7-34,7)*	31,8 (30,3-33,3)*	0,5 (0,2-0,8)
Toscana	22,9 (21,6-24,1)*	10,3 (9,3-11,2)	29,0 (27,6-30,3)	37,4 (35,9-38,8)*	0,6 (0,3-0,9)
Umbria	21,5 (19,9-23,2)	9,6 (8,4-10,9)	24,0 (22,3-25,7)*	44,8 (42,9-46,7)	-
Marche	20,6 (19,2-22,0)	8,8 (7,8-9,9)*	29,4 (27,9-30,9)*	40,7 (39,1-42,3)	0,5 (0,1-0,8)
Lazio	20,6 (19,2-22,0)	10,9 (9,8-12,0)	23,3 (21,9-24,8)*	44,4 (42,8-46,1)*	0,7 (0,4-1,1)
Abruzzo	19,2 (17,6-20,8)	9,5 (8,3-10,8)	24,8 (23,0-26,5)*	45,2 (43,2-47,2)*	1,3 (0,8-1,8)
Molise	15,7 (14,1-17,4)*	7,4 (6,1-8,6)*	24,2 (22,3-26,1)*	51,9 (49,8-54,1)*	0,8 (0,3-1,3)
Campania	15,1 (14,0-16,1)*	6,7 (5,9-7,5)*	22,9 (21,7-24,2)*	54,0 (52,6-55,5)*	1,2 (0,8-1,6)
Puglia	15,2 (14,0-16,5)*	8,9 (7,9-9,9)*	24,4 (23,0-25,9)*	50,1 (48,5-51,8)*	1,3 (0,8-1,7)
Basilicata	18,0 (16,4-19,6)	6,0 (5,0-7,1)*	23,9 (22,2-25,6)*	51,2 (49,2-53,1)*	0,9 (0,5-1,4)
Calabria	12,9 (11,7-14,2)*	9,7 (8,5-10,8)	17,8 (16,4-19,3)*	58,0 (56,3-59,8)*	1,5 (1,0-2,0)*
Sicilia	14,3 (13,1-15,4)*	7,8 (6,9-8,7)*	18,7 (17,4-19,9)*	58,5 (57,0-60,0)*	0,7 (0,4-1,1)
Sardegna	19,7 (18,3-21,2)	8,4 (7,3-9,4)*	23,4 (21,9-25,0)*	47,5 (45,7-49,3)*	1,0 (0,6-1,4)
<b>Italia</b>	<b>20,5 (20,1-20,8)</b>	<b>10,3 (10,0-10,6)</b>	<b>27,3 (26,9-27,7)</b>	<b>41,1 (40,7-41,5)</b>	<b>0,8 (0,7-0,9)</b>

-Dato non attendibile.

\*Valori significativamente differenti rispetto alla media nazionale.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 12** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per classe di età - Anno 2006

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
3-5	17,6 (15,0-20,2)	4,0 (2,5-5,4)	21,5 (18,7-24,2)	51,2 (48,0-54,4)	5,7 (4,0-7,4)
6-10	50,7 (48,2-53,1)	7,9 (6,4-9,4)	16,3 (14,3-18,2)	23,2 (21,0-25,4)	2,0 (1,1-2,8)
11-14	52,6 (49,9-55,3)	10,3 (8,5-12,2)	17,0 (14,9-19,2)	18,6 (16,4-20,8)	1,4 (0,6-2,3)
15-17	46,6 (43,4-49,8)	13,5 (11,2-15,8)	18,9 (16,3-21,5)	20,4 (17,7-23,1)	0,6 (0,0-1,3)
18-19	37,3 (33,4-41,2)	19,3 (16,0-22,6)	20,1 (16,8-23,5)	22,3 (18,9-25,8)	*
20-24	33,4 (31,2-35,7)	17,6 (15,7-19,4)	23,8 (21,7-25,8)	24,6 (22,5-26,7)	0,6 (0,1-1,1)
25-34	26,7 (25,5-27,9)	16,6 (15,5-17,6)	23,3 (22,1-24,5)	32,7 (31,4-33,9)	0,8 (0,5-1,1)
35-44	19,1 (18,1-20,1)	13,5 (12,7-14,4)	28,6 (27,5-29,7)	38,4 (37,2-39,6)	0,4 (0,2-0,6)
45-54	14,9 (13,9-16,0)	10,5 (9,5-11,4)	31,8 (30,5-33,1)	42,3 (41,0-43,7)	0,5 (0,2-0,8)
55-59	12,9 (11,4-14,3)	7,6 (6,5-8,8)	36,6 (34,6-38,5)	42,5 (40,5-44,4)	0,5 (0,1-0,9)
60-64	9,7 (8,3-11,2)	6,5 (5,2-7,8)	37,9 (35,7-40,1)	45,5 (43,2-47,8)	0,4 (0,0-0,8)
65-74	6,3 (5,5-7,2)	4,5 (3,8-5,2)	32,7 (31,2-34,2)	56,2 (54,7-57,7)	0,3 (0,1-0,5)
75+	1,8 (1,2-2,3)	1,6 (1,1-2,2)	22,9 (21,4-24,3)	72,8 (71,3-74,3)	1,0 (0,6-1,4)
<b>Totale</b>	<b>20,5 (20,1-20,8)</b>	<b>10,3 (10,0-10,6)</b>	<b>27,3 (26,9-27,7)</b>	<b>41,1 (40,7-41,5)</b>	<b>0,8 (0,7-0,9)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007.

**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno, per regione - Anno 2007**

Regioni	Fumatori %	Ex-Fumatori %	Non Fumatori %	Fumatori di sigarette %	N medio sigarette al giorno
Piemonte	22,3 (21,0-23,7)	25,1 (23,7-26,4)	50,3 (48,8-51,8)	98,6 (97,7-99,4)	12,1 (9,5-14,7)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	19,7 (17,5-21,8)	26,2 (23,9-28,6)	52,1 (49,6-54,7)	99,0 (97,7-100,3)	12,8 (8,1-17,6)
Lombardia	21,8 (20,5-23,0)	24,0 (22,8-25,3)	52,2 (50,7-53,6)	98,7 (98,0-99,5)	12,7 (10,2-15,2)
Trentino-Alto Adige	20,4 (19,0-21,8)	22,7 (21,3-24,1)	52,2 (50,6-53,8)	97,5 (96,3-98,7)	12,6 (9,6-15,6)
Bolzano-Bozen	20,6 (18,7-22,5)	21,8 (19,8-23,7)	54,2 (52,0-56,4)	96,3 (94,3-98,4)	12,7 (8,5-16,9)
Trento	20,2 (18,3-22,0)	23,7 (21,7-25,6)	50,4 (48,2-52,5)	98,7 (97,4-99,9)	12,5 (8,3-16,7)
Veneto	18,9 (17,6-20,2)	24,3 (23,0-25,7)	54,9 (53,4-56,5)	98,3 (97,3-99,3)	11,5 (8,5-14,5)
Friuli-Venezia Giulia	21,0 (19,2-22,7)	24,6 (22,8-26,5)	50,9 (48,8-53,0)	97,6 (96,1-99,1)	12,7 (9,0-16,4)
Liguria	23,2 (21,5-24,9)	23,5 (21,7-25,2)	52,4 (50,5-54,3)	96,5 (94,9-98,1)	13,7 (10,2-17,2)
Emilia-Romagna	21,7 (20,4-23,0)	25,9 (24,6-27,3)	51,0 (49,5-52,4)	97,5 (96,3-98,6)	12,8 (9,9-15,6)
Toscana	22,6 (21,2-24,1)	24,2 (22,7-25,6)	51,9 (50,3-53,5)	97,6 (96,5-98,7)	13,8 (10,9-16,7)
Umbria	22,6 (20,7-24,6)	23,7 (21,7-25,6)	51,4 (49,2-53,6)	98,2 (96,9-99,6)	13,1 (9,4-16,9)
Marche	22,5 (20,9-24,1)	24,9 (23,3-26,6)	51,5 (49,6-53,3)	98,7 (97,7-99,6)	13,1 (10,0-16,3)
Lazio	24,4 (22,9-25,9)	20,3 (18,9-21,7)	51,8 (50,2-53,5)	97,9 (96,8-98,9)	14,3 (11,4-17,2)
Abruzzo	20,9 (19,1-22,6)	21,9 (20,1-23,7)	54,8 (52,7-56,8)	97,9 (96,5-99,3)	12,9 (9,3-16,6)
Molise	20,5 (18,6-22,3)	17,7 (15,9-19,4)	58,3 (56,1-60,4)	98,8 (97,6-99,9)	14,1 (9,9-18,2)
Campania	26,2 (24,8-27,5)	19,9 (18,6-21,1)	52,6 (51,1-54,0)	98,7 (98,0-99,4)	14,3 (11,9-16,7)
Puglia	20,8 (19,3-22,3)	18,7 (17,2-20,1)	57,6 (55,8-59,3)	99,2 (98,5-99,9)	13,5 (10,5-16,5)
Basilicata	23,2 (21,3-25,1)	20,1 (18,2-21,9)	54,0 (51,9-56,2)	99,0 (98,1-100,0)	13,1 (9,5-16,7)
Calabria	17,0 (15,5-18,5)	17,4 (15,9-18,9)	62,7 (60,8-64,6)	99,5 (98,7-100,2)	14,0 (10,3-17,7)
Sicilia	22,5 (21,2-23,9)	20,0 (18,6-21,3)	55,9 (54,4-57,5)	98,5 (97,6-99,4)	14,8 (12,0-17,5)
Sardegna	21,2 (19,6-22,8)	24,0 (22,4-25,7)	51,8 (49,9-53,7)	99,1 (98,3-100,0)	13,6 (10,2-17,0)
<b>Italia</b>	<b>22,1 (21,7-22,5)</b>	<b>22,5 (22,1-22,9)</b>	<b>53,2 (52,8-53,7)</b>	<b>98,3 (98,1-98,6)</b>	<b>13,3 (12,5-14,2)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per classe di età, sesso e abitudine al fumo - Anno 2007**

Classi di età	Maschi			Femmine		
	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori
14-17	7,8 (5,6-10,1)	2,9 (1,4-4,5)	86,7 (84,2-89,2)	5,5 (3,3-7,6)	3,5 (1,7-5,2)	88,6 (86,1-91,1)
18-19	27,8 (22,2-33,5)	5,2 (2,0-8,3)	64,0 (58,2-69,8)	17,1 (12,4-21,9)	7,8 (4,2-11,4)	73,2 (68,1-78,4)
20-24	34,1 (30,7-37,4)	6,8 (4,8-8,8)	55,7 (52,3-59,1)	20,5 (17,5-23,4)	8,4 (6,2-10,5)	67,9 (64,6-71,1)
25-34	38,0 (36,1-40,0)	15,0 (13,5-16,5)	44,3 (42,3-46,3)	22,1 (20,4-23,8)	14,0 (12,5-15,5)	61,2 (59,3-63,1)
35-44	35,0 (33,3-36,7)	24,4 (22,8-25,9)	38,9 (37,2-40,6)	21,3 (19,8-22,8)	18,0 (16,6-19,4)	58,8 (57,1-60,5)
45-54	34,0 (32,1-35,9)	31,8 (29,9-33,7)	32,2 (30,3-34,1)	23,1 (21,4-24,9)	22,1 (20,3-23,8)	52,6 (50,7-54,6)
55-59	25,9 (23,1-28,8)	42,0 (38,9-45,1)	30,2 (27,2-33,2)	19,9 (17,4-22,3)	18,6 (16,2-21,1)	59,7 (56,8-62,6)
60-64	23,6 (20,7-26,5)	45,9 (42,6-49,1)	28,4 (25,3-31,4)	14,5 (12,0-16,9)	17,0 (14,4-19,5)	66,8 (63,7-69,8)
65-74	18,1 (16,2-20,1)	49,9 (47,5-52,3)	30,0 (27,7-32,2)	8,5 (7,2-9,8)	15,0 (13,4-16,7)	74,8 (73,0-76,6)
75 ed oltre	9,5 (7,5-11,4)	59,8 (56,9-62,7)	29,0 (26,2-31,8)	3,7 (2,7-4,7)	12,3 (10,7-13,9)	82,4 (80,7-84,0)
<b>Totale</b>	<b>28,2 (27,6-28,8)</b>	<b>30,0 (29,3-30,6)</b>	<b>39,6 (39,0-40,3)</b>	<b>16,5 (16,0-17,0)</b>	<b>15,5 (15,0-16,0)</b>	<b>65,9 (65,3-66,5)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 3 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione - Anni 2006-2007**

Regioni	2006				2007			
	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori
Piemonte	1,8 (1,3-2,3)	25,6 (24,3-26,9)	27,4 (26,1-28,7)	70,8 (69,5-72,1)	1,4 (1,0-1,8)	23,8 (22,5-25,1)	25,2 (23,9-26,6)	72,3 (71,0-73,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	1,5 (0,8-2,2)	23,0 (21,0-25,0)	24,5 (22,4-26,6)	73,6 (71,6-75,7)	2,3 (1,4-3,2)	22,8 (20,6-25,0)	25,1 (22,9-27,4)	72,7 (70,4-74,9)
Lombardia	1,9 (1,5-2,4)	25,9 (24,6-27,2)	27,8 (26,5-29,1)	70,3 (69,0-71,7)	1,7 (1,2-2,1)	26,0 (24,7-27,3)	27,7 (26,4-29,0)	70,1 (68,8-71,3)
Trentino-Alto Adige	2,4 (1,8-3,0)	19,2 (17,9-20,4)	21,6 (20,3-22,9)	75,1 (73,8-76,4)	2,1 (1,5-2,6)	21,1 (19,8-22,4)	23,2 (21,8-24,6)	72,2 (70,8-73,5)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,3 (1,6-3,1)</i>	<i>14,8 (13,3-16,4)</i>	<i>17,2 (15,6-18,8)</i>	<i>80,8 (79,3-82,3)</i>	<i>2,7 (1,9-3,6)</i>	<i>17,4 (15,7-19,2)</i>	<i>20,2 (18,3-22,0)</i>	<i>76,3 (74,5-78,1)</i>
<i>Trento</i>	<i>2,5 (1,6-3,3)</i>	<i>23,3 (21,4-25,2)</i>	<i>25,8 (23,8-27,7)</i>	<i>69,7 (67,7-71,6)</i>	<i>1,5 (0,8-2,1)</i>	<i>24,6 (22,6-26,5)</i>	<i>26,0 (24,1-28,0)</i>	<i>68,2 (66,3-70,2)</i>
Veneto	1,6 (1,1-2,1)	21,4 (20,1-22,8)	23,0 (21,7-24,4)	75,2 (73,9-76,6)	1,5 (1,0-2,0)	21,5 (20,2-22,9)	23,1 (21,7-24,4)	74,9 (73,6-76,2)
Friuli-Venezia Giulia	1,9 (1,3-2,6)	22,6 (20,9-24,3)	24,6 (22,8-26,3)	70,2 (68,4-71,9)	2,8 (2,0-3,6)	22,4 (20,6-24,2)	25,2 (23,4-27,0)	71,2 (69,4-73,0)
Liguria	1,3 (0,7-1,8)	28,3 (26,5-30,0)	29,5 (27,8-31,3)	69,4 (67,6-71,1)	2,4 (1,7-3,1)	26,4 (24,7-28,2)	28,8 (27,0-30,6)	69,7 (68,0-71,4)
Emilia-Romagna	1,8 (1,2-2,3)	20,7 (19,3-22,1)	22,4 (21,0-23,9)	76,1 (74,7-77,5)	2,2 (1,7-2,8)	24,4 (23,1-25,7)	26,6 (25,3-28,0)	71,5 (70,2-72,7)
Toscana	2,0 (1,5-2,6)	23,1 (21,8-24,4)	25,1 (23,8-26,5)	73,3 (71,9-74,6)	2,0 (1,4-2,5)	25,2 (23,8-26,6)	27,2 (25,7-28,6)	70,7 (69,2-72,1)
Umbria	1,2 (0,6-1,8)	25,6 (23,8-27,4)	26,8 (25,0-28,6)	71,7 (69,9-73,4)	2,5 (1,7-3,3)	24,8 (22,9-26,7)	27,3 (25,3-29,3)	70,3 (68,3-72,3)
Marche	1,0 (0,5-1,5)	24,7 (23,2-26,2)	25,7 (24,2-27,2)	73,5 (72,0-74,9)	1,7 (1,1-2,3)	22,6 (21,0-24,2)	24,3 (22,7-26,0)	73,4 (71,9-75,0)
Lazio	1,8 (1,3-2,4)	27,3 (25,8-28,9)	29,2 (27,6-30,8)	66,6 (65,0-68,2)	1,6 (1,0-2,1)	26,3 (24,8-27,8)	27,8 (26,3-29,4)	68,0 (66,5-69,5)
Abruzzo	1,1 (0,6-1,6)	33,2 (31,3-35,2)	34,4 (32,4-36,4)	64,2 (62,2-66,2)	1,6 (1,0-2,3)	31,7 (29,8-33,6)	33,3 (31,4-35,3)	63,6 (61,7-65,5)
Molise	2,0 (1,3-2,8)	31,7 (29,5-33,8)	33,7 (31,5-35,9)	64,9 (62,8-67,0)	1,1 (0,5-1,6)	27,6 (25,7-29,6)	28,7 (26,7-30,7)	65,9 (63,9-67,9)
Campania	2,0 (1,5-2,5)	34,4 (32,9-35,9)	36,4 (34,9-37,9)	62,1 (60,6-63,6)	2,0 (1,5-2,5)	32,0 (30,6-33,4)	34,0 (32,6-35,4)	63,8 (62,4-65,2)
Puglia	1,5 (1,0-2,0)	30,6 (29,0-32,2)	32,1 (30,5-33,8)	65,7 (64,1-67,3)	2,1 (1,5-2,6)	28,0 (26,4-29,6)	30,1 (28,5-31,7)	66,2 (64,6-67,8)
Basilicata	1,3 (0,7-1,8)	32,8 (30,9-34,8)	34,1 (32,2-36,1)	64,3 (62,4-66,3)	1,9 (1,2-2,6)	29,2 (27,2-31,2)	31,1 (29,1-33,2)	65,7 (63,6-67,7)
Calabria	2,4 (1,7-3,0)	30,9 (29,1-32,6)	33,2 (31,5-35,0)	64,2 (62,4-66,0)	2,0 (1,4-2,6)	30,3 (28,5-32,1)	32,3 (30,5-34,1)	64,0 (62,2-65,8)
Sicilia	1,9 (1,4-2,4)	39,8 (38,2-41,4)	41,6 (40,0-43,3)	56,9 (55,3-58,5)	2,6 (2,1-3,2)	36,9 (35,4-38,4)	39,5 (38,0-41,0)	58,5 (57,0-60,0)
Sardegna	1,8 (1,2-2,3)	30,4 (28,6-32,1)	32,1 (30,4-33,9)	64,4 (62,7-66,2)	2,4 (1,7-3,0)	30,5 (28,7-32,2)	32,8 (31,1-34,6)	63,0 (61,2-64,7)
<b>Italia</b>	<b>1,8 (1,6-1,9)</b>	<b>27,8 (27,4-28,2)</b>	<b>29,6 (29,2-30,0)</b>	<b>68,3 (67,9-68,7)</b>	<b>1,9 (1,8-2,1)</b>	<b>27,2 (26,8-27,6)</b>	<b>29,1 (28,7-29,5)</b>	<b>68,2 (67,8-68,6)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2007, 2008.

**Tabella 4** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 11-18 anni per regione e sesso - Anno 2007

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	34,8 (25,2-44,4)	13,0 (5,7-20,3)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	23,5 (9,9-37,1)	11,6 (1,0-22,2)
Lombardia	19,7 (12,1-27,4)	16,9 (9,4-24,4)
Trentino-Alto Adige	32,8 (24,4-41,3)	20,1 (12,3-27,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>36,3 (24,8-47,9)</i>	<i>26,3 (14,6-37,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>29,0 (16,7-41,4)</i>	<i>14,0 (3,8-24,2)</i>
Veneto	24,5 (15,4-33,6)	22,4 (13,6-31,2)
Friuli-Venezia Giulia	20,8 (9,8-31,8)	14,1 (3,7-24,6)
Liguria	26,8 (14,1-39,5)	10,2 (1,4-19,1)
Emilia-Romagna	22,9 (13,3-32,5)	17,9 (7,9-28,0)
Toscana	15,6 (7,7-23,4)	9,1 (2,6-15,6)
Umbria	18,3 (7,4-29,1)	12,6 (1,7-23,6)
Marche	21,8 (12,1-31,5)	15,0 (6,4-23,6)
Lazio	21,5 (12,1-30,9)	8,6 (2,5-14,6)
Abruzzo	19,8 (10,5-29,1)	9,6 (1,9-17,3)
Molise	22,5 (10,6-34,4)	11,9 (2,6-21,2)
Campania	18,9 (13,4-24,4)	9,7 (4,9-14,5)
Puglia	28,8 (21,4-36,2)	13,1 (6,7-19,5)
Basilicata	18,9 (9,4-28,4)	11,1 (3,9-18,3)
Calabria	24,3 (15,9-32,8)	13,5 (6,7-20,2)
Sicilia	18,4 (12,0-24,8)	10,8 (5,8-15,8)
Sardegna	23,9 (14,7-33,0)	6,7 (0,2-13,3)
<b>Italia</b>	<b>22,4 (20,1-24,7)</b>	<b>13,0 (11,1-15,0)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 5** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni per regione e sesso - Anno 2007

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	24,9 (22,4-27,4)	8,7 (7,0-10,5)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	33,9 (29,5-38,2)	6,7 (4,1-9,3)
Lombardia	19,3 (17,1-21,4)	5,5 (4,1-6,8)
Trentino-Alto Adige	31,5 (28,8-34,3)	11,4 (9,4-13,4)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>36,6 (32,7-40,5)</i>	<i>13,4 (10,4-16,4)</i>
<i>Trento</i>	<i>26,7 (23,0-30,3)</i>	<i>9,5 (6,8-12,2)</i>
Veneto	26,7 (24,2-29,3)	6,2 (4,6-7,8)
Friuli-Venezia Giulia	28,6 (25,2-32,1)	9,5 (7,1-11,9)
Liguria	20,5 (17,3-23,6)	8,2 (5,9-10,5)
Emilia-Romagna	24,4 (21,8-26,9)	6,9 (5,2-8,5)
Toscana	24,7 (21,9-27,4)	6,5 (4,8-8,1)
Umbria	21,6 (18,1-25,0)	5,8 (3,7-7,8)
Marche	23,3 (20,3-26,3)	5,7 (3,9-7,5)
Lazio	15,9 (13,5-18,2)	4,8 (3,3-6,3)
Abruzzo	24,9 (21,5-28,2)	2,8 (1,4-4,2)
Molise	28,8 (25,1-32,5)	6,8 (4,5-9,0)
Campania	16,1 (14,1-18,2)	3,7 (2,6-4,8)
Puglia	20,8 (18,2-23,4)	5,6 (4,1-7,1)
Basilicata	26,8 (23,3-30,4)	3,7 (2,0-5,5)
Calabria	22,4 (19,5-25,3)	3,0 (1,8-4,3)
Sicilia	13,0 (11,0-15,0)	3,3 (2,1-4,4)
Sardegna	26,5 (23,5-29,6)	7,0 (5,1-8,9)
<b>Italia</b>	<b>21,1 (20,4-21,8)</b>	<b>5,7 (5,2-6,1)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 6** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori eccedenti i limiti indicati dalle Linee Guida INRAN e binge drinkers di 19-64 anni per regione e sesso - Anno 2007

Regioni	Maschi		Femmine	
	A rischio	Binge drinkers	A rischio	Binge drinkers
Piemonte	10,8 (8,9-12,7)	18,9 (16,6-21,1)	3,7 (2,5-5,0)	5,8 (4,3-7,3)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	11,9 (8,8-15,1)	27,6 (23,4-31,8)	1,5 (0,1-3,0)	5,1 (2,8-7,5)
Lombardia	6,3 (4,9-7,7)	15,2 (13,2-17,2)	1,8 (0,9-2,6)	3,9 (2,8-5,1)
Trentino-Alto Adige	6,2 (4,7-7,8)	29,6 (26,9-32,3)	1,7 (0,8-2,7)	10,1 (8,2-12,0)
<i>Bolzano-Bozen</i>	4,8 (2,8-6,8)	35,4 (31,5-39,3)	1,4 (0,2-2,6)	12,2 (9,3-15,1)
<i>Trento</i>	7,7 (5,2-10,1)	24,1 (20,5-27,7)	2,0 (0,6-3,5)	8,0 (5,5-10,6)
Veneto	10,0 (8,2-11,9)	21,4 (19,0-23,8)	2,0 (1,0-3,0)	4,9 (3,4-6,3)
Friuli-Venezia Giulia	8,6 (6,3-10,8)	24,9 (21,6-28,2)	3,1 (1,6-4,6)	7,6 (5,4-9,8)
Liguria	10,7 (8,1-13,2)	15,8 (12,9-18,7)	3,2 (1,6-4,8)	5,3 (3,4-7,3)
Emilia-Romagna	10,2 (8,3-12,2)	18,1 (15,7-20,4)	2,2 (1,1-3,3)	5,0 (3,5-6,4)
Toscana	12,8 (10,6-14,9)	16,0 (13,6-18,4)	2,8 (1,6-4,0)	4,3 (2,9-5,8)
Umbria	11,9 (9,1-14,7)	14,4 (11,4-17,4)	3,0 (1,4-4,6)	3,6 (1,9-5,3)
Marche	12,2 (9,8-14,6)	15,4 (12,8-18,0)	1,8 (0,7-2,9)	4,5 (2,9-6,1)
Lazio	7,4 (5,6-9,2)	11,7 (9,6-13,9)	1,7 (0,7-2,6)	3,4 (2,1-4,7)
Abruzzo	10,5 (8,0-12,9)	19,7 (16,6-22,8)	1,1 (0,1-2,1)	2,1 (0,8-3,4)
Molise	13,4 (10,4-16,3)	22,0 (18,6-25,5)	1,9 (0,6-3,3)	5,5 (3,4-7,6)
Campania	7,8 (6,3-9,4)	11,0 (9,2-12,8)	1,6 (0,8-2,4)	2,2 (1,3-3,1)
Puglia	11,9 (9,8-14,0)	12,5 (10,3-14,6)	3,0 (1,9-4,2)	2,7 (1,6-3,8)
Basilicata	11,2 (8,6-13,9)	20,3 (17,0-23,6)	0,8 (0,0-1,7)	3,2 (1,6-4,8)
Calabria	8,7 (6,6-10,7)	18,3 (15,6-21,0)	0,5 (0,0-1,1)	2,5 (1,3-3,7)
Sicilia	5,5 (4,1-7,0)	9,3 (7,5-11,1)	1,1 (0,3-1,8)	2,6 (1,6-3,6)
Sardegna	11,1 (8,8-13,4)	20,2 (17,4-23,0)	1,8 (0,7-2,9)	5,6 (3,8-7,3)
<b>Italia</b>	<b>9,0 (8,5-9,5)</b>	<b>15,8 (15,1-16,4)</b>	<b>2,0 (1,8-2,3)</b>	<b>4,0 (3,6-4,4)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.



**Tabella 7** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 65 anni ed oltre per regione e sesso - Anno 2007

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	57,9 (52,5-63,4)	17,2 (13,4-20,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	60,4 (50,9-69,9)	19,0 (12,4-25,7)
Lombardia	53,3 (47,6-59,0)	15,2 (11,6-18,7)
Trentino-Alto Adige	47,6 (40,8-54,3)	10,1 (6,4-13,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>43,7 (34,3-53,2)</i>	<i>8,7 (3,7-13,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>51,0 (41,6-60,4)</i>	<i>11,3 (5,9-16,6)</i>
Veneto	53,1 (46,8-59,5)	15,5 (11,4-19,5)
Friuli-Venezia Giulia	48,9 (41,4-56,4)	18,8 (13,9-23,8)
Liguria	47,3 (40,6-53,9)	11,8 (8,1-15,6)
Emilia-Romagna	48,8 (43,1-54,5)	14,6 (10,9-18,2)
Toscana	52,4 (46,6-58,2)	12,0 (8,6-15,5)
Umbria	54,0 (46,4-61,5)	7,3 (3,7-11,0)
Marche	54,9 (48,4-61,4)	15,0 (10,8-19,1)
Lazio	42,9 (36,2-49,6)	8,5 (5,1-12,0)
Abruzzo	52,6 (45,1-60,0)	6,7 (3,2-10,2)
Molise	52,1 (44,1-60,1)	7,8 (3,7-11,8)
Campania	43,1 (36,8-49,5)	7,7 (4,6-10,8)
Puglia	48,1 (41,4-54,8)	8,8 (5,4-12,3)
Basilicata	56,5 (48,6-64,4)	14,8 (9,7-20,0)
Calabria	40,9 (33,9-47,9)	7,2 (3,8-10,5)
Sicilia	28,1 (22,4-33,7)	3,5 (1,3-5,7)
Sardegna	43,4 (35,7-51,1)	7,1 (3,4-10,9)
<b>Italia</b>	<b>48,2 (46,5-50,0)</b>	<b>11,7 (10,7-12,7)</b>

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 8 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2007**

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r>0)			Indicatore obiettivo
	Latte*	Formaggio*	Dolci°	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 5 e più volte al giorno
Trento	58,5 (50,6-66,4)	37,2 (29,2-45,1)	42,8 (34,7-50,8)	10,0 (3,8-16,2)
Trentino-Alto Adige	62,9 (57,5-68,4)	41,8 (36,1-47,5)	46,1 (40,4-51,8)	8,6 (4,6-12,7)
Bolzano-Bozen	67,6 (60,3-74,9)	46,6 (38,7-54,5)	49,6 (41,7-57,5)	7,2 (1,9-12,4)
Lombardia	57,2 (52,2-62,2)	29,0 (24,3-33,8)	51,8 (46,7-56,9)	6,9 (3,7-10,2)
Molise	64,0 (56,6-71,4)	19,9 (13,4-26,5)	47,9 (40,1-55,7)	7,1 (2,2-12,0)
Sardegna	61,7 (55,2-68,1)	33,2 (26,7-39,6)	48,0 (41,3-54,7)	6,8 (2,6-11,0)
Piemonte	55,8 (50,5-61,2)	33,5 (28,3-38,8)	50,5 (45,1-56,0)	6,6 (3,3-9,9)
Marche	59,4 (53,1-65,7)	13,1 (8,4-17,7)	53,8 (47,4-60,2)	6,6 (2,7-10,4)
Veneto	58,6 (53,1-64,1)	32,0 (26,6-37,4)	54,8 (49,2-60,3)	6,4 (2,9-9,9)
Umbria	65,0 (57,7-72,2)	15,3 (9,5-21,1)	49,8 (42,1-57,4)	6,1 (1,7-10,5)
Abruzzo	56,6 (49,6-63,7)	20,7 (14,6-26,7)	46,7 (39,5-53,8)	5,6 (1,6-9,7)
Campania	60,3 (55,4-65,3)	11,6 (8,1-15,0)	43,8 (38,8-48,9)	5,6 (2,7-8,5)
<b>Italia</b>	<b>59,3 (57,7-60,8)</b>	<b>23,8 (22,4-25,2)</b>	<b>47,9 (46,3-49,5)</b>	<b>5,6 (4,7-6,6)</b>
Lazio	67,8 (62,3-73,3)	15,7 (11,1-20,3)	40,2 (34,3-46,1)	5,5 (2,0-8,9)
Liguria	55,8 (48,8-62,8)	27,0 (20,5-33,5)	45,6 (38,6-52,7)	5,3 (1,2-9,3)
Emilia-Romagna	54,5 (49,0-60,1)	21,4 (16,5-26,3)	54,4 (48,8-59,9)	5,3 (1,9-8,6)
Puglia	63,6 (58,0-69,1)	19,4 (14,6-24,1)	42,6 (36,8-48,3)	5,3 (2,3-8,3)
Toscana	65,0 (59,5-70,5)	24,1 (18,9-29,3)	49,3 (43,5-55,2)	5,1 (1,9-8,3)
Friuli-Venezia Giulia	62,0 (55,0-69,0)	28,5 (21,8-35,2)	50,3 (43,0-57,5)	4,8 (0,9-8,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	60,3 (51,6-69,1)	43,8 (34,8-52,8)	49,6 (40,6-58,6)	**
Sicilia	53,1 (47,7-58,4)	23,2 (18,5-27,9)	43,3 (38,0-48,7)	3,5 (1,0-5,9)
Calabria	53,4 (47,1-59,8)	22,4 (17,0-27,9)	44,2 (37,9-50,6)	2,7 (0,2-5,3)
Basilicata	58,0 (50,7-65,3)	22,4 (16,0-28,8)	47,9 (40,5-55,4)	**

\*Almeno una volta al giorno.

°Almeno qualche volta alla settimana.

\*\*Dato non attendibile.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 8** - (segue) *Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2007*

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione discordante rispetto all'indicatore obiettivo (r<0)								
	Pane, pasta, riso*	Uova°	Pesce°	Snack°	Legumi in scatola°	Carni bianche°	Carni bovine°	Salumi°	Carni di maiale°
Trento	81,4 (75,3-87,5)	43,6 (35,5-51,7)	46,7 (38,6-54,8)	16,9 (10,4-23,5)	37,4 (29,4-45,4)	71,3 (64,1-78,4)	60,3 (52,5-68,1)	59,1 (51,2-67,0)	44,2 (36,1-52,3)
Trentino-Alto Adige	78,8 (74,3-83,4)	45,3 (39,6-51,0)	38,2 (32,6-43,8)	16,8 (12,3-21,4)	29,6 (24,2-34,9)	59,7 (54,1-65,2)	53,4 (47,7-59,0)	61,1 (55,6-66,5)	37,6 (32,0-43,2)
Bolzano-Bozen	76,2 (69,6-82,8)	46,8 (38,9-54,7)	29,4 (22,0-36,8)	16,7 (10,4-23,0)	21,5 (14,7-28,3)	47,4 (39,5-55,3)	46,1 (38,2-54,0)	63,1 (55,6-70,6)	30,5 (23,0-37,9)
Lombardia	82,6 (78,9-86,4)	49,2 (44,1-54,3)	57,6 (52,6-62,6)	27,4 (22,7-32,1)	36,5 (31,5-41,4)	80,9 (76,9-84,8)	71,0 (66,4-75,5)	67,1 (62,4-71,8)	39,5 (34,5-44,5)
Molise	88,7 (84,0-93,5)	59,2 (51,6-66,8)	63,0 (55,6-70,5)	25,7 (18,7-32,8)	61,7 (54,2-69,2)	83,3 (77,6-89,0)	76,5 (70,1-83,0)	67,8 (60,7-75,0)	62,1 (54,6-69,5)
Sardegna	82,0 (77,0-87,0)	50,5 (43,8-57,2)	56,4 (49,8-63,0)	20,4 (14,7-26,1)	40,3 (33,6-46,9)	78,6 (73,2-84,0)	73,2 (67,4-79,0)	58,0 (51,4-64,6)	59,8 (53,3-66,3)
Piemonte	85,4 (81,6-89,1)	56,4 (51,0-61,8)	52,5 (47,1-58,0)	19,7 (15,2-24,3)	31,4 (26,2-36,5)	80,2 (75,9-84,4)	70,9 (66,1-75,8)	58,2 (52,8-63,5)	36,6 (31,3-42,0)
Marche	90,9 (87,3-94,6)	54,9 (48,5-61,3)	65,6 (59,5-71,7)	18,4 (13,2-23,6)	33,6 (27,4-39,8)	84,8 (80,3-89,4)	78,4 (73,2-83,7)	65,5 (59,5-71,6)	54,3 (47,9-60,7)
Veneto	84,2 (80,2-88,2)	45,4 (39,7-51,0)	51,4 (45,8-57,0)	23,1 (18,1-28,1)	31,5 (26,1-36,8)	78,8 (74,3-83,3)	68,2 (63,0-73,4)	58,0 (52,4-63,5)	43,6 (38,0-49,3)
Umbria	85,7 (80,5-91,0)	58,8 (51,3-66,3)	60,5 (53,0-67,9)	21,1 (14,7-27,6)	57,7 (50,2-65,2)	86,0 (80,8-91,2)	79,7 (73,6-85,7)	66,9 (59,7-74,0)	64,3 (57,0-71,5)
Abruzzo	89,4 (85,0-93,7)	60,6 (53,7-67,6)	60,2 (53,2-67,1)	24,1 (17,7-30,4)	49,5 (42,4-56,7)	83,5 (78,3-88,7)	72,4 (66,1-78,7)	62,6 (55,8-69,5)	48,3 (41,2-55,5)
Campania	87,7 (84,4-90,9)	64,2 (59,3-69,0)	72,7 (68,3-77,2)	32,1 (27,2-36,9)	72,8 (68,4-77,3)	83,2 (79,5-86,9)	79,1 (75,1-83,2)	62,0 (57,1-66,9)	57,1 (52,1-62,1)
<b>Italia</b>	<b>85,5 (84,4-86,6)</b>	<b>55,1 (53,5-56,7)</b>	<b>60,1 (58,6-61,7)</b>	<b>23,6 (22,2-25,0)</b>	<b>43,6 (42,0-45,2)</b>	<b>79,3 (78,0-80,6)</b>	<b>71,8 (70,4-73,3)</b>	<b>60,7 (59,2-62,3)</b>	<b>46,1 (44,5-47,7)</b>
Lazio	82,0 (77,5-86,5)	61,0 (55,2-66,8)	65,9 (60,3-71,5)	18,5 (13,6-23,4)	42,3 (36,3-48,2)	79,8 (75,1-84,5)	75,4 (70,3-80,4)	47,4 (41,4-53,3)	45,4 (39,5-51,4)
Liguria	83,9 (78,9-89,0)	58,9 (52,0-65,8)	61,5 (54,7-68,3)	18,3 (12,5-24,1)	30,6 (23,9-37,3)	77,7 (72,0-83,5)	70,6 (64,3-77,0)	59,5 (52,6-66,4)	39,3 (32,4-46,3)
Emilia-Romagna	87,4 (83,8-91,0)	47,6 (42,0-53,3)	52,1 (46,5-57,7)	21,1 (16,2-26,0)	34,8 (29,3-40,3)	77,4 (72,9-82,0)	66,8 (61,6-72,0)	67,9 (62,8-73,1)	50,1 (44,5-55,7)
Puglia	82,2 (77,8-86,6)	52,6 (46,8-58,4)	64,1 (58,6-69,6)	26,5 (21,3-31,7)	53,2 (47,4-59,0)	72,6 (67,5-77,7)	67,7 (62,3-73,1)	58,2 (52,5-63,9)	44,3 (38,6-50,1)
Toscana	89,3 (85,8-92,9)	50,9 (45,0-56,7)	55,6 (49,8-61,3)	17,7 (13,0-22,4)	45,0 (39,2-50,8)	81,5 (77,1-86,0)	73,8 (68,7-78,8)	59,4 (53,7-65,0)	49,0 (43,2-54,9)
Friuli-Venezia Giulia	81,2 (75,6-86,8)	55,5 (48,3-62,7)	49,8 (42,6-57,1)	21,3 (15,1-27,5)	32,6 (25,6-39,5)	76,3 (70,2-82,4)	65,2 (58,4-72,0)	59,0 (51,9-66,1)	49,7 (42,5-57,0)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	88,4 (82,8-94,0)	50,4 (41,4-59,4)	52,1 (43,1-61,0)	19,8 (12,3-27,3)	34,7 (26,0-43,4)	80,2 (73,1-87,2)	74,4 (66,7-82,1)	60,3 (51,6-69,1)	33,1 (24,4-41,7)
Sicilia	91,9 (89,0-94,8)	65,9 (60,8-70,9)	69,6 (64,7-74,4)	24,5 (19,7-29,3)	46,6 (41,2-52,0)	78,2 (73,8-82,6)	74,1 (69,4-78,7)	60,2 (54,9-65,4)	40,9 (35,5-46,2)
Calabria	86,6 (82,3-90,9)	59,4 (53,1-65,6)	64,0 (58,0-70,1)	27,7 (21,9-33,5)	55,4 (49,1-61,7)	76,9 (71,6-82,2)	69,6 (63,8-75,4)	62,4 (56,2-68,5)	53,3 (46,9-59,6)
Basilicata	89,9 (85,5-94,3)	62,0 (54,8-69,2)	64,6 (57,5-71,6)	29,2 (22,3-36,1)	72,9 (66,4-79,5)	81,4 (75,7-87,1)	70,1 (63,4-76,9)	70,0 (63,2-76,7)	55,0 (47,6-62,4)

\*Almeno una volta al giorno.

°Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 9** - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2007

<b>Regioni</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>	<b>Persone obese</b>
Piemonte	32,4 (30,9-33,9)	8,9 (7,9-9,8)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	34,2 (31,6-36,7)	9,8 (8,1-11,5)
Lombardia	31,3 (29,9-32,7)	9,0 (8,1-10,0)
Trentino-Alto Adige	31,8 (30,2-33,4)	8,5 (7,5-9,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>30,7 (28,5-32,9)</i>	<i>7,3 (5,9-8,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>32,9 (30,7-35,0)</i>	<i>9,7 (8,2-11,2)</i>
Veneto	34,3 (32,7-35,8)	9,4 (8,4-10,4)
Friuli-Venezia Giulia	34,2 (32,2-36,3)	9,3 (7,9-10,6)
Liguria	33,2 (31,3-35,1)	9,7 (8,4-11,0)
Emilia-Romagna	35,2 (33,7-36,7)	10,5 (9,4-11,5)
Toscana	34,2 (32,6-35,8)	9,7 (8,6-10,8)
Umbria	35,2 (33,0-37,4)	10,7 (9,2-12,2)
Marche	34,3 (32,4-36,1)	10,9 (9,6-12,2)
Lazio	35,8 (34,1-37,5)	8,1 (7,0-9,1)
Abruzzo	37,8 (35,7-39,8)	11,4 (9,9-12,8)
Molise	37,8 (35,6-39,9)	13,2 (11,6-14,9)
Campania	41,3 (39,8-42,9)	11,2 (10,1-12,2)
Puglia	39,4 (37,6-41,2)	11,7 (10,4-12,9)
Basilicata	37,8 (35,6-40,1)	12,6 (11,0-14,2)
Calabria	37,5 (35,6-39,5)	10,1 (8,8-11,3)
Sicilia	41,1 (39,5-42,8)	10,9 (9,8-12,0)
Sardegna	33,6 (31,8-35,5)	9,8 (8,5-11,0)
<b>Italia</b>	<b>35,6 (35,1-36,0)</b>	<b>9,9 (9,6-10,2)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 10** - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per classe di età e sesso - Anno 2007

<b>Classi di età</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>		<b>Persone obese</b>	
	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
18-24	18,5 (16,2-20,9)	9,5 (7,7-11,4)	3,1 (1,9-4,2)	1,9 (0,9-2,8)
25-34	33,7 (31,8-35,6)	14,1 (12,6-15,6)	5,1 (4,1-6,1)	3,3 (2,4-4,1)
35-44	44,0 (42,2-45,7)	19,2 (17,7-20,6)	10,4 (9,3-11,6)	6,2 (5,2-7,2)
45-54	51,1 (49,1-53,1)	28,8 (27,0-30,7)	13,0 (11,5-14,4)	10,8 (9,5-12,2)
55-64	54,1 (52,0-56,2)	38,4 (36,3-40,4)	16,1 (14,4-17,7)	14,4 (12,9-16,0)
65-74	52,9 (50,5-55,3)	41,3 (39,2-43,4)	14,4 (12,6-16,2)	14,0 (12,4-15,6)
75 ed oltre	49,9 (46,9-52,9)	40,1 (37,8-42,3)	10,7 (8,7-12,7)	12,8 (11,2-14,4)
<b>Totale</b>	<b>44,3 (43,5-45,0)</b>	<b>27,6 (27,0-28,2)</b>	<b>10,6 (10,2-11,1)</b>	<b>9,2 (8,8-9,7)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 11** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2007

Regioni	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
Piemonte	22,7 (21,5-24,0)	13,2 (12,2-14,2)	33,8 (32,4-35,2)	30,0 (28,6-31,3)	0,3 (0,1-0,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	23,8 (21,6-25,9)	18,4 (16,4-20,4)	28,8 (26,6-31,0)	28,6 (26,4-30,9)	0,4 (0,0-0,8)
Lombardia	25,1 (23,9-26,3)	10,2 (9,3-11,1)	31,3 (30,0-32,5)	32,7 (31,4-34,0)	0,8 (0,5-1,1)
Trentino-Alto Adige	30,7 (29,3-32,1)	21,1 (19,9-22,4)	32,9 (31,5-34,3)	14,9 (13,8-16,0)	0,3 (0,1-0,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>36,1 (34,1-38,1)</i>	<i>24,6 (22,7-26,4)</i>	<i>24,6 (22,8-26,5)</i>	<i>14,3 (12,8-15,9)</i>	<i>0,3 (0,0-0,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>25,6 (23,7-27,4)</i>	<i>17,8 (16,2-19,5)</i>	<i>40,8 (38,8-42,8)</i>	<i>15,5 (13,9-17,1)</i>	<i>0,3 (0,0-0,7)</i>
Veneto	26,4 (25,1-27,7)	11,5 (10,5-12,5)	36,6 (35,1-38,0)	24,8 (23,5-26,1)	0,8 (0,4-1,1)
Friuli-Venezia Giulia	21,9 (20,2-23,6)	10,7 (9,4-12,0)	35,6 (33,7-37,6)	31,3 (29,4-33,2)	0,4 (0,1-0,8)
Liguria	21,4 (19,8-23,0)	8,1 (7,0-9,2)	26,4 (24,7-28,1)	43,4 (41,5-45,2)	0,7 (0,3-1,1)
Emilia-Romagna	22,9 (21,6-24,1)	10,9 (9,9-11,9)	35,2 (33,9-36,6)	30,9 (29,5-32,2)	0,2 (0,0-0,3)
Toscana	20,4 (19,1-21,7)	9,6 (8,6-10,6)	35,5 (34,0-37,0)	34,1 (32,6-35,6)	0,4 (0,2-0,7)
Umbria	21,1 (19,3-22,9)	9,5 (8,2-10,8)	25,6 (23,7-27,5)	43,1 (41,0-45,2)	0,7 (0,3-1,2)
Marche	21,3 (19,8-22,8)	8,1 (7,1-9,2)	31,1 (29,5-32,8)	39,1 (37,3-40,8)	0,4 (0,1-0,7)
Lazio	21,5 (20,1-22,9)	7,6 (6,7-8,6)	28,7 (27,2-30,2)	41,0 (39,4-42,6)	1,2 (0,7-1,6)
Abruzzo	20,0 (18,4-21,6)	9,1 (7,8-10,3)	22,0 (20,4-23,7)	48,1 (46,2-50,1)	0,7 (0,3-1,2)
Molise	16,2 (14,5-17,8)	8,6 (7,3-9,9)	21,3 (19,6-23,1)	53,1 (51,0-55,1)	0,8 (0,3-1,3)
Campania	14,2 (13,1-15,2)	6,8 (6,1-7,6)	26,3 (25,1-27,6)	52,0 (50,6-53,4)	0,7 (0,4-1,0)
Puglia	15,6 (14,4-16,8)	7,1 (6,2-8,0)	22,9 (21,5-24,3)	53,0 (51,4-54,7)	1,4 (0,9-1,8)
Basilicata	19,3 (17,6-21,0)	8,8 (7,5-10,0)	23,8 (22,0-25,6)	47,4 (45,3-49,4)	0,8 (0,3-1,2)
Calabria	14,3 (13,0-15,7)	9,2 (8,0-10,3)	24,6 (23,0-26,2)	50,7 (48,9-52,5)	1,2 (0,8-1,7)
Sicilia	14,1 (13,0-15,2)	8,0 (7,1-8,9)	22,1 (20,8-23,3)	55,4 (54,0-56,9)	0,4 (0,2-0,6)
Sardegna	21,1 (19,6-22,6)	9,9 (8,7-11,0)	29,2 (27,5-30,9)	39,4 (37,6-41,1)	0,4 (0,1-0,7)
<b>Italia</b>	<b>20,6 (20,3-21,0)</b>	<b>9,6 (9,3-9,8)</b>	<b>29,6 (29,2-30,0)</b>	<b>39,5 (39,1-39,9)</b>	<b>0,7 (0,6-0,8)</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 12** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per classe di età - Anno 2007

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
3-5	18,7 (15,9-21,4)	5,2 (3,5-6,9)	28,5 (25,4-31,6)	42,9 (39,6-46,3)	4,7 (3,1-6,3)
6-10	51,1 (48,6-53,6)	7,1 (5,7-8,6)	17,4 (15,4-19,3)	23,0 (20,8-25,1)	1,4 (0,7-2,2)
11-14	56,3 (53,7-59,0)	8,9 (7,2-10,6)	17,6 (15,4-19,8)	16,1 (14,0-18,3)	1,0 (0,3-1,7)
15-17	42,4 (39,3-45,5)	13,6 (11,3-15,9)	19,6 (17,0-22,2)	23,8 (21,1-26,6)	*
18-19	35,4 (31,5-39,3)	15,5 (12,4-18,6)	21,3 (17,8-24,7)	27,5 (23,8-31,2)	*
20-24	34,1 (31,8-36,3)	15,8 (14,0-17,7)	22,4 (20,4-24,4)	26,7 (24,6-28,8)	1,0 (0,4-1,6)
25-34	26,3 (25,1-27,5)	14,6 (13,6-15,6)	27,0 (25,8-28,2)	31,4 (30,2-32,7)	0,7 (0,4-1,0)
35-44	18,5 (17,5-19,4)	12,9 (12,1-13,7)	30,6 (29,5-31,7)	37,6 (36,5-38,8)	0,4 (0,2-0,6)
45-54	15,6 (14,5-16,6)	9,8 (8,9-10,6)	34,5 (33,3-35,8)	39,6 (38,3-40,9)	0,5 (0,3-0,8)
55-59	12,8 (11,3-14,3)	7,8 (6,6-9,0)	36,4 (34,4-38,4)	42,8 (40,8-44,8)	0,2 (-0,1-0,5)
60-64	10,7 (9,2-12,2)	6,4 (5,2-7,6)	39,8 (37,6-41,9)	42,7 (40,5-44,9)	0,4 (0,0-0,8)
65-74	7,5 (6,6-8,3)	4,3 (3,6-5,1)	38,4 (36,9-39,9)	49,5 (48,0-51,0)	0,3 (0,1-0,5)
75 ed oltre	2,4 (1,7-3,0)	1,5 (1,0-2,0)	23,7 (22,2-25,2)	71,9 (70,4-73,4)	0,6 (0,2-0,9)
<b>Totale</b>	<b>20,6 (20,3-21,0)</b>	<b>9,6 (9,3-9,8)</b>	<b>29,6 (29,2-30,0)</b>	<b>39,5 (39,1-39,9)</b>	<b>0,7 (0,6-0,8)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008.

**Tabella 1** - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno, per regione - Anno 2008

Regioni	Fumatori %	Ex-Fumatori %	Non Fumatori %	N medio sigarette al giorno
Piemonte	21,4 (20,1-22,6)	24,7 (23,4-26,0)	52,6 (51,2-54,1)	13,4 (10,8-16,0)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	17,4 (15,3-19,5)	25,7 (23,3-28,0)	55,0 (52,5-57,6)	14,6 (9,2-20,0)
Lombardia	22,1 (21,0-23,3)	23,8 (22,6-25,0)	51,5 (50,1-52,8)	12,7 (10,4-15,0)
Trentino-Alto Adige	20,5 (19,0-21,9)	22,2 (20,8-23,7)	54,2 (52,5-55,9)	12,2 (9,2-15,2)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>21,7 (19,5-23,8)</i>	<i>22,6 (20,5-24,8)</i>	<i>52,8 (50,3-55,3)</i>	<i>12,6 (8,6-16,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>19,4 (17,5-21,2)</i>	<i>21,9 (20,0-23,8)</i>	<i>55,5 (53,4-57,7)</i>	<i>11,8 (7,6-16,0)</i>
Veneto	20,7 (19,3-22,1)	24,4 (23,0-25,9)	53,3 (51,6-54,9)	10,9 (8,3-13,5)
Friuli Venezia Giulia	21,1 (19,3-22,9)	25,2 (23,3-27,1)	51,9 (49,8-54,0)	12,8 (9,0-16,6)
Liguria	20,2 (18,7-21,8)	23,2 (21,7-24,8)	55,5 (53,7-57,2)	13,9 (10,5-17,3)
Emilia-Romagna	23,2 (21,9-24,5)	25,5 (24,2-26,9)	50,3 (48,8-51,8)	13,2 (10,5-15,9)
Toscana	22,3 (20,9-23,7)	25,7 (24,2-27,2)	50,4 (48,8-52,1)	13,0 (10,2-15,8)
Umbria	21,2 (19,4-23,0)	27,3 (25,3-29,2)	49,9 (47,8-52,0)	14,3 (10,3-18,3)
Marche	21,7 (20,1-23,2)	24,4 (22,8-26,0)	52,0 (50,2-53,8)	13,2 (9,9-16,5)
Lazio	23,3 (21,7-24,9)	24,1 (22,5-25,7)	48,5 (46,7-50,3)	14,2 (11,1-17,3)
Abruzzo	23,2 (21,5-24,9)	22,1 (20,4-23,8)	53,4 (51,4-55,4)	14,1 (10,8-17,4)
Molise	20,6 (18,6-22,7)	21,0 (18,9-23,1)	57,3 (54,9-59,7)	13,3 (9,0-17,6)
Campania	23,8 (22,4-25,1)	18,9 (17,6-20,1)	55,2 (53,7-56,7)	15,2 (12,6-17,8)
Puglia	22,5 (21,1-23,9)	19,8 (18,5-21,2)	56,9 (55,3-58,4)	13,5 (10,8-16,2)
Basilicata	22,8 (20,9-24,7)	22,2 (20,3-24,1)	53,8 (51,6-56,0)	14,5 (10,7-18,3)
Calabria	20,6 (18,8-22,3)	17,9 (16,3-19,6)	60,2 (58,1-62,2)	14,2 (10,7-17,7)
Sicilia	22,8 (21,4-24,1)	19,7 (18,4-21,0)	55,5 (54,0-57,0)	14,3 (11,6-17,0)
Sardegna	21,2 (19,4-23,0)	23,9 (22,0-25,8)	50,8 (48,6-52,9)	14,1 (10,3-17,9)
<b>Italia</b>	<b>22,2 (21,8-22,6)</b>	<b>22,9 (22,5-23,3)</b>	<b>52,9 (52,4-53,3)</b>	<b>13,5 (12,7-14,3)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 2** - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per abitudine al fumo, per classe di età e genere - Anno 2008

Classi di età	Maschi			Femmine			Totale		
	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori	Fumatori	Ex-Fumatori	Non Fumatori
14-17	9,9 (0,2-19,5)	*	84,7 (74,4-95,0)	*	*	90,0 (81,1-98,8)	7,5 (1,6-13,4)	*	87,3 (80,8-93,8)
18-19	31,2 (9,1-53,4)	*	60,8 (38,3-83,3)	19,4 (0,9-37,9)	*	71,8 (52,3-91,4)	25,1 (11,4-38,7)	*	66,5 (52,4-80,6)
20-24	35,0 (22,3-47,6)	9,4 (1,0-17,8)	52,1 (39,1-65,1)	20,2 (8,7-31,7)	10,3 (1,1-19,4)	67,1 (54,5-79,7)	27,9 (19,7-36,2)	9,8 (4,0-19,3)	59,3 (50,6-68,0)
25-34	36,9 (29,5-44,3)	15,9 (10,0-21,8)	44,3 (36,8-51,8)	21,0 (14,4-27,7)	16,0 (9,9-22,1)	60,8 (53,3-68,3)	29,2 (24,4-34,0)	16,0 (12,0-21,3)	52,3 (47,2-57,4)
35-44	35,4 (29,0-41,9)	22,8 (17,0-28,6)	39,8 (33,2-46,4)	20,0 (14,5-25,5)	17,3 (12,0-22,5)	60,8 (54,5-67,1)	27,6 (23,6-31,7)	20,0 (16,3-24,7)	50,4 (46,0-54,8)
45-54	33,0 (25,7-40,3)	32,0 (24,7-39,2)	33,5 (26,2-40,8)	24,3 (17,7-30,9)	20,8 (14,5-27,1)	53,3 (46,0-60,7)	28,5 (23,9-33,2)	26,2 (21,7-30,7)	43,7 (38,7-48,7)
55-59	30,5 (19,5-41,5)	41,7 (30,1-53,3)	25,8 (15,3-36,4)	18,3 (8,9-27,7)	19,6 (10,0-29,2)	59,9 (48,8-71,0)	24,4 (17,5-31,2)	30,5 (23,2-37,8)	43,1 (35,4-50,8)
60-64	27,5 (16,3-38,8)	45,2 (33,0-57,3)	25,1 (14,1-36,1)	16,7 (7,0-26,3)	17,5 (7,7-27,4)	62,9 (51,3-74,5)	22,1 (15,0-29,1)	31,3 (23,6-39,0)	44,0 (35,9-52,1)
65-74	16,7 (9,5-23,8)	51,4 (42,5-60,4)	29,6 (21,2-38,1)	8,9 (3,8-14,1)	15,9 (9,5-22,3)	73,2 (66,1-80,3)	12,5 (8,4-16,6)	32,2 (26,7-37,7)	53,2 (47,6-58,9)
75 ed oltre	9,0 (1,9-16,1)	60,8 (50,0-71,6)	28,8 (18,4-39,2)	*	13,5 (7,3-19,7)	82,0 (75,7-88,3)	5,3 (2,0-8,6)	31,5 (25,4-37,6)	61,8 (55,7-67,9)
<b>Totale</b>	<b>28,6 (26,1-31,0)</b>	<b>30,4 (28,0-32,9)</b>	<b>38,9 (36,3-41,4)</b>	<b>16,3 (14,3-18,2)</b>	<b>15,9 (14,0-17,9)</b>	<b>65,9 (63,5-68,2)</b>	<b>22,2 (20,7-23,7)</b>	<b>22,9 (21,4-24,4)</b>	<b>52,9 (51,2-54,5)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.



**Tabella 3 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione - Anni 2007-2008**

Regioni	2007				2008			
	Consumavano	Mai	Non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Non consumatori	Consumatori
Piemonte	1,4 (22,5-25,1)	23,8 (22,5-25,1)	25,2 (23,9-26,6)	72,3 (71,0-73,6)	1,7 (1,2-2,1)	25,3 (24,0-26,6)	26,9 (25,6-28,2)	71,3 (70,0-72,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	2,3 (20,6-25,0)	22,8 (20,6-25,0)	25,1 (22,9-27,4)	72,7 (70,4-74,9)	2,6 (1,6-3,6)	20,4 (18,3-22,6)	23,0 (20,8-25,3)	74,5 (72,3-76,7)
Lombardia	1,7 (24,7-27,3)	26 (24,7-27,3)	27,7 (26,4-29,0)	70,1 (68,8-71,3)	1,6 (1,2-2,0)	24,6 (23,4-25,7)	26,2 (25,0-27,4)	70,4 (69,2-71,6)
Trentino-Alto Adige	2,1 (19,8-22,4)	21,1 (19,8-22,4)	23,2 (21,8-24,6)	72,2 (70,8-73,5)	2,3 (1,8-2,9)	22,9 (21,4-24,3)	25,2 (23,7-26,7)	71,3 (69,8-72,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,7 (15,7-19,2)</i>	<i>17,4 (15,7-19,2)</i>	<i>20,2 (18,3-22,0)</i>	<i>76,3 (74,5-78,1)</i>	<i>2,8 (1,9-3,7)</i>	<i>17,9 (16,0-19,9)</i>	<i>20,8 (18,7-22,8)</i>	<i>76,0 (74,0-78,1)</i>
<i>Trento</i>	<i>1,5 (22,6-26,5)</i>	<i>24,6 (22,6-26,5)</i>	<i>26 (24,1-28,0)</i>	<i>68,2 (66,3-70,2)</i>	<i>1,9 (1,1-2,6)</i>	<i>27,7 (25,6-29,7)</i>	<i>29,5 (27,5-31,6)</i>	<i>66,8 (64,8-68,8)</i>
Veneto	1,5 (20,2-22,9)	21,5 (20,2-22,9)	23,1 (21,7-24,4)	74,9 (73,6-76,2)	1,7 (1,3-2,2)	22,6 (21,2-24,0)	24,4 (22,9-25,8)	74,5 (73,1-76,0)
Friuli Venezia Giulia	2,8 (20,6-24,2)	22,4 (20,6-24,2)	25,2 (23,4-27,0)	71,2 (69,4-73,0)	2,4 (1,6-3,2)	23,1 (21,3-24,9)	25,5 (23,6-27,3)	72,0 (70,2-73,8)
Liguria	2,4 (24,7-28,2)	26,4 (24,7-28,2)	28,8 (27,0-30,6)	69,7 (68,0-71,4)	1,4 (0,9-1,9)	29,5 (27,8-31,2)	30,9 (29,2-32,6)	67,4 (65,8-69,1)
Emilia-Romagna	2,2 (23,1-25,7)	24,4 (23,1-25,7)	26,6 (25,3-28,0)	71,5 (70,2-72,7)	2,0 (1,4-2,5)	24,1 (22,8-25,4)	26,0 (24,7-27,3)	72,5 (71,2-73,8)
Toscana	2 (23,8-26,6)	25,2 (23,8-26,6)	27,2 (25,7-28,6)	70,7 (69,2-72,1)	1,6 (1,1-2,1)	25,6 (24,2-27,1)	27,2 (25,8-28,7)	70,8 (69,4-72,2)
Umbria	2,5 (22,9-26,7)	24,8 (22,9-26,7)	27,3 (25,3-29,3)	70,3 (68,3-72,3)	1,6 (0,9-2,3)	24,6 (22,7-26,5)	26,2 (24,3-28,1)	71,8 (69,9-73,6)
Marche	1,7 (21,0-24,2)	22,6 (21,0-24,2)	24,3 (22,7-26,0)	73,4 (71,9-75,0)	1,7 (1,2-2,3)	24,7 (23,1-26,3)	26,5 (24,8-28,1)	71,4 (69,8-72,9)
Lazio	1,6 (24,8-27,8)	26,3 (24,8-27,8)	27,8 (26,3-29,4)	68 (66,5-69,5)	1,3 (0,8-1,8)	25,6 (24,1-27,2)	26,9 (25,3-28,6)	68,4 (66,8-70,0)
Abruzzo	1,6 (29,8-33,6)	31,7 (29,8-33,6)	33,3 (31,4-35,3)	63,6 (61,7-65,5)	1,4 (0,9-1,9)	33,1 (31,2-35,0)	34,5 (32,6-36,4)	63,6 (61,7-65,5)
Molise	1,1 (25,7-29,6)	27,6 (25,7-29,6)	28,7 (26,7-30,7)	65,9 (63,9-67,9)	1,8 (1,0-2,5)	31,4 (29,2-33,7)	33,2 (30,9-35,5)	65,2 (63,0-67,5)
Campania	2 (30,6-33,4)	32 (30,6-33,4)	34 (32,6-35,4)	63,8 (62,4-65,2)	1,8 (1,3-2,3)	35,1 (33,6-36,5)	36,9 (35,4-38,3)	59,5 (58,0-60,9)
Puglia	2,1 (26,4-29,6)	28 (26,4-29,6)	30,1 (28,5-31,7)	66,2 (64,6-67,8)	1,4 (0,9-1,8)	30,0 (28,6-31,5)	31,4 (29,9-32,9)	67,4 (66,0-68,9)
Basilicata	1,9 (27,2-31,2)	29,2 (27,2-31,2)	31,1 (29,1-33,2)	65,7 (63,6-67,7)	1,8 (1,1-2,5)	32,8 (30,7-34,9)	34,6 (32,4-36,7)	63,2 (61,1-65,3)
Calabria	2 (28,5-32,1)	30,3 (28,5-32,1)	32,3 (30,5-34,1)	64 (62,2-65,8)	1,6 (1,0-2,1)	29,2 (27,3-31,1)	30,8 (28,9-32,7)	67,1 (65,2-69,0)
Sicilia	2,6 (35,4-38,4)	36,9 (35,4-38,4)	39,5 (38,0-41,0)	58,5 (57,0-60,0)	2,2 (1,7-2,8)	36,6 (35,1-38,0)	38,8 (37,3-40,3)	57,7 (56,2-59,1)
Sardegna	2,4 (28,7-32,2)	30,5 (28,7-32,2)	32,8 (31,1-34,6)	63 (61,2-64,7)	1,4 (0,8-1,9)	30,2 (28,2-32,1)	31,5 (29,6-33,5)	64,9 (63,0-66,9)
<b>Italia</b>	<b>1,9 (26,8-27,6)</b>	<b>27,2 (26,8-27,6)</b>	<b>29,1 (28,7-29,5)</b>	<b>68,2 (67,8-68,6)</b>	<b>1,7 (1,5-1,8)</b>	<b>27,7 (27,3-28,1)</b>	<b>29,4 (29,0-29,8)</b>	<b>68,0 (67,6-68,4)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat delle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2008, 2009.

**Tabella 4** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 11-18 anni per regione e genere - Anno 2008

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	19,6 (11,7-27,6)	10,2 (3,9-16,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	26,2 (10,9-41,5)	17,2 (3,3-31,2)
Lombardia	22,1 (15,1-29,0)	15,0 (8,3-21,7)
Trentino-Alto Adige	31,5 (23,2-39,7)	22,1 (13,4-30,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>33,2 (22,6-43,7)</i>	<i>33,2 (20,5-45,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>29,3 (16,6-41,9)</i>	*
Veneto	25,9 (17,2-34,5)	16,8 (9,3-24,2)
Friuli Venezia Giulia	25,3 (13,0-37,6)	*
Liguria	16,5 (7,5-25,5)	*
Emilia-Romagna	12,7 (5,3-20,1)	13,1 (5,2-21,0)
Toscana	17,4 (8,6-26,2)	15,2 (7,1-23,4)
Umbria	13,3 (2,3-24,3)	9,9 (1,0-18,9)
Marche	21,7 (12,4-31,1)	*
Lazio	16,8 (8,7-24,9)	11,8 (4,7-18,8)
Abruzzo	13,3 (5,4-21,1)	6,5 (0,7-12,2)
Molise	17,5 (7,3-27,8)	13,9 (3,7-24,1)
Campania	12,6 (7,4-17,8)	6,3 (2,4-10,2)
Puglia	19,9 (12,9-26,9)	10,0 (4,7-15,2)
Basilicata	13,8 (5,9-21,7)	13,9 (5,3-22,5)
Calabria	20,1 (11,9-28,4)	14,4 (7,2-21,6)
Sicilia	12,4 (6,6-18,2)	9,8 (4,4-15,1)
Sardegna	13,6 (5,2-22,0)	8,9 (1,8-15,9)
<b>Italia</b>	<b>18,0 (15,8-20,1)</b>	<b>11,4 (9,5-13,2)</b>

\*Dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat delle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 5** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni per regione e genere - Anno 2008

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	23,9 (21,5-26,3)	5,2 (3,8-6,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	33,3 (28,8-37,8)	4,2 (2,0-6,4)
Lombardia	20,7 (18,7-22,8)	5,8 (4,6-7,1)
Trentino-Alto Adige	30,0 (27,2-32,8)	8,6 (6,7-10,4)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>33,0 (28,9-37,1)</i>	<i>11,8 (8,9-14,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>27,1 (23,4-30,8)</i>	<i>5,5 (3,4-7,7)</i>
Veneto	24,2 (21,7-26,7)	6,0 (4,5-7,5)
Friuli Venezia Giulia	29,3 (25,7-32,9)	7,7 (5,4-10,1)
Liguria	19,2 (16,3-22,1)	5,2 (3,5-6,9)
Emilia-Romagna	22,3 (19,9-24,8)	5,0 (3,5-6,4)
Toscana	22,6 (20,0-25,2)	6,1 (4,5-7,7)
Umbria	21,8 (18,3-25,2)	6,1 (3,9-8,3)
Marche	22,7 (19,8-25,7)	2,4 (1,1-3,6)
Lazio	15,6 (13,0-18,1)	4,4 (2,8-5,9)
Abruzzo	25,7 (22,5-28,9)	3,6 (2,1-5,1)
Molise	32,6 (28,4-36,8)	5,1 (3,0-7,2)
Campania	17,7 (15,6-19,8)	4,5 (3,3-5,8)
Puglia	19,9 (17,5-22,3)	4,0 (2,8-5,3)
Basilicata	27,5 (23,8-31,1)	4,1 (2,4-5,9)
Calabria	22,5 (19,4-25,7)	4,1 (2,6-5,6)
Sicilia	11,1 (9,2-13,0)	2,4 (1,4-3,4)
Sardegna	30,3 (26,8-33,8)	4,0 (2,4-5,7)
<b>Italia</b>	<b>20,8 (20,1-21,5)</b>	<b>4,9 (4,5-5,3)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat delle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 6** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio di 19-64 anni per tipologia di comportamento a rischio, per regione e genere - Anno 2008

Regioni	Maschi				Femmine			
	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking	Entrambi i comportamenti	Consumatori a rischio	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking	Entrambi i comportamenti	Consumatori a rischio
Piemonte	7,5 (5,9-9,1)	11,7 (9,8-13,6)	4,7 (3,4-6,0)	23,9 (21,5-26,3)	2,0 (1,0-2,9)	2,5 (1,5-3,5)	0,7 (0,1-1,4)	5,2 (3,8-6,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	7,7 (5,0-10,5)	16,5 (12,9-20,2)	9,0 (6,1-12,0)	33,3 (28,8-37,8)	*	3,0 (1,1-4,9)	*	4,2 (2,0-6,4)
Lombardia	4,8 (3,6-5,9)	13,7 (11,9-15,5)	2,3 (1,4-3,1)	20,7 (18,7-22,8)	1,3 (0,6-2,0)	4,5 (3,3-5,7)	*	5,8 (4,6-7,1)
Bolzano-Bozen	2,8 (1,2-4,4)	25,7 (21,9-29,6)	4,5 (2,5-6,4)	33,0 (28,9-37,1)	1,2 (0,1-2,2)	10,3 (7,6-13,1)	*	11,8 (8,8-14,7)
Trento	4,0 (2,1-5,9)	19,1 (15,7-22,4)	4,0 (2,1-5,9)	27,1 (23,4-30,8)	*	4,6 (2,6-6,6)	-	5,5 (3,4-7,7)
Veneto	6,0 (4,5-7,4)	14,4 (12,3-16,5)	3,8 (2,6-5,0)	24,2 (21,7-26,7)	1,5 (0,7-2,3)	4,4 (3,1-5,7)	*	6,0 (4,5-7,5)
Friuli Venezia Giulia	4,8 (2,9-6,8)	21,2 (17,9-24,5)	3,2 (1,6-4,9)	29,3 (25,7-32,9)	*	6,6 (4,4-8,8)	*	7,7 (5,4-10,1)
Liguria	6,8 (4,8-8,7)	8,9 (6,7-11,1)	3,5 (2,0-5,0)	19,2 (16,3-22,1)	2,4 (1,1-3,7)	2,0 (0,9-3,2)	0,8 (0,0-1,5)	5,2 (3,5-6,9)
Emilia-Romagna	5,9 (4,3-7,4)	12,7 (10,6-14,7)	3,8 (2,5-5,1)	22,3 (19,9-24,8)	1,2 (0,4-2,0)	3,6 (2,3-4,9)	*	5,0 (3,5-6,4)
Toscana	9,4 (7,4-11,3)	9,0 (7,1-10,9)	4,3 (2,8-5,7)	22,6 (20,0-25,2)	2,8 (1,6-4,0)	2,9 (1,7-4,1)	*	6,1 (4,5-7,7)
Umbria	7,9 (5,5-10,3)	11,3 (8,5-14,1)	2,6 (1,0-4,2)	21,8 (18,3-25,2)	2,6 (1,0-4,2)	3,3 (1,6-5,0)	*	6,1 (3,9-8,3)
Marche	7,1 (5,2-9,0)	13,1 (10,6-15,5)	2,6 (1,3-3,9)	22,7 (19,8-25,7)	*	1,6 (0,5-2,6)	*	2,4 (1,1-3,6)
Lazio	5,1 (3,4-6,7)	7,8 (5,9-9,8)	2,6 (1,4-3,9)	15,6 (13,0-18,1)	1,5 (0,5-2,5)	2,4 (1,2-3,6)	*	4,4 (2,8-5,9)
Abruzzo	4,8 (3,1-6,4)	14,2 (11,6-16,9)	6,7 (4,8-8,6)	25,7 (22,5-28,9)	*	2,9 (1,6-4,2)	*	3,6 (2,1-5,1)
Molise	8,3 (5,7-10,9)	15,2 (11,9-18,6)	9,1 (6,4-11,8)	32,6 (28,4-36,8)	*	3,8 (1,9-5,7)	*	5,1 (3,0-7,2)
Campania	3,9 (2,7-5,0)	10,4 (8,6-12,1)	3,4 (2,3-4,6)	17,7 (15,6-19,8)	1,4 (0,7-2,2)	3,0 (1,9-4,0)	*	4,5 (3,3-5,8)
Puglia	8,1 (6,4-9,8)	8,9 (7,1-10,6)	3,0 (1,8-4,1)	19,9 (17,5-22,3)	1,1 (0,4-1,8)	2,8 (1,7-3,9)	*	4,0 (2,8-5,3)
Basilicata	5,5 (3,5-7,5)	13,4 (10,5-16,3)	8,6 (6,2-11,0)	27,5 (23,8-31,1)	0,9 (0,0-1,7)	2,8 (1,3-4,3)	*	4,1 (2,4-5,9)
Calabria	4,2 (2,7-5,8)	14,1 (11,5-16,8)	4,2 (2,6-5,7)	22,5 (19,4-25,7)	1,0 (0,2-1,7)	3,0 (1,7-4,4)	*	4,1 (2,6-5,6)
Sicilia	3,7 (2,4-4,9)	5,8 (4,3-7,2)	1,7 (0,8-2,6)	11,1 (9,2-13,0)	0,5 (0,0-1,1)	1,7 (0,9-2,6)	*	2,4 (1,4-3,4)
Sardegna	7,7 (5,5-9,9)	17,6 (14,6-20,6)	5,0 (3,2-6,9)	30,3 (26,8-33,8)	*	3,2 (1,7-4,7)	*	4,0 (2,4-5,7)
<b>Italia</b>	<b>5,7 (5,3-6,2)</b>	<b>11,7 (11,1-12,2)</b>	<b>3,4 (3,1-3,8)</b>	<b>20,8 (20,1-21,5)</b>	<b>1,4 (1,1-1,6)</b>	<b>3,3 (2,9-3,6)</b>	<b>0,3 (0,1-0,4)</b>	<b>4,9 (4,5-5,3)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati: Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat delle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 7** - Prevalenza (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 65 anni ed oltre per regione e genere - Anno 2008

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Piemonte	52,6 (47,3-57,8)	14,8 (11,4-18,1)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	60,8 (51,2-70,4)	12,0 (6,2-17,8)
Lombardia	51,2 (46,0-56,4)	13,9 (10,8-17,1)
Trentino-Alto Adige	52,2 (45,4-58,9)	11,1 (7,2-14,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>50,8 (41,3-60,4)</i>	<i>9,3 (4,3-14,3)</i>
<i>Trento</i>	<i>53,4 (44,2-62,6)</i>	<i>12,6 (7,1-18,0)</i>
Veneto	51,9 (45,7-58,0)	13,9 (10,2-17,6)
Friuli Venezia Giulia	46,5 (38,8-54,3)	17,0 (12,0-22,0)
Liguria	50,3 (44,2-56,3)	14,3 (10,6-18,0)
Emilia-Romagna	52,1 (46,5-57,7)	10,0 (6,9-13,1)
Toscana	50,1 (44,3-55,9)	17,1 (13,2-21,0)
Umbria	50,0 (42,4-57,7)	11,6 (7,1-16,2)
Marche	52,1 (45,6-58,7)	12,1 (8,2-16,1)
Lazio	36,7 (29,8-43,6)	9,6 (5,9-13,4)
Abruzzo	47,6 (40,6-54,6)	9,0 (5,4-12,6)
Molise	58,4 (50,0-66,8)	13,3 (8,1-18,4)
Campania	32,1 (26,0-38,1)	5,5 (2,8-8,2)
Puglia	50,8 (44,6-57,1)	12,7 (9,0-16,5)
Basilicata	59,0 (51,1-66,8)	8,2 (4,1-12,3)
Calabria	42,4 (35,1-49,8)	4,6 (1,7-7,5)
Sicilia	26,4 (20,9-31,9)	3,0 (0,9-5,1)
Sardegna	41,0 (32,7-49,2)	4,9 (1,4-8,3)
<b>Italia</b>	<b>46,0 (44,3-47,7)</b>	<b>11,2 (10,2-12,2)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat delle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 8** - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2008

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r>0)					Indicatore obiettivo
	Verdure*	Ortaggi*	Formaggio*	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 2-4 <sup>a</sup>	Dolci <sup>o</sup>	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 5 e più <sup>a</sup>
Trento	65,4 (57,9-73,0)	51,8 (43,8-59,8)	38,2 (30,3-46,1)	75,7 (68,2-83,2)	47,6 (39,5-55,6)	8,1 (2,5-13,7)
Friuli Venezia Giulia	66,0 (59,0-73,1)	46,9 (39,4-54,5)	30,2 (23,0-37,3)	77,3 (70,5-84,1)	50,8 (43,2-58,3)	7,4 (2,5-12,2)
Piemonte	63,1 (58,1-68,0)	54,5 (49,4-59,7)	33,0 (28,0-37,9)	78,5 (74,1-82,9)	49,9 (44,7-55,1)	7,0 (3,8-10,2)
Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste	61,5 (52,6-70,3)	53,3 (44,1-62,4)	49,2 (40,0-58,4)	79,0 (71,1-87,0)	49,2 (40,0-58,4)	6,7 (1,0-12,3)
Campania	42,2 (37,1-47,3)	33,7 (28,7-38,6)	11,3 (7,8-14,8)	71,6 (66,5-76,6)	44,2 (39,1-49,3)	6,6 (3,5-9,7)
<b>4* QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 6,5</b>						
Trentino-Alto Adige	61,4 (55,8-67,0)	47,7 (41,9-53,5)	42,3 (36,6-48,1)	73,5 (67,9-79,2)	49,1 (43,3-54,9)	6,5 (3,0-10,1)
Abruzzo	45,3 (38,7-52,0)	42,6 (36,0-49,3)	14,3 (9,4-19,2)	74,5 (68,3-80,8)	52,3 (45,6-58,9)	6,3 (2,5-10,1)
Veneto	60,0 (54,6-65,4)	47,5 (42,0-53,0)	29,7 (24,5-34,8)	74,9 (69,7-80,1)	58,2 (52,8-63,6)	6,1 (2,9-9,2)
Lazio	61,3 (55,2-67,4)	46,5 (40,1-52,8)	17,5 (12,4-22,6)	77,2 (71,5-82,9)	42,2 (35,9-48,5)	6,1 (2,3-9,8)
Liguria	53,1 (46,7-59,5)	45,4 (39,0-51,8)	20,8 (15,3-26,3)	78,5 (72,8-84,2)	45,0 (38,5-51,4)	5,8 (2,1-9,6)
Sardegna	47,2 (39,8-54,5)	41,1 (33,8-48,4)	30,5 (23,6-37,4)	74,3 (67,3-81,2)	48,2 (40,9-55,6)	5,8 (1,6-10,0)
<b>Italia</b>	<b>51,0 (49,4-52,6)</b>	<b>42,4 (40,8-44,0)</b>	<b>23,6 (22,2-25,0)</b>	<b>75,9 (74,4-77,3)</b>	<b>48,6 (47,0-50,2)</b>	<b>5,7 (4,7-6,6)</b>
Lombardia	51,5 (46,8-56,2)	43,3 (38,5-48,0)	29,3 (24,9-33,7)	74,9 (70,4-79,4)	51,1 (46,4-55,9)	5,5 (2,8-8,2)
Emilia-Romagna	55,3 (49,9-60,7)	47,8 (42,3-53,3)	21,5 (16,7-26,3)	77,9 (73,0-82,7)	54,3 (48,8-59,7)	5,5 (2,2-8,7)
Toscana	53,3 (47,5-59,1)	48,5 (42,7-54,3)	22,2 (17,2-27,2)	79,7 (74,7-84,7)	45,8 (40,0-51,6)	5,1 (1,9-8,3)
Umbria	54,5 (46,8-62,1)	44,8 (37,1-52,6)	17,8 (11,5-24,1)	78,8 (72,1-85,4)	54,7 (47,0-62,4)	5,0 (0,8-9,3)
Molise	39,7 (31,5-47,9)	32,7 (24,8-40,6)	17,0 (10,5-23,5)	73,9 (66,3-81,6)	49,7 (41,4-58,0)	5,0 (0,8-9,2)
Bolzano-Bozen	57,2 (49,2-65,2)	43,5 (35,4-51,5)	46,6 (38,5-54,7)	71,2 (63,1-79,3)	50,6 (42,5-58,7)	4,9 (0,6-9,1)
<b>1* QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 4,7</b>						
Sicilia	39,3 (34,0-44,6)	33,0 (27,9-38,2)	22,7 (18,0-27,3)	75,8 (70,8-80,8)	43,1 (37,8-48,5)	4,7 (1,8-7,6)
Puglia	34,0 (28,8-39,3)	30,9 (25,8-36,0)	20,7 (16,2-25,3)	73,8 (68,8-78,9)	45,3 (39,9-50,7)	4,6 (1,9-7,4)
Marche	56,8 (50,4-63,2)	46,4 (39,9-52,9)	13,5 (8,7-18,3)	79,8 (74,2-85,4)	52,8 (46,3-59,3)	4,5 (1,1-8,0)
Basilicata	30,1 (23,1-37,1)	27,5 (20,6-34,3)	17,9 (11,9-23,9)	70,3 (62,8-77,8)	47,7 (40,1-55,2)	4,4 (0,6-8,2)
Calabria	39,9 (33,3-46,5)	31,8 (25,5-38,1)	30,3 (24,0-36,5)	75,6 (69,4-81,9)	48,4 (41,7-55,1)	4,1 (1,0-7,2)

\*Almeno una volta al giorno. °Almeno qualche volta alla settimana. <sup>a</sup>Per 100 persone di 3 anni ed oltre della stessa zona che consumano verdure, ortaggi o frutta almeno una volta al giorno.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 8** - (segue) *Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2008*

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione discordante rispetto all'indicatore obiettivo (r<0)						
	Carni bianche <sup>o</sup>	Verdure, ortaggi o frutta*	Carni bovine <sup>o</sup>	Latte*	Carni di maiale <sup>o</sup>	Legumi in scatola <sup>o</sup>	Frutta*
Trento	75,4 (68,7-82,2)	82,9 (77,1-88,8)	63,8 (56,2-71,4)	56,5 (48,6-64,4)	49,2 (41,2-57,2)	42,5 (34,5-50,5)	71,5 (64,4-78,6)
Friuli Venezia Giulia	74,4 (67,9-80,8)	85,6 (80,4-90,8)	63,2 (56,0-70,4)	61,0 (53,7-68,3)	45,1 (37,6-52,7)	34,4 (27,1-41,7)	73,4 (66,9-80,0)
Piemonte	83,3 (79,5-87,1)	90,2 (87,2-93,2)	73,7 (69,2-78,2)	58,3 (53,2-63,3)	38,2 (33,1-43,3)	32,0 (27,0-36,9)	81,4 (77,4-85,3)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	79,5 (72,2-86,8)	86,1 (79,9-92,3)	75,4 (67,6-83,2)	60,7 (51,8-69,5)	36,1 (27,1-45,0)	33,6 (24,8-42,5)	76,2 (68,6-83,9)
Campania	82,3 (78,5-86,1)	83,1 (79,3-86,9)	75,2 (70,8-79,5)	55,6 (50,5-60,7)	54,9 (49,9-60,0)	70,6 (66,0-75,2)	76,3 (72,0-80,6)
<b>4° QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 6,5</b>							
Trentino-Alto Adige	62,8 (57,3-68,4)	82,5 (78,2-86,8)	54,9 (49,1-60,6)	60,1 (54,5-65,8)	40,7 (34,9-46,4)	32,2 (26,7-37,7)	68,3 (63,0-73,7)
Abruzzo	84,4 (79,6-89,2)	85,1 (80,4-89,8)	74,8 (69,0-80,5)	64,8 (58,4-71,1)	52,3 (45,6-58,9)	53,5 (46,8-60,1)	79,0 (73,7-84,4)
Veneto	80,5 (76,2-84,8)	85,0 (81,1-88,9)	70,4 (65,4-75,4)	58,1 (52,7-63,6)	43,6 (38,1-49,1)	30,0 (24,9-35,2)	70,9 (66,0-75,9)
Lazio	78,3 (73,2-83,4)	85,6 (81,3-90,0)	72,8 (67,3-78,4)	69,1 (63,3-74,9)	46,7 (40,4-53,1)	43,5 (37,2-49,8)	76,7 (71,5-82,0)
Liguria	76,6 (71,2-81,9)	85,2 (80,7-89,7)	69,4 (63,5-75,2)	59,6 (53,3-65,8)	33,2 (27,0-39,3)	29,5 (23,4-35,5)	78,7 (73,5-83,9)
Sardegna	79,0 (73,1-84,9)	84,9 (79,7-90,1)	68,7 (62,0-75,5)	61,7 (54,6-68,8)	58,2 (51,0-65,4)	38,9 (31,7-46,1)	77,2 (71,2-83,3)
<b>Italia</b>	<b>79,9 (78,6-81,1)</b>	<b>85,1 (84,0-86,2)</b>	<b>71,2 (69,8-72,6)</b>	<b>59,6 (58,1-61,2)</b>	<b>46,1 (44,5-47,7)</b>	<b>44,2 (42,7-45,8)</b>	<b>76,8 (75,5-78,1)</b>
Lombardia	80,7 (77,0-84,3)	82,8 (79,3-86,3)	69,9 (65,6-74,1)	55,6 (51,0-60,3)	41,1 (36,4-45,8)	35,4 (30,8-40,0)	73,0 (68,9-77,1)
Emilia-Romagna	80,0 (75,8-84,3)	86,2 (82,5-89,8)	68,8 (63,8-73,8)	53,3 (47,8-58,8)	48,5 (43,0-54,0)	35,8 (30,4-41,2)	76,0 (71,5-80,6)
Toscana	84,0 (79,9-88,2)	85,6 (81,6-89,6)	75,8 (71,0-80,7)	65,0 (59,5-70,5)	51,3 (45,5-57,1)	49,9 (44,1-55,7)	76,3 (71,5-81,1)
Umbria	87,4 (82,4-92,4)	88,6 (83,8-93,4)	76,9 (70,6-83,3)	61,6 (54,2-69,1)	61,4 (54,0-68,9)	52,5 (44,8-60,2)	81,3 (75,4-87,2)
Molise	80,8 (74,3-87,2)	89,7 (84,8-94,7)	67,3 (59,6-75,0)	63,5 (55,5-71,4)	54,5 (46,2-62,7)	55,4 (47,2-63,7)	84,9 (79,1-90,8)
Bolzano-Bozen	49,8 (41,7-57,9)	82,1 (75,9-88,2)	45,6 (37,5-53,7)	63,9 (56,2-71,7)	31,9 (24,2-39,5)	21,5 (14,7-28,4)	65,0 (57,3-72,7)
<b>1° QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 4,7</b>							
Sicilia	78,0 (73,7-82,3)	82,7 (78,8-86,7)	73,8 (69,2-78,5)	56,3 (51,0-61,5)	42,1 (36,8-47,4)	47,3 (42,0-52,7)	79,3 (75,0-83,5)
Puglia	72,8 (68,0-77,6)	87,8 (84,3-91,3)	62,9 (57,7-68,1)	68,2 (63,2-73,2)	43,5 (38,1-49,0)	55,4 (50,0-60,8)	83,9 (80,0-87,8)
Marche	85,1 (80,5-89,6)	85,7 (81,2-90,1)	76,2 (70,8-81,7)	61,4 (55,1-67,6)	52,0 (45,5-58,5)	39,0 (32,6-45,5)	78,2 (72,9-83,4)
Basilicata	79,3 (73,3-85,3)	83,1 (77,6-88,7)	73,0 (66,4-79,6)	56,3 (48,9-63,8)	49,9 (42,4-57,4)	64,9 (57,7-72,0)	77,7 (71,6-83,9)
Calabria	80,6 (75,4-85,9)	85,2 (80,5-89,9)	73,3 (67,5-79,2)	57,4 (50,8-64,0)	53,3 (46,6-60,0)	65,8 (59,5-72,1)	80,3 (75,0-85,6)

\*Almeno una volta al giorno. <sup>o</sup>Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 8** - (segue) *Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona e Intervalli di Confidenza al 95%) per consumo di alcuni cibi, per regione - Anno 2008*

Regioni	Gruppi di alimenti con distribuzione discordante rispetto all'indicatore obiettivo (r<0)					
	Pane, pasta, riso*	Pesce°	Salumi°	Snack°	Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate al giorno: 1ª	Uova°
Trento	85,0 (79,4-90,5)	46,5 (38,5-54,6)	63,6 (56,0-71,2)	16,5 (10,1-22,9)	15,9 (8,8-23,0)	48,2 (40,1-56,2)
Friuli Venezia Giulia	81,9 (76,2-87,5)	46,7 (39,1-54,2)	57,2 (49,7-64,6)	17,7 (11,6-23,8)	15,2 (8,9-21,6)	48,1 (40,6-55,7)
Piemonte	83,6 (79,8-87,3)	53,7 (48,5-58,8)	57,9 (52,8-63,0)	20,1 (15,7-24,4)	14,0 (9,9-18,2)	60,0 (54,9-65,0)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	86,9 (80,8-92,9)	48,4 (39,2-57,6)	63,9 (55,2-72,7)	18,9 (11,3-26,4)	13,3 (6,0-20,7)	56,6 (47,5-65,6)
Campania	87,6 (84,3-90,9)	68,3 (63,6-73,0)	61,9 (56,9-66,8)	31,2 (26,4-36,1)	20,9 (16,1-25,7)	60,5 (55,6-65,5)
<b>4* QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 6,5</b>						
Trentino-Alto Adige	80,4 (75,9-85,0)	39,3 (33,6-45,1)	64,3 (58,8-69,8)	16,6 (12,0-21,1)	19,7 (14,3-25,1)	49,5 (43,7-55,3)
Abruzzo	89,8 (85,8-93,7)	59,4 (52,9-65,9)	68,0 (61,8-74,2)	25,2 (19,3-31,2)	18,8 (12,9-24,7)	59,9 (53,3-66,4)
Veneto	86,0 (82,2-89,8)	48,8 (43,3-54,3)	60,9 (55,5-66,3)	26,9 (21,9-31,9)	18,5 (13,6-23,3)	49,4 (43,9-54,9)
Lazio	83,2 (78,6-87,8)	61,5 (55,4-67,6)	55,7 (49,4-61,9)	21,8 (16,3-27,3)	15,9 (10,5-21,3)	60,6 (54,5-66,7)
Liguria	86,0 (81,6-90,3)	57,6 (51,3-63,9)	57,0 (50,7-63,3)	15,8 (10,8-20,7)	14,9 (9,5-20,3)	57,6 (51,3-63,9)
Sardegna	83,9 (78,6-89,2)	61,5 (54,4-68,6)	53,1 (45,8-60,4)	25,8 (19,1-32,4)	19,0 (12,4-25,6)	55,3 (48,0-62,6)
<b>Italia</b>	<b>85,6 (84,5-86,7)</b>	<b>57,5 (55,9-59,1)</b>	<b>61,9 (60,3-63,4)</b>	<b>24,2 (22,8-25,6)</b>	<b>17,8 (16,4-19,3)</b>	<b>56,3 (54,7-57,8)</b>
Lombardia	81,4 (77,8-85,0)	51,6 (46,9-56,3)	67,0 (62,6-71,4)	25,4 (21,1-29,6)	18,6 (14,3-23,0)	51,2 (46,5-55,9)
Emilia-Romagna	86,7 (83,1-90,4)	53,3 (47,8-58,7)	65,7 (60,5-70,8)	21,1 (16,3-25,8)	16,4 (11,6-21,2)	50,9 (45,4-56,4)
Toscana	86,7 (82,9-90,6)	57,2 (51,5-62,9)	56,4 (50,7-62,1)	18,6 (13,8-23,3)	14,7 (9,9-19,5)	52,7 (47,0-58,5)
Umbria	88,9 (84,2-93,7)	62,7 (55,3-70,1)	69,4 (62,4-76,4)	19,3 (12,8-25,8)	15,9 (9,4-22,5)	57,3 (49,7-64,9)
Molise	89,1 (84,0-94,2)	54,5 (46,2-62,7)	66,7 (58,9-74,4)	27,9 (20,3-35,5)	20,0 (12,7-27,3)	59,9 (51,8-68,0)
Bolzano-Bozen	75,7 (68,9-82,6)	32,1 (24,4-39,8)	65,0 (57,3-72,7)	16,9 (10,6-23,2)	23,7 (15,8-31,5)	50,8 (42,7-59,0)
<b>1* QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 4,7</b>						
Sicilia	89,0 (85,8-92,3)	62,2 (57,1-67,3)	60,7 (55,5-65,9)	27,4 (22,5-32,3)	19,1 (14,2-24,0)	62,6 (57,5-67,7)
Puglia	85,0 (81,2-88,8)	59,7 (54,4-65,0)	61,5 (56,2-66,7)	25,5 (20,6-30,4)	21,1 (16,1-26,0)	57,1 (51,7-62,4)
Marche	91,4 (87,8-94,9)	65,6 (59,5-71,7)	69,0 (63,1-74,9)	20,0 (14,5-25,5)	14,8 (9,3-20,2)	59,5 (53,2-65,9)
Basilicata	90,1 (85,7-94,5)	65,4 (58,3-72,5)	68,3 (61,4-75,3)	27,5 (20,6-34,3)	24,9 (17,5-32,3)	61,0 (53,8-68,3)
Calabria	92,8 (89,3-96,2)	67,0 (60,8-73,3)	68,3 (62,1-74,5)	31,1 (24,8-37,3)	19,9 (13,9-25,8)	65,9 (59,6-72,3)

\*Almeno una volta al giorno. °Almeno qualche volta alla settimana. °Per 100 persone di 3 anni ed oltre della stessa zona che consumano verdure, ortaggi o frutta almeno una volta al giorno.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.



**Tabella 9** - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2008

Regioni	Persone in sovrappeso	Persone obese
Piemonte	33,3 (31,8-34,7)	8,7 (7,7-9,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	31,7 (29,2-34,3)	11,5 (9,7-13,4)
Lombardia	33,0 (31,7-34,3)	9,6 (8,7-10,5)
Trentino-Alto Adige	32,0 (30,3-33,6)	8,4 (7,3-9,4)
Bolzano-Bozen	31,6 (29,2-34,0)	6,9 (5,5-8,3)
Trento	32,3 (30,1-34,5)	9,7 (8,2-11,2)
Veneto	33,4 (31,8-35,1)	8,9 (7,8-9,9)
Friuli Venezia Giulia	34,5 (32,4-36,5)	10,4 (8,9-11,8)
Liguria	31,5 (29,7-33,2)	9,8 (8,6-11,0)
Emilia-Romagna	35,0 (33,5-36,5)	11,5 (10,5-12,6)
Toscana	35,9 (34,3-37,5)	9,1 (8,1-10,2)
Umbria	37,0 (34,8-39,1)	11,4 (9,9-12,9)
Marche	35,3 (33,5-37,1)	9,8 (8,6-11,0)
Lazio	34,4 (32,7-36,2)	9,0 (7,8-10,2)
Abruzzo	37,6 (35,6-39,6)	10,6 (9,2-11,9)
Molise	40,1 (37,6-42,6)	11,2 (9,5-12,9)
Campania	39,7 (38,2-41,3)	11,5 (10,5-12,6)
Puglia	39,6 (37,9-41,2)	10,9 (9,8-12,0)
Basilicata	41,0 (38,7-43,3)	11,2 (9,7-12,8)
Calabria	37,1 (35,0-39,2)	11,1 (9,7-12,5)
Sicilia	39,5 (37,9-41,1)	9,1 (8,1-10,2)
Sardegna	32,3 (30,2-34,4)	10,3 (8,9-11,7)
<b>Italia</b>	<b>35,5 (35,1-36,0)</b>	<b>9,9 (9,6-10,2)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 10** - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in sovrappeso ed obese per classe di età e genere - Anno 2008

Classi di età	Persone in sovrappeso			Persone obese		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
18-24	22,3 (19,8-24,7)	10,3 (8,4-12,3)	16,4 (14,9-17,9)	2,3 (1,3-3,4)	1,9 (0,9-2,9)	2,1 (1,4-2,8)
25-34	33,4 (31,5-35,3)	14,4 (12,9-15,9)	24,2 (23,0-25,4)	6,0 (4,9-7,0)	3,2 (2,4-4,1)	4,6 (4,0-5,3)
35-44	45,3 (43,6-47,0)	18,5 (17,1-19,9)	31,7 (30,6-32,8)	9,5 (8,4-10,7)	5,2 (4,4-6,1)	7,4 (6,7-8,0)
45-54	50,5 (48,5-52,5)	27,5 (25,8-29,3)	38,7 (37,4-40,0)	12,8 (11,4-14,3)	9,9 (8,6-11,1)	11,3 (10,4-12,2)
55-64	52,2 (50,1-54,3)	37,5 (35,5-39,5)	44,8 (43,4-46,2)	16,2 (14,6-17,8)	14,2 (12,7-15,8)	15,2 (14,2-16,3)
65-74	53,7 (51,4-56,0)	40,4 (38,3-42,6)	46,5 (45,0-48,0)	15,5 (13,7-17,4)	14,4 (12,8-16,0)	14,9 (13,8-16,1)
75 ed oltre	50,7 (47,8-53,7)	39,3 (37,2-41,5)	43,6 (42,0-45,3)	11,2 (9,2-13,3)	14,1 (12,4-15,7)	13,0 (11,8-14,2)
<b>Totale</b>	<b>44,6 (43,9-45,3)</b>	<b>27,1 (26,5-27,7)</b>	<b>35,5 (35,1-36,0)</b>	<b>10,8 (10,3-11,2)</b>	<b>9,1 (8,7-9,5)</b>	<b>9,9 (9,6-10,2)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 11** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2008

Regioni	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
Piemonte	24,7 (23,4-25,9)	12,5 (11,5-13,5)	31,8 (30,5-33,1)	29,9 (28,6-31,2)	1,1 (0,8-1,5)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	27,0 (24,8-29,3)	14,8 (12,9-16,6)	25,4 (23,2-27,6)	32,8 (30,5-35,1)	n.d.
Lombardia	25,9 (24,7-27,0)	12,0 (11,1-12,9)	30,9 (29,7-32,1)	30,2 (29,0-31,4)	1,0 (0,7-1,3)
Trentino-Alto Adige	33,5 (32,0-35,1)	18,6 (17,3-19,9)	32,9 (31,4-34,4)	14,3 (13,1-15,5)	0,5 (0,2-0,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	42,0 (39,7-44,3)	20,0 (18,1-21,9)	23,2 (21,2-25,2)	14,1 (12,5-15,8)	0,6 (0,2-1,1)
<i>Trento</i>	25,4 (23,5-27,3)	17,3 (15,6-18,9)	42,5 (40,4-44,5)	14,4 (12,9-16,0)	0,4 (0,0-0,8)
Veneto	26,9 (25,5-28,3)	11,3 (10,3-12,4)	34,3 (32,8-35,8)	26,9 (25,5-28,3)	0,5 (0,3-0,8)
Friuli Venezia Giulia	24,0 (22,3-25,8)	11,3 (10,0-12,7)	35,8 (33,9-37,7)	28,4 (26,6-30,3)	0,4 (0,1-0,8)
Liguria	21,1 (19,6-22,6)	8,2 (7,1-9,2)	28,6 (27,0-30,2)	41,1 (39,4-42,8)	0,9 (0,5-1,3)
Emilia-Romagna	24,7 (23,5-26,0)	10,9 (9,9-11,9)	33,5 (32,2-34,9)	30,5 (29,2-31,8)	0,3 (0,1-0,6)
Toscana	22,0 (20,7-23,3)	8,8 (7,8-9,7)	31,9 (30,5-33,4)	36,8 (35,3-38,3)	0,4 (0,2-0,7)
Umbria	19,9 (18,2-21,6)	11,2 (9,8-12,6)	28,6 (26,7-30,5)	39,9 (37,9-41,9)	0,5 (0,1-0,9)
Marche	22,5 (21,0-24,0)	9,6 (8,5-10,7)	27,1 (25,5-28,6)	40,4 (38,7-42,1)	0,5 (0,1-0,8)
Lazio	23,2 (21,7-24,7)	8,6 (7,6-9,6)	22,9 (21,5-24,4)	44,4 (42,7-46,0)	0,9 (0,5-1,3)
Abruzzo	18,5 (17,0-20,0)	7,7 (6,6-8,8)	26,7 (25,0-28,4)	46,4 (44,5-48,3)	0,8 (0,4-1,2)
Molise	17,6 (15,8-19,5)	8,7 (7,2-10,1)	26,6 (24,5-28,7)	46,2 (43,8-48,5)	1,0 (0,4-1,5)
Campania	15,1 (14,1-16,2)	5,9 (5,1-6,6)	23,8 (22,5-25,0)	53,9 (52,5-55,3)	1,3 (1,0-1,7)
Puglia	15,8 (14,6-16,9)	9,3 (8,4-10,3)	24,3 (22,9-25,6)	49,9 (48,4-51,4)	0,7 (0,4-1,0)
Basilicata	17,7 (16,1-19,4)	6,6 (5,5-7,7)	29,4 (27,4-31,3)	45,7 (43,6-47,8)	0,7 (0,3-1,1)
Calabria	16,3 (14,8-17,8)	7,3 (6,3-8,4)	20,7 (19,1-22,3)	54,6 (52,7-56,6)	1,0 (0,6-1,5)
Sicilia	13,8 (12,7-14,8)	7,5 (6,6-8,3)	16,0 (14,9-17,1)	61,8 (60,4-63,1)	1,0 (0,6-1,4)
Sardegna	20,5 (18,8-22,2)	7,9 (6,7-9,1)	26,9 (25,1-28,8)	44,3 (42,3-46,3)	0,4 (0,1-0,8)
<b>Italia</b>	<b>21,6 (21,2-21,9)</b>	<b>9,7 (9,4-10,0)</b>	<b>27,7 (27,3-28,1)</b>	<b>40,2 (39,8-40,6)</b>	<b>0,8 (0,7-0,9)</b>

n.d. = non disponibile.

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 12** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per classe di età. Maschi - Anno 2008

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
3-5	16,6 (12,8-20,4)	5,1 (2,7-7,5)	22,9 (18,7-27,1)	49,4 (44,7-54,2)	6,1 (3,4-8,6)
6-10	57,5 (53,9-61,0)	9,0 (6,7-11,3)	13,5 (10,8-16,1)	18,4 (15,4-21,3)	1,8 (0,6-3,0)
11-14	64,1 (60,4-67,9)	8,9 (6,3-11,4)	11,6 (8,8-14,4)	14,7 (11,7-17,7)	*
15-17	53,8 (49,3-58,3)	17,8 (14,1-21,5)	12,4 (9,2-15,7)	15,6 (12,1-19,1)	*
18-19	47,8 (41,7-53,9)	17,3 (12,4-22,2)	12,9 (8,5-17,3)	20,9 (15,7-26,1)	*
20-24	43,1 (39,8-46,5)	17,3 (14,5-20,0)	14,4 (11,8-17,0)	23,9 (20,8-26,9)	1,3 (0,3-2,3)
25-34	33,3 (31,4-35,2)	16,4 (14,8-17,9)	19,1 (17,5-20,8)	30,3 (28,5-32,2)	0,9 (0,4-1,4)
35-44	23,2 (21,7-24,8)	1,6 (1,0-2,1)	25,1 (23,6-26,7)	35,2 (33,5-36,8)	0,6 (0,2-1,0)
45-54	19,2 (17,6-20,9)	13,8 (12,3-15,3)	29,2 (27,3-31,0)	37,4 (35,4-39,3)	0,4 (0,0-0,7)
55-59	14,9 (12,5-17,2)	10,4 (8,3-12,4)	34,7 (31,7-37,6)	39,7 (36,7-42,7)	*
60-64	12,4 (10,1-14,7)	8,8 (6,8-10,8)	38,4 (35,2-41,5)	40,3 (37,1-43,4)	*
65-74	8,7 (7,2-10,1)	6,0 (4,7-7,3)	42,9 (40,6-45,3)	41,8 (39,5-44,2)	0,6 (0,1-1,1)
75 ed oltre	3,5 (2,2-4,7)	2,2 (1,1-3,2)	30,4 (27,7-33,2)	63,5 (60,7-66,3)	*
<b>Totale</b>	<b>25,8 (25,2-26,4)</b>	<b>12,0 (11,6-12,5)</b>	<b>26,1 (25,5-26,6)</b>	<b>35,3 (34,7-35,9)</b>	<b>0,8 (0,7-1,0)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 13** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per classe di età. Femmine - Anno 2008

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
3-5	22,0 (17,8-26,2)	3,1 (1,1-5,1)	19,9 (15,8-24,0)	48,8 (43,9-53,6)	6,3 (3,6-9,0)
6-10	52,4 (48,7-56,1)	6,3 (4,2-8,4)	15,8 (12,9-18,7)	24,0 (20,7-27,4)	1,4 (0,3-2,6)
11-14	49,6 (45,5-53,6)	9,7 (7,0-12,3)	18,0 (14,7-21,3)	21,2 (17,7-24,7)	1,6 (0,3-2,8)
15-17	35,3 (30,7-40,0)	11,6 (8,3-15,0)	23,8 (19,6-28,1)	27,9 (23,4-32,3)	*
18-19	26,2 (20,9-31,4)	13,5 (9,2-17,8)	27,6 (22,2-32,9)	32,6 (27,0-38,1)	n.d.
20-24	25,2 (22,0-28,5)	12,8 (10,2-15,4)	28,5 (25,2-31,8)	32,5 (29,1-35,9)	1,0 (0,1-1,9)
25-34	21,1 (19,3-22,8)	11,2 (9,8-12,6)	30,4 (28,5-32,3)	36,5 (34,5-38,5)	0,9 (0,4-1,4)
35-44	16,8 (15,4-18,2)	10,4 (9,3-11,5)	31,6 (29,9-33,2)	40,7 (39,0-42,4)	0,6 (0,2-0,9)
45-54	13,8 (12,4-15,3)	8,0 (6,8-9,2)	34,5 (32,6-36,4)	43,3 (41,3-45,2)	0,4 (0,1-0,8)
55-59	12,0 (9,8-14,1)	6,2 (4,6-7,9)	37,4 (34,5-40,4)	44,2 (41,2-47,1)	*
60-64	9,5 (7,5-11,6)	4,9 (3,3-6,5)	37,6 (34,5-40,7)	47,2 (44,0-50,4)	0,7 (0,0-1,4)
65-74	7,4 (6,2-8,7)	2,7 (1,9-3,6)	33,7 (31,6-35,7)	55,7 (53,6-57,8)	0,5 (0,1-0,9)
75 ed oltre	1,6 (0,9-2,3)	1,8 (1,1-2,6)	17,5 (15,7-19,3)	78,6 (76,8-80,3)	0,5 (0,1-1,0)
<b>Totale</b>	<b>17,6 (17,1-18,1)</b>	<b>7,5 (7,2-7,9)</b>	<b>29,2 (28,6-29,8)</b>	<b>44,9 (44,3-45,5)</b>	<b>0,8 (0,7-1,0)</b>

n.d. = non disponibile.

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 14** - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) che praticano sport o attività fisica per classe di età. Totale - Anno 2008

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
3-5	19,2 (16,5-21,9)	4,1 (2,6-5,6)	21,4 (18,6-24,1)	49,1 (45,9-6,5)	6,2 (4,4-8,0)
6-10	55,0 (52,6-57,5)	7,7 (6,2-9,1)	14,6 (12,7-16,4)	21,1 (19,0-6,4)	1,6 (0,8-2,4)
11-14	57,0 (54,3-59,6)	9,3 (7,5-11,0)	14,7 (12,7-16,8)	17,9 (15,7-6,9)	1,2 (0,4-1,9)
15-17	45,0 (41,9-48,1)	14,9 (12,5-17,3)	17,9 (15,3-20,4)	21,4 (18,8-7,1)	0,8 (0,0-1,5)
18-19	36,6 (32,7-40,5)	15,4 (12,3-18,4)	20,6 (17,2-23,9)	27,0 (23,4-8,2)	*
20-24	34,5 (32,3-36,8)	15,1 (13,3-16,9)	21,2 (19,2-23,2)	28,0 (25,9-4,7)	1,1 (0,5-1,8)
25-34	27,3 (26,1-28,6)	13,9 (12,9-14,9)	24,6 (23,4-25,8)	33,3 (32,0-2,4)	0,9 (0,5-1,2)
35-44	20,0 (19,0-20,9)	13,1 (12,3-14,0)	28,4 (27,3-29,5)	38,0 (36,8-1,9)	0,6 (0,3-0,8)
45-54	16,5 (15,4-17,5)	10,8 (9,9-11,7)	31,9 (30,7-33,2)	40,4 (39,1-2,0)	0,4 (0,2-0,6)
55-59	13,4 (11,9-14,9)	8,3 (7,0-9,5)	36,1 (34,1-38,1)	41,9 (39,9-2,7)	0,3 (0,0-0,6)
60-64	11,0 (9,5-12,4)	6,9 (5,7-8,1)	38,0 (35,9-40,1)	43,7 (41,6-2,8)	0,4 (0,0-0,8)
65-74	8,0 (7,1-8,9)	4,2 (3,5-4,9)	37,9 (36,4-39,4)	49,4 (47,9-1,9)	0,5 (0,2-0,8)
75 ed oltre	2,3 (1,7-2,9)	2,0 (1,4-2,5)	22,4 (21,0-23,8)	72,9 (71,4-3,2)	0,5 (0,2-0,8)
<b>Totale</b>	<b>21,6 (21,2-21,9)</b>	<b>9,7 (9,4-10,0)</b>	<b>27,7 (27,3-28,1)</b>	<b>40,2 (39,8-0,7)</b>	<b>0,8 (0,7-0,9)</b>

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009.

**Tabella 1 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100) per regione - Anni 2008-2009**

2008				
Regioni	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori
Piemonte - Valle d'Aosta	1,7 (1,2-2,1)	25,2 (23,7-26,6)	26,8 (25,4-28,3)	71,4 (69,9-72,8)
Lombardia	1,6 (1,2-2,0)	24,6 (23,4-25,7)	26,2 (25,0-27,4)	70,4 (69,2-71,6)
Trentino-Alto Adige*	2,3 (1,8-2,9)	22,9 (21,4-24,3)	25,2 (23,7-26,7)	71,3 (69,8-72,8)
Veneto	1,7 (1,3-2,2)	22,6 (21,2-24,0)	24,4 (22,9-25,8)	74,5 (73,1-76,0)
Friuli Venezia Giulia	2,4 (1,6-3,2)	23,1 (21,3-24,9)	25,5 (23,6-27,3)	72,0 (70,2-73,8)
Liguria	1,4 (0,9-1,9)	29,5 (27,8-31,2)	30,9 (29,2-32,6)	67,4 (65,8-69,1)
Emilia-Romagna	2,0 (1,4-2,5)	24,1 (22,8-25,4)	26,0 (24,7-27,3)	72,5 (71,2-73,8)
Toscana	1,6 (1,1-2,1)	25,6 (24,2-27,1)	27,2 (25,8-28,7)	70,8 (69,4-72,2)
Umbria	1,6 (0,9-2,3)	24,6 (22,7-26,5)	26,2 (24,3-28,1)	71,8 (69,9-73,6)
Marche	1,7 (1,2-2,3)	24,7 (23,1-26,3)	26,5 (24,8-28,1)	71,4 (69,8-72,9)
Lazio	1,3 (0,8-1,8)	25,6 (24,1-27,2)	26,9 (25,3-28,6)	68,4 (66,8-70,0)
Abruzzo	1,4 (0,9-1,9)	33,1 (31,2-35,0)	34,5 (32,6-36,4)	63,6 (61,7-65,5)
Molise	1,8 (1,0-2,5)	31,4 (29,2-33,7)	33,2 (30,9-35,5)	65,2 (63,0-67,5)
Campania	1,8 (1,3-2,3)	35,1 (33,6-36,5)	36,9 (35,4-38,3)	59,5 (58,0-60,9)
Puglia	1,4 (0,9-1,8)	30,0 (28,6-31,5)	31,4 (29,9-32,9)	67,4 (66,0-68,9)
Basilicata	1,8 (1,1-2,5)	32,8 (30,7-34,9)	34,6 (32,4-36,7)	63,2 (61,1-65,3)
Calabria	1,6 (1,0-2,1)	29,2 (27,3-31,1)	30,8 (28,9-32,7)	67,1 (65,2-69,0)
Sicilia	2,2 (1,7-2,8)	36,6 (35,1-38,0)	38,8 (37,3-40,3)	57,7 (56,2-59,1)
Sardegna	1,4 (0,8-1,9)	30,2 (28,2-32,1)	31,5 (29,6-33,5)	64,9 (63,0-66,9)
<b>Italia</b>	<b>1,7 (1,5-1,8)</b>	<b>27,7 (27,3-28,1)</b>	<b>29,4 (29,0-29,8)</b>	<b>68,0 (67,6-68,4)</b>

\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2009. 2010.

**Tabella 1 - (Segue) Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100) per regione - Anni 2008-2009**

2009				
Regioni	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori
Piemonte - Valle d'Aosta	2,0 (1,5-2,4)	25,3 (24,0-26,6)	27,3 (26,0-28,6)	69,9 (68,6-71,2)
Lombardia	2,1 (1,6-2,5)	25,2 (24,1-26,3)	27,3 (26,1-28,4)	70,3 (69,2-71,4)
Trentino-Alto Adige*	2,7 (2,1-3,3)	22,2 (21,0-23,5)	24,9 (23,6-26,3)	71,7 (70,4-73,0)
Veneto	1,5 (1,1-2,0)	22,3 (20,9-23,7)	23,9 (22,5-25,3)	73,6 (72,2-74,9)
Friuli Venezia Giulia	2,5 (1,8-3,3)	21,5 (19,8-23,3)	24,0 (22,3-25,8)	73,9 (72,1-75,6)
Liguria	2,1 (1,5-2,8)	28,5 (26,8-30,3)	30,7 (28,9-32,5)	67,1 (65,3-68,8)
Emilia-Romagna	2,1 (1,6-2,7)	22,4 (21,0-23,8)	24,6 (23,1-26,0)	73,9 (72,5-75,2)
Toscana	2,1 (1,5-2,6)	22,9 (21,5-24,3)	25,0 (23,5-26,4)	73,2 (71,8-74,6)
Umbria	2,6 (1,7-3,4)	24,7 (22,8-26,5)	27,3 (25,4-29,2)	70,0 (68,2-71,9)
Marche	1,8 (1,2-2,5)	23,6 (21,9-25,2)	25,4 (23,7-27,1)	72,2 (70,5-73,9)
Lazio	1,3 (0,9-1,8)	25,0 (23,5-26,5)	26,3 (24,8-27,9)	68,5 (66,9-70,0)
Abruzzo	1,9 (1,3-2,6)	24,1 (22,3-25,9)	26,0 (24,2-27,8)	69,3 (67,5-71,1)
Molise	1,8 (1,1-2,6)	32,1 (30,0-34,2)	34,0 (31,9-36,1)	63,9 (61,8-66,0)
Campania	1,9 (1,4-2,4)	32,3 (30,9-33,7)	34,2 (32,8-35,6)	63,5 (62,1-64,8)
Puglia	1,3 (0,9-1,8)	31,0 (29,5-32,6)	32,4 (30,8-34,0)	64,9 (63,3-66,5)
Basilicata	1,6 (1,0-2,3)	32,6 (30,6-34,6)	34,2 (32,2-36,3)	62,4 (60,4-64,4)
Calabria	2,5 (1,8-3,1)	29,0 (27,4-30,7)	31,5 (29,8-33,2)	65,6 (63,9-67,3)
Sicilia	2,3 (1,8-2,9)	34,7 (33,1-36,3)	37,0 (35,4-38,6)	59,9 (58,3-61,5)
Sardegna	2,5 (1,8-3,2)	29,0 (27,2-30,8)	31,5 (29,6-33,3)	64,3 (62,5-66,1)
<b>Italia</b>	<b>2,0 (1,8-2,1)</b>	<b>26,7 (26,3-27,1)</b>	<b>28,7 (28,3-29,1)</b>	<b>68,5 (68,1-68,9)</b>

\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2009. 2010.

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 11-18 anni per regione e genere - Anno 2009**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte - Valle d'Aosta	19,8 (12,8-26,8)	16,9 (10,4-23,5)	18,4 (13,7-23,0,)
Lombardia	19,5 (12,9-26,2)	15,0 (8,9-21,1)	17,3 (13,0-21,6)
Trentino-Alto Adige**	25,0 (17,4-32,6)	19,3 (11,7-26,9)	22,3 (17,3-27,4)
Veneto	25,5 (16,5-34,4)	17,0 (8,5-25,4)	21,4 (15,5-27,4)
Friuli Venezia Giulia	9,8 (0,9-18,7)	10,6 (0,5-20,8)	10,2 (3,8-16,5)
Liguria	16,4 (6,2-26,5)	14,1 (4,5-23,7)	15,2 (8,6-21,9)
Emilia-Romagna	17,0 (7,9-26,1)	10,8 (3,1-18,6)	13,9 (8,3-19,5)
Toscana	13,9 (5,9-21,9)	10,9 (3,8-18,0)	12,4 (7,3-17,4)
Umbria	*	11,1 (1,5-20,6)	8,8 (2,7-14,9)
Marche	28,1 (17,1-39,2)	13,5 (4,9-22,1)	20,7 (14,0-27,5)
Lazio	20,1 (10,9-29,3)	12,2 (4,8-19,5)	16,0 (10,4-21,6)
Abruzzo	24,2 (12,9-35,5)	7,8 (0,7-15,0)	15,7 (9,2-22,2)
Molise	14,0 (4,0-24,0)	14,6 (4,3-24,8)	14,3 (7,5-21,1)
Campania	12,4 (7,1-17,7)	5,3 (1,4-9,3)	9,0 (5,8-12,2)
Puglia	15,1 (8,5-21,7)	5,6 (1,5-9,8)	10,1 (6,4-13,9)
Basilicata	22,1 (11,5-32,7)	*	12,2 (6,5-18,0)
Calabria	16,2 (8,8-23,6)	9,8 (3,3-16,3)	13,1 (8,4-17,9)
Sicilia	13,8 (8,2-19,4)	10,4 (5,4-15,5)	12,1 (8,4-15,8)
Sardegna	22,4 (13,4-31,4)	13,7 (4,8-22,7)	18,7 (12,5-24,9)
<b>Italia</b>	<b>17,7 (15,6-19,9)</b>	<b>11,5 (9,7-13,4)</b>	<b>14,7 (13,3-16,0)</b>

\*dato non attendibile.

\*\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 3 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni per regione e genere - Anno 2009**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte - Valle d'Aosta	24,0 (21,7-26,3)	8,0 (6,5-9,6)	16,0 (14,6-17,4)
Lombardia	20,6 (18,6-22,5)	5,0 (3,8-6,2)	12,9 (11,8-14,0)
Trentino-Alto Adige*	30,6 (27,9-33,2)	8,7 (6,9-10,5)	19,7 (18,2-21,3)
Veneto	26,7 (24,1-29,4)	6,7 (5,0-8,3)	16,8 (15,2-18,4)
Friuli Venezia Giulia	25,8 (22,4-29,2)	6,3 (4,2-8,3)	16,1 (14,1-18,0)
Liguria	20,2 (17,2-23,3)	4,7 (2,9-6,4)	12,4 (10,7-14,1)
Emilia-Romagna	21,9 (19,3-24,5)	7,7 (5,9-9,6)	14,8 (13,3-16,3)
Toscana	20,5 (18,0-23,0)	6,2 (4,6-7,8)	13,3 (11,9-14,8)
Umbria	19,8 (16,4-23,2)	6,3 (4-8,6)	13,1 (11,1-15,0)
Marche	19,2 (16,3-22,1)	5,9 (4,0-7,7)	12,6 (10,9-14,3)
Lazio	17,0 (14,5-19,5)	4,7 (3,3-6,2)	10,7 (9,3-12,1)
Abruzzo	22,2 (19,1-25,3)	4,1 (2,5-5,7)	13,2 (11,4-14,9)
Molise	37,2 (33,2-41,3)	5,4 (3,2-7,5)	21,4 (19,0-23,7)
Campania	14,6 (12,5-16,6)	3,9 (2,7-5,0)	9,1 (8,0-10,2)
Puglia	18,5 (16,1-20,9)	4,9 (3,5-6,3)	11,7 (10,3-13,0)
Basilicata	28,6 (25,0-32,1)	3,0 (1,4-4,6)	16,0 (13,9-18,0)
Calabria	17,4 (14,8-20,0)	2,4 (1,2-3,5)	9,8 (8,4-11,2)
Sicilia	12,1 (10,1-14,1)	3,1 (2,0-4,2)	7,5 (6,4-8,6)
Sardegna	36,0 (32,7-39,4)	5,2 (3,5-6,9)	20,6 (18,6-22,5)
<b>Italia</b>	<b>20,5 (19,8-21,1)</b>	<b>5,3 (4,9-5,7)</b>	<b>12,9 (12,5-13,3)</b>

\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 4 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio di 19-64 anni per tipologia di comportamento a rischio, per regione e genere - Anno 2009**

Regioni	Maschi		Femmine		Totale	
	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking
Piemonte - Valle d'Aosta	10,5 (8,8-12,3)	18,2 (16,1-20,3)	2,6 (1,7-3,6)	6,3 (4,9-7,6)	6,6 (5,6-7,6)	12,2 (11,0-13,5)
Lombardia	7,9 (6,6-9,3)	15,1 (13,4-16,9)	1,7 (0,9-2,4)	3,7 (2,7-4,8)	4,9 (4,1-5,6)	9,5 (8,5-10,5)
Trentino-Alto Adige**	6,9 (5,2-8,5)	28,0 (25,4-30,5)	1,8 (0,8-2,7)	7,5 (5,9-9,2)	4,3 (3,4-5,2)	17,8 (16,3-19,3)
Veneto	10,4 (8,5-12,3)	20,8 (18,3-23,3)	1,8 (0,9-2,8)	5,4 (3,9-6,9)	6,2 (5,1-7,2)	13,2 (11,7-14,6)
Friuli Venezia Giulia	10,9 (8,3-13,5)	20,0 (16,8-23,1)	2,0 (0,7-3,4)	4,7 (2,8-6,5)	6,5 (5,1-7,9)	12,4 (10,6-14,2)
Liguria	12,0 (9,4-14,5)	12,4 (9,8-15,0)	1,2 (0,2-2,1)	3,8 (2,2-5,4)	6,5 (5,2-7,9)	8,1 (6,6-9,6)
Emilia-Romagna	9,0 (7,0-10,9)	15,5 (13,1-17,8)	2,5 (1,3-3,6)	5,9 (4,3-7,6)	5,7 (4,6-6,8)	10,7 (9,3-12,1)
Toscana	12,0 (9,9-14,1)	11,7 (9,7-13,8)	3,4 (2,2-4,7)	3,3 (2,1-4,5)	7,7 (6,5-8,9)	7,5 (6,3-8,7)
Umbria	8,1 (5,6-10,6)	13,0 (10,0-15,9)	2,2 (0,7-3,7)	4,7 (2,7-6,7)	5,2 (3,8-6,5)	8,8 (7,1-10,5)
Marche	7,8 (5,7-9,9)	13,6 (11,0-16,2)	2,0 (0,8-3,2)	4,0 (2,4-5,6)	4,9 (3,8-6,1)	8,8 (7,4-10,3)
Lazio	6,5 (4,8-8,2)	13,2 (11,0-15,5)	1,2 (0,4-2,0)	3,9 (2,6-5,3)	3,8 (2,9-4,7)	8,5 (7,2-9,7)
Abruzzo	8,0 (5,9-10,1)	17,4 (14,5-20,2)	1,4 (0,4-2,4)	3,0 (1,6-4,4)	4,7 (3,6-5,8)	10,2 (8,6-11,8)
Molise	15,4 (12,3-18,6)	30,8 (26,9-34,7)	1,8 (0,4-3,2)	4,4 (2,4-6,4)	8,7 (6,9-10,4)	17,6 (15,4-19,9)
Campania	6,1 (4,6-7,5)	10,7 (8,9-12,6)	1,5 (0,7-2,3)	2,5 (1,5-3,5)	3,7 (3,0-4,5)	6,5 (5,5-7,5)
Puglia	10,6 (8,6-12,5)	10,9 (8,9-12,8)	1,8 (0,9-2,7)	3,2 (2,0-4,3)	6,1 (5,1-7,2)	7,0 (5,9-8,1)
Basilicata	12,8 (10,0-15,5)	22,5 (19,2-25,9)	*	2,2 (0,8-3,6)	6,9 (5,4-8,3)	12,5 (10,6-14,4)
Calabria	6,8 (5,0-8,6)	13,4 (11,0-15,8)	0,9 (0,2-1,7)	1,4 (0,5-2,4)	3,8 (2,9-4,8)	7,4 (6,1-8,6)
Sicilia	2,9 (1,8-4,0)	10,2 (8,3-12,1)	0,8 (0,2-1,5)	2,2 (1,3-3,2)	1,8 (1,2-2,5)	6,2 (5,1-7,2)
Sardegna	15,4 (12,8-18,1)	29,5 (26,3-32,8)	*	4,7 (3,1-6,4)	7,9 (6,5-9,3)	17,1 (15,3-18,9)
<b>Italia</b>	<b>8,5 (8,0-9,0)</b>	<b>15,1 (14,5-15,7)</b>	<b>1,7 (1,5-2,0)</b>	<b>3,9 (3,6-4,3)</b>	<b>5,1 (4,9-5,4)</b>	<b>9,5 (9,2-9,9)</b>

\*dato non attendibile.

\*\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.



**Tabella 5 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 65-74 anni per regione e genere - Anno 2009**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte- Valle d'Aosta-Vall	53,0 (46,4-59,5)	17,6 (12,9-22,4)	33,8 (29,7-37,9)
Lombardia	49,0 (42,3-55,7)	15,1 (10,4-19,8)	30,8 (26,7-34,8)
Trentino-Alto Adige*	42,3 (33,7-50,9)	12,9 (7,0-18,8)	26,7 (21,6-31,7)
Veneto	55,9 (47,5-64,2)	20,6 (13,5-27,8)	38,3 (32,7-43,9)
Friuli Venezia Giulia	53,6 (43,5-63,7)	26,0 (17,9-34,0)	38,2 (32,0-44,4)
Liguria	51,7 (42,7-60,6)	15,7 (9,7-21,8)	31,7 (26,3-37,1)
Emilia-Romagna	47,6 (39,5-55,8)	17,5 (11,6-23,3)	31,0 (26,2-35,8)
Toscana	53,4 (45,4-61,4)	22,3 (15,4-29,2)	37,7 (32,4-43,0)
Umbria	47,9 (37,0-58,9)	15,3 (7,3-23,3)	30,7 (24,1-37,3)
Marche	51,4 (42,0-60,9)	10,6 (4,6-16,7)	30,2 (24,3-36,0)
Lazio	46,5 (37,6-55,4)	10,9 (5,5-16,3)	27,0 (21,8-32,2)
Abruzzo	52,7 (42,7-62,8)	4,9 (0,4-9,5)	27,7 (21,6-33,9)
Molise	55,8 (43,2-68,3)	15,7 (6,5-24,9)	34,4 (26,5-42,3)
Campania	44,9 (36,1-53,7)	10,5 (5,0-15,9)	26,5 (21,3-31,7)
Puglia	42,7 (34,0-51,3)	9,1 (4,4-13,7)	23,9 (19,0-28,7)
Basilicata	49,7 (38,8-60,7)	12,4 (5,0-19,9)	30,4 (23,6-37,3)
Calabria	38,6 (29,5-47,8)	7,6 (2,4-12,8)	22,5 (17,2-27,8)
Sicilia	26,4 (18,5-34,3)	6,3 (2,1-10,4)	15,5 (11,2-19,7)
Sardegna	54,0 (43,7-64,3)	10,4 (4,2-16,7)	30,4 (24,1-36,7)
<b>Italia</b>	<b>47,7 (45,3-50,0)</b>	<b>14,1 (12,5-15,7)</b>	<b>29,7 (28,3-31,1)</b>

\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 6 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 75 anni ed oltre per regione e genere - Anno 2009**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte - Valle d'Aosta	47,3 (38,7-55,9)	8,4 (4,5-12,3)	23,3 (19,0-27,7)
Lombardia	45,8 (37,0-54,6)	7,1 (3,5-10,8)	21,1 (17,0-25,3)
Trentino-Alto Adige**	40,1 (29,0-51,2)	9,8 (4,4-15,2)	20,9 (15,6-26,2)
Veneto	47,3 (36,1-58,5)	10,4 (5,4-15,4)	22,7 (17,5-27,9)
Friuli Venezia Giulia	43,1 (30,5-55,6)	12,8 (5,9-19,6)	24,3 (17,9-30,6)
Liguria	46,1 (36,0-56,2)	11,5 (6,3-16,7)	24,6 (19,4-29,8)
Emilia-Romagna	45,8 (35,4-56,2)	11,6 (5,9-17,3)	25,1 (19,7-30,6)
Toscana	37,7 (29,0-46,5)	14,4 (9,6-19,2)	22,8 (18,5-27,2)
Umbria	34,5 (21,8-47,3)	*	16,0 (10,2-21,8)
Marche	34,2 (23,5-44,9)	9,1 (3,8-14,3)	18,5 (13,4-23,7)
Lazio	37,1 (26,5-47,7)	12,9 (7,0-18,9)	22,3 (16,8-27,7)
Abruzzo	42,5 (31,7-53,3)	4,6 (0,7-8,4)	19,2 (13,9-24,4)
Molise	49,3 (37,2-61,4)	8,9 (3,0-14,9)	24,7 (18,4-31,0)
Campania	37,4 (27,0-47,8)	6,2 (2,0-10,5)	17,8 (13,0-22,7)
Puglia	42,5 (32,5-52,5)	4,7 (0,9-8,5)	20,4 (15,3-25,6)
Basilicata	48,7 (35,6-61,8)	*	21,7 (15,2-28,2)
Calabria	37,7 (26,2-49,2)	*	16,4 (11,1-21,8)
Sicilia	24,3 (16,3-32,4)	2,7 (0,1-5,4)	11,5 (7,7-15,2)
Sardegna	39,5 (27,3-51,6)	*	16,6 (10,8-22,3)
<b>Italia</b>	<b>40,7 (37,8-43,5)</b>	<b>8,4 (7,1-9,7)</b>	<b>20,6 (19,2-22,0)</b>

\*Dato non attendibile.

\*\*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 1 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100) per regione - Anni 2008-2010**

Regioni	2008				2010			
	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori
Piemonte*	1,7 (1,2-2,1)	25,3 (24,0-26,6)	27,0 (25,6-28,2)	71,3 (70,0-72,6)	3,6 (2,9-4,2)	25,9 (24,6-27,1)	29,4 (28,1-30,7)	68,8 (67,5-70,0)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	2,6 (1,6-3,6)	20,5 (18,3-22,6)	23,0 (20,8-25,3)	74,5 (72,3-76,7)	4,5 (3,4-5,7)	23,1 (21,1-25,2)	27,7 (25,5-29,8)	72,0 (69,9-74,0)
Lombardia	1,6 (1,2-2,0)	24,6 (23,4-25,7)	26,2 (25,0-27,4)	70,4 (69,2-71,6)	4,3 (3,6-5,0)	24,7 (23,4-26,1)	29,0 (27,6-30,4)	69,2 (67,8-70,7)
Bolzano-Bozen	2,8 (1,9-3,7)	17,9 (16,0-19,9)	20,8 (18,7-22,8)	76,0 (74,0-78,1)	6,7 (5,7-7,8)	17,8 (16,4-19,2)	24,5 (23,0-26,1)	73,1 (71,6-74,6)
Trento	1,9 (1,1-2,6)	27,7 (25,6-29,7)	29,5 (27,5-31,6)	66,8 (64,8-68,8)	6,0 (5,1-7,0)	26,9 (25,4-28,4)	32,9 (31,3-34,5)	66,0 (64,5-67,4)
Veneto	1,8 (1,3-2,2)	22,6 (21,2-24,0)	24,4 (22,9-25,8)	74,5 (73,1-76,0)	5,4 (4,6-6,2)	23,7 (22,3-25,1)	29,1 (27,6-30,6)	68,9 (67,4-70,4)
Friuli Venezia Giulia	2,4 (1,6-3,2)	23,1 (21,3-24,9)	25,5 (23,6-27,3)	72,0 (70,2-73,8)	3,9 (3,0-4,8)	25,4 (23,7-27,1)	29,3 (27,5-31,1)	69,4 (67,7-71,2)
Liguria	1,4 (0,9-1,9)	29,5 (27,8-31,2)	30,9 (29,2-32,6)	67,4 (65,8-69,1)	4,0 (3,2-4,8)	27,7 (26,0-29,3)	31,7 (30,0-33,4)	67,0 (65,4-68,7)
Emilia-Romagna	2,0 (1,4-2,5)	24,1 (22,8-25,4)	26,0 (24,7-27,3)	72,5 (71,2-73,8)	5,5 (4,6-6,3)	26,2 (24,7-27,8)	31,7 (30,1-33,3)	67,0 (65,4-68,6)
Toscana	1,6 (1,1-2,1)	25,7 (24,2-27,1)	27,2 (25,8-28,7)	70,8 (69,4-72,2)	4,8 (4,0-5,6)	25,0 (23,6-26,4)	29,8 (28,4-31,3)	69,0 (67,6-70,4)
Umbria	1,6 (0,9-2,3)	24,6 (22,7-26,5)	26,2 (24,3-28,1)	71,8 (69,9-73,6)	4,2 (3,3-5,1)	29,6 (27,8-31,5)	33,9 (32,0-35,7)	64,8 (63,0-66,6)
Marche	1,7 (1,2-2,3)	24,7 (23,1-26,3)	26,5 (24,8-28,1)	71,4 (69,8-72,9)	4,8 (3,9-5,7)	28,1 (26,5-29,7)	32,9 (31,3-34,6)	64,8 (63,2-66,5)
Lazio	1,3 (0,8-1,8)	25,6 (24,1-27,2)	27,0 (25,3-28,6)	68,4 (66,8-70,0)	4,8 (4,0-5,5)	26,8 (25,4-28,1)	31,5 (30,1-33,0)	65,9 (64,6-67,3)
Abruzzo	1,4 (0,9-1,9)	33,1 (31,2-35,0)	34,5 (32,6-36,4)	63,6 (61,7-65,5)	5,5 (4,5-6,5)	26,2 (24,4-27,9)	31,7 (29,8-33,5)	66,5 (64,7-68,3)
Molise	1,8 (1,0-2,5)	31,5 (29,2-33,7)	33,2 (30,9-35,5)	65,3 (63,0-67,5)	4,1 (3,1-5,0)	30,8 (28,8-32,8)	34,9 (32,8-36,9)	64,1 (62,1-66,0)
Campania	1,8 (1,3-2,3)	35,1 (33,6-36,5)	36,9 (35,4-38,3)	59,5 (58,0-60,9)	4,9 (4,1-5,7)	36,0 (34,3-37,7)	40,9 (39,1-42,6)	58,3 (56,6-60,1)
Puglia	1,4 (0,9-1,8)	30,0 (28,6-31,5)	31,4 (29,9-32,9)	67,4 (66,0-68,9)	2,8 (2,2-3,3)	32,2 (30,8-33,7)	35,0 (33,5-36,4)	64,1 (62,6-65,5)
Basilicata	1,8 (1,1-2,5)	32,8 (30,7-34,9)	34,6 (32,4-36,7)	63,3 (61,1-65,3)	3,0 (2,2-3,9)	32,6 (30,6-34,7)	35,7 (33,6-37,8)	61,9 (59,8-63,9)
Calabria	1,6 (1,0-2,1)	29,2 (27,3-31,1)	30,8 (28,9-32,7)	67,1 (65,2-69,0)	3,8 (3,0-4,6)	31,4 (29,6-33,2)	35,2 (33,4-37,0)	63,2 (61,4-65,0)
Sicilia	2,2 (1,7-2,8)	36,6 (35,1-38,0)	38,8 (37,3-40,3)	57,7 (56,2-59,1)	4,3 (3,6-5,0)	34,5 (33,0-36,1)	38,9 (37,3-40,4)	59,1 (57,5-60,6)
Sardegna	1,4 (0,8-1,9)	30,2 (28,2-32,1)	31,5 (29,6-33,5)	64,9 (63,0-66,9)	5,9 (4,9-6,9)	28,5 (26,7-30,2)	34,4 (32,6-36,2)	62,8 (61,0-64,6)
<b>Italia</b>	<b>1,7 (1,5-1,8)</b>	<b>27,7 (27,3-28,1)</b>	<b>29,4 (29,0-29,8)</b>	<b>68,0 (67,6-68,4)</b>	<b>4,5 (4,3-4,7)</b>	<b>28,1 (27,7-28,6)</b>	<b>32,7 (32,2-33,1)</b>	<b>65,7 (65,2-66,1)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2009, 2011.

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 11-18 anni per regione e genere - Anno 2010**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte*	23,5 (14,4-32,7)	13,1 (4,9-21,2)	18,6 (12,8-24,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	38,0 (23,1-52,9)	11,6 (0,7-22,5)	25,0 (15,9-34,2)
Lombardia	16,8 (10,3-23,3)	14,1 (7,7-20,4)	15,5 (11,1-19,9)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>20,9 (11,4-30,5)</i>	<i>23,6 (13,5-33,7)</i>	<i>22,2 (15,9-28,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>8,0 (0,3-15,7)</i>	<i>*</i>	<i>5,8 (1,5-10,1)</i>
Veneto	17,6 (10,2-24,9)	11,2 (4,7-17,7)	14,5 (9,8-19,3)
Friuli Venezia Giulia	14,4 (4,9-23,8)	12,7 (2,7-22,6)	13,6 (7,0-20,1)
Liguria	16,1 (6,0-26,3)	8,6 (0,4-16,8)	12,4 (6,2-18,7)
Emilia-Romagna	12,4 (5,2-19,7)	9,3 (2,8-15,8)	10,9 (6,2-15,5)
Toscana	11,4 (3,2-19,6)	8,1 (0,7-15,6)	9,8 (4,6-15,0)
Umbria	8,9 (0,0-17,7)	10,2 (1,1-19,3)	9,5 (3,6-15,4)
Marche	20,5 (10,7-30,3)	<i>*</i>	13,3 (7,5-19,0)
Lazio	12,2 (5,4-19,0)	8,4 (1,7-15,1)	10,5 (6,0-15,0)
Abruzzo	18,8 (8,7-28,9)	21,0 (9,6-32,4)	19,8 (12,7-27,0)
Molise	27,2 (15,4-39,1)	<i>*</i>	16,7 (9,8-23,7)
Campania	16,9 (11,0-22,8)	5,9 (2,1-9,6)	11,4 (7,9-14,9)
Puglia	11,2 (5,4-16,9)	8,2 (2,9-13,6)	9,8 (6,0-13,5)
Basilicata	25,8 (13,9-37,6)	14,0 (4,6-23,4)	19,7 (12,5-26,9)
Calabria	11,6 (5,2-17,9)	10,0 (4,2-15,8)	10,8 (6,6-14,9)
Sicilia	10,9 (5,7-16,1)	11,0 (5,9-16,2)	11,0 (7,4-14,5)
Sardegna	17,7 (7,9-27,5)	7,8 (1,0-14,6)	12,5 (6,8-18,1)
<b>Italia</b>	<b>15,2 (13,3-17,2)</b>	<b>10,2 (8,5-11,9)</b>	<b>12,8 (11,5-14,0)</b>

\*dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 3 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni per regione e genere - Anno 2010**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte*	25,0 (22,6-27,4)	7,8 (6,2-9,5)	16,4 (15,0-17,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	33,5 (29,3-37,7)	10,4 (7,4-13,4)	22,1 (19,6-24,7)
Lombardia	21,6 (19,3-23,9)	5,9 (4,5-7,3)	13,9 (12,5-15,2)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>37,0 (33,8-40,3)</i>	<i>13,4 (10,8-15,9)</i>	<i>25,4 (23,4-27,3)</i>
<i>Trento</i>	<i>35,3 (32,2-38,3)</i>	<i>8,7 (6,6-10,8)</i>	<i>22,3 (20,5-24,1)</i>
Veneto	29,1 (26,3-31,8)	7,4 (5,7-9,1)	18,4 (16,7-20,0)
Friuli Venezia Giulia	27,2 (23,9-30,5)	8,5 (6,3-10,7)	17,8 (15,9-19,8)
Liguria	18,6 (15,7-21,4)	6,8 (4,9-8,8)	12,7 (11,0-14,3)
Emilia-Romagna	22,4 (19,7-25,1)	4,9 (3,4-6,4)	13,7 (12,1-15,2)
Toscana	21,2 (18,7-23,8)	6,9 (5,2-8,7)	14,0 (12,5-15,5)
Umbria	16,9 (13,9-20,0)	4,0 (2,2-5,8)	10,4 (8,7-12,1)
Marche	21,4 (18,6-24,3)	3,7 (2,2-5,2)	12,6 (11,0-14,2)
Lazio	18,2 (15,9-20,5)	5,7 (4,2-7,2)	11,8 (10,5-13,1)
Abruzzo	31,2 (27,8-34,6)	5,7 (3,8-7,6)	18,4 (16,4-20,3)
Molise	42,8 (38,8-46,7)	4,6 (2,7-6,6)	23,6 (21,3-25,9)
Campania	14,9 (12,7-17,1)	3,3 (2,2-4,5)	9,1 (7,8-10,3)
Puglia	18,0 (15,7-20,2)	2,9 (1,8-4,0)	10,3 (9,0-11,5)
Basilicata	24,9 (21,3-28,5)	5,4 (3,3-7,5)	15,1 (13,1-17,2)
Calabria	19,4 (16,6-22,2)	4,0 (2,5-5,4)	11,6 (10,0-13,2)
Sicilia	13,1 (11,1-15,1)	3,1 (2,0-4,2)	8,0 (6,9-9,1)
Sardegna	34,0 (30,7-37,3)	5,2 (3,4-6,9)	19,8 (17,8-21,7)
<b>Italia</b>	<b>21,5 (20,8-22,2)</b>	<b>5,4 (5,0-5,9)</b>	<b>13,4 (13,0-13,9)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 4 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio di 19-64 anni per tipologia di comportamento a rischio, per regione e genere - Anno 2010**

Regioni	Maschi		Femmine		Totale	
	Eccedenti i limiti giornalieri	<i>Binge drinking</i>	Eccedenti i limiti giornalieri	<i>Binge drinking</i>	Eccedenti i limiti giornalieri	<i>Binge drinking</i>
Piemonte	9,5 (7,8-11,3)	18,6 (16,4-20,84)	2,0 (1,0-2,9)	6,6 (5,0-8,1)	5,8 (4,8-6,7)	12,6 (11,3-13,9)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	15,5 (12,1-19,0)	23,5 (19,64-27,34)	3,0 (1,2-4,8)	7,9 (5,2-10,6)	9,4 (7,5-11,2)	15,8 (13,5-18,1)
Lombardia	7,7 (6,2-9,3)	16,6 (14,54-18,74)	1,0 (0,4-1,7)	5,0 (3,7-6,3)	4,4 (3,6-5,2)	10,9 (9,7-12,1)
<i>Bolzano-Bozen</i>	4,9 (3,1-6,7)	34,9 (31,7-38,1)	1,6 (0,4-2,8)	12,4 (9,9-14,9)	3,3 (2,6-4,2)	23,8 (21,8-25,7)
<i>Trento</i>	8,2 (6,2-10,3)	30,7 (27,8-33,7)	0,9 (0,0-1,9)	8,0 (5,9-10,1)	4,7 (3,6-5,7)	19,6 (17,9-21,3)
Veneto	9,6 (7,8-11,5)	24,8 (22,1-27,4)	1,4 (0,6-2,2)	6,3 (4,7-7,9)	5,6 (4,5-6,6)	15,6 (14,1-17,1)
Friuli Venezia Giulia	9,0 (6,7-11,2)	22,6 (19,5-25,7)	1,9 (0,7-3,0)	7,3 (5,2-9,3)	5,4 (4,2-6,6)	14,9 (13,1-16,8)
Liguria	7,3 (5,3-9,4)	13,3 (10,7-15,9)	2,2 (0,9-3,4)	5,1 (3,3-6,9)	4,8 (3,6-5,9)	9,2 (7,7-10,7)
Emilia-Romagna	8,2 (6,3-10,0)	16,5 (14,1-18,9)	2,0 (0,9-3,0)	3,2 (1,9-4,4)	5,1 (4,0-6,1)	9,9 (8,5-11,2)
Toscana	8,3 (6,4-10,2)	15,6 (13,3-17,9)	1,3 (0,4-2,2)	5,9 (4,3-7,6)	4,8 (3,8-5,8)	10,7 (9,4-12,1)
Umbria	7,7 (5,4-10,0)	12,2 (9,4-14,9)	1,3 (0,1-2,4)	3,0 (1,4-4,6)	4,4 (3,2-5,7)	7,5 (6,0-9,0)
Marche	8,5 (6,4-10,5)	14,1 (11,7-16,6)	1,7 (0,6-2,8)	2,3 (1,1-3,5)	5,1 (4,0-6,2)	8,2 (6,9-9,6)
Lazio	6,4 (4,7-8,0)	13,4 (11,3-15,5)	1,4 (0,5-2,2)	4,5 (3,1-5,8)	3,8 (2,9-4,6)	8,8 (7,6-10,0)
Abruzzo	9,6 (7,3-12,0)	27,1 (23,8-30,3)	1,2 (0,1-2,1)	5,0 (3,2-6,9)	5,4 (4,1-6,6)	16,0 (14,1-17,9)
Molise	17,1 (13,9-20,3)	36,5 (32,6-40,4)	*	3,9 (2,1-5,8)	8,9 (7,2-10,5)	20,1 (17,9-22,3)
Campania	7,6 (6,0-9,3)	10,5 (8,6-12,4)	1,4 (0,6-2,1)	2,5 (1,5-3,5)	4,5 (3,6-5,4)	6,4 (5,4-7,5)
Puglia	8,6 (6,9-10,3)	12,3 (10,3-14,2)	0,7 (0,1-1,3)	2,2 (1,2-3,1)	4,6 (3,7-5,5)	7,1 (6,0-8,2)
Basilicata	11,8 (9,0-14,6)	19,3 (15,9-22,6)	1,8 (0,5-3,1)	4,4 (2,5-6,2)	6,8 (5,3-8,3)	11,8 (9,9-13,7)
Calabria	7,5 (5,5-9,4)	15,5 (13,0-18,1)	0,7 (0,0-1,3)	3,4 (2,1-4,8)	4,0 (3,0-5,0)	9,4 (8,0-10,9)
Sicilia	4,9 (3,5-6,2)	10,0 (8,2-11,8)	0,4 (0,0-0,9)	2,9 (1,9-4,0)	2,6 (1,9-3,3)	6,4 (5,4-7,4)
Sardegna	9,4 (7,2-11,6)	30,0 (26,8-33,2)	*	4,6 (3,0-6,3)	5,0 (3,9-6,2)	17,4 (15,6-19,3)
<b>Italia</b>	<b>8,0 (7,5-8,5)</b>	<b>16,6 (15,9-17,2)</b>	<b>1,3 (1,0-1,5)</b>	<b>4,4 (4,1-4,8)</b>	<b>4,6 (4,3-4,9)</b>	<b>10,5 (10,1-10,9)</b>

\*dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 5 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 65-74 anni per regione e genere - Anno 2010**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	47,6 (40,5-54,7)	14,1 (9,3 - 18,8)	29,1 (25,0-33,2)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	62,1 (50,6-73,6)	23,4 (12,4 - 34,4)	43,4 (35,3-51,4)
Lombardia	47,6 (40,2-55,0)	15,5 (10,4 - 20,5)	30,1 (25,6-34,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>47,5 (37,7-57,4)</i>	<i>12,9 (6 - 19,9)</i>	<i>29,3 (23,4-34,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>64,8 (54,8-74,8)</i>	<i>11,7 (4,7 - 18,6)</i>	<i>35,4 (29,1-41,8)</i>
Veneto	50,5 (42,6-58,5)	16,7 (10,8 - 22,7)	33,0 (27,9-38,0)
Friuli Venezia Giulia	50,7 (41,3-60,2)	16,8 (9,9 - 23,7)	32,6 (26,8-38,5)
Liguria	58,8 (50,0-67,7)	13,5 (7,6 - 19,4)	33,7 (28,3-39,2)
Emilia-Romagna	48,6 (39,9-57,2)	17,5 (11,4 - 23,6)	31,5 (26,3-36,7)
Toscana	58,3 (49,6-66,9)	21,2 (14,5 - 27,9)	37,6 (32,2-42,9)
Umbria	44,0 (33,0-55,0)	10,1 (3,7 - 16,5)	24,8 (18,8-30,8)
Marche	47,5 (38,5-56,5)	21,2 (13,7 - 28,7)	33,9 (28,2-39,6)
Lazio	45,1 (36,1-54,1)	9,6 (4,4 - 14,9)	25,3 (20,3-30,4)
Abruzzo	51,4 (40,5-62,4)	9,5 (2,4 - 16,6)	30,3 (23,4-37,1)
Molise	50,5 (38,3-62,6)	12,1 (4,8 - 19,3)	28,4 (21,5-35,2)
Campania	44,0 (35,0-53,0)	10,9 (5,9 - 15,9)	25,2 (20,1-30,4)
Puglia	53,1 (44,5-61,8)	9,9 (4,6 - 15,1)	29,9 (24,7-35,2)
Basilicata	59,9 (47,6-72,2)	10,4 (2,1 - 18,7)	34,8 (26,7-43,0)
Calabria	40,4 (29,9-50,9)	12,1 (5,8 - 18,5)	24,5 (18,6-30,5)
Sicilia	30,2 (22,4-37,9)	4,3 (1,1 - 7,4)	15,3 (11,4-19,2)
Sardegna	36,6 (26,2-47,1)	5,8 (0,6 - 10,9)	20,0 (14,3-25,7)
<b>Italia</b>	<b>47,4 (45,1-49,8)</b>	<b>13,3 (11,8 - 14,8)</b>	<b>28,7 (27,3-30,1)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 6 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 75 anni ed oltre per regione e genere - Anno 2010**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	41,3 (31,5-51,1)	7,6 (2,9-12,3)	20,9 (16,0-25,8)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	44,8 (28,1-61,4)	34,5 (23,8-45,1)	37,9 (29,3-46,4)
Lombardia	50,1 (40,9-59,4)	11,0 (6,4-15,6)	25,6 (20,8-30,5)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>22,7 (7,2-38,1)</i>	*	<i>12,2 (5,5-18,9)</i>
<i>Trento</i>	<i>41,6 (28,8-54,5)</i>	<i>16,1 (8,3-23,9)</i>	<i>25,9 (19,4-32,4)</i>
Veneto	45,1 (34,0-56,1)	13,6 (7,9-19,2)	24,6 (19,1-30,0)
Friuli Venezia Giulia	49,1 (37,6-60,6)	17,0 (10,4-23,6)	28,6 (22,6-34,6)
Liguria	43,3 (33,9-52,7)	13,4 (8,1-18,6)	24,8 (20,0-29,7)
Emilia-Romagna	40,3 (31,3-49,2)	10,8 (6,0-15,7)	22,7 (18,0-27,5)
Toscana	40,4 (31,5-49,3)	11,5 (6,4-16,6)	23,3 (18,7-27,9)
Umbria	42,4 (31,3-53,6)	7,0 (1,5-12,5)	21,9 (16,1-27,8)
Marche	38,2 (27,6-48,7)	8,7 (3,7-13,7)	19,7 (14,6-24,8)
Lazio	36,5 (27,0-46,0)	10,1 (4,9-15,3)	20,7 (15,9-25,5)
Abruzzo	48,1 (37,0-59,1)	*	20,1 (14,8-25,4)
Molise	58,4 (46,8-69,9)	19,2 (10,9-27,5)	35,9 (28,9-42,9)
Campania	34,4 (24,6-44,1)	8,6 (3,7-13,4)	19,1 (14,0-24,3)
Puglia	40,6 (31,1-50,1)	8,3 (3,7-12,9)	21,1 (16,3-25,9)
Basilicata	52,2 (40,1-64,3)	9,7 (3,6-15,8)	26,4 (19,9-32,8)
Calabria	40,7 (30,7-50,6)	*	19,7 (14,5-24,9)
Sicilia	19,9 (12,4-27,4)	3,4 (0,2-6,5)	10,6 (6,8-14,3)
Sardegna	37,3 (25,6-49,0)	*	16,9 (11,3-22,5)
<b>Italia</b>	<b>40,3 (37,6-42,9)</b>	<b>9,6 (8,2-10,9)</b>	<b>21,7 (20,3-23,1)</b>

\*dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.



**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100) che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2010**

Regioni	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
Piemonte	24,8 (23,5-26,0)	12,5 (11,6-13,5)	30,3 (29,0-31,5)	32,3 (31,0-33,6)	*
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	26,9 (24,6-28,7)	18,9 (16,7-20,4)	20,3 (18,3-22,0)	33,8 (31,7-36,0)	-
Lombardia	26,8 (25,5-28,2)	11,7 (10,7-12,7)	31,3 (29,9-32,7)	29,7 (28,3-31,1)	0,5 (0,2-0,7)
Bolzano-Bozen	38,3 (36,9-40,1)	24,8 (23,5-26,4)	24,1 (22,7-25,6)	12,3 (11,1-13,5)	0,4 (0,1-0,8)
Trento	29,0 (27,4-30,3)	19,9 (18,6-21,2)	37,0 (35,6-38,5)	14,1 (13,0-15,3)	-
Veneto	29,4 (27,9-30,8)	13,2 (12,1-14,3)	35,5 (34,0-37,0)	21,6 (20,3-22,9)	0,4 (0,1-0,6)
Friuli Venezia Giulia	24,2 (22,5-25,8)	10,8 (9,6-12,1)	35,5 (33,7-37,3)	29,0 (27,3-30,7)	0,5 (0,2-1,0)
Liguria	21,6 (20,1-23,1)	8,5 (7,4-9,6)	28,2 (26,6-29,8)	41,0 (39,2-42,7)	0,8 (0,4-1,2)
Emilia-Romagna	25,8 (24,3-27,3)	10,7 (9,6-11,8)	33,9 (32,3-35,5)	29,2 (27,7-30,8)	0,4 (0,1-0,6)
Toscana	25,8 (24,4-27,1)	9,7 (8,7-10,7)	33,3 (31,9-34,7)	29,9 (28,5-31,3)	1,3 (0,8-1,7)
Umbria	22,4 (20,7-24,0)	9,8 (8,6-11,0)	29,0 (27,3-30,8)	38,7 (36,9-40,5)	*
Marche	24,3 (22,8-25,8)	8,1 (7,0-9,1)	27,7 (26,2-29,3)	39,4 (37,7-41,0)	0,5 (0,2-0,9)
Lazio	24,0 (22,8-25,3)	10,4 (9,5-11,4)	24,9 (23,7-26,2)	40,0 (38,6-41,4)	0,6 (0,3-0,9)
Abruzzo	21,6 (20,0-23,1)	9,4 (8,2-10,5)	27,6 (25,9-29,2)	41,1 (39,3-42,9)	0,4 (0,1-0,7)
Molise	18,5 (17,0-20,3)	7,5 (6,2-8,6)	22,2 (20,4-23,9)	50,8 (48,8-52,8)	1,0 (0,4-1,5)
Campania	14,7 (13,5-15,9)	6,4 (5,6-7,3)	21,8 (20,4-23,2)	56,5 (54,8-58,2)	0,5 (0,3-0,8)
Puglia	16,6 (15,5-17,8)	8,4 (7,5-9,2)	25,3 (24,0-26,6)	49,0 (47,6-50,5)	0,7 (0,4-1,0)
Basilicata	18,1 (16,3-19,7)	8,9 (7,6-10,2)	24,1 (22,3-26,0)	48,1 (46,0-50,1)	1,0 (0,4-1,4)
Calabria	17,8 (16,4-19,3)	8,7 (7,6-9,8)	25,2 (23,6-26,8)	47,5 (45,7-49,4)	0,8 (0,4-1,2)
Sicilia	15,7 (14,6-16,9)	7,2 (6,3-8,0)	18,2 (17,0-19,4)	58,2 (56,7-59,7)	0,7 (0,4-1,0)
Sardegna	21,3 (19,7-22,8)	9,9 (8,7-11,0)	28,3 (26,6-30,0)	40,2 (38,4-42,0)	0,4 (0,1-0,8)
<b>Italia</b>	<b>22,8 (22,4-23,2)</b>	<b>10,2 (9,9-10,5)</b>	<b>28,2 (27,8-28,6)</b>	<b>38,3 (37,8-38,8)</b>	<b>0,6 (0,5-0,6)</b>

-Dato non disponibile

\*Dato non attendibile

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100) che praticano sport o attività fisica per classe di età e genere - Anno 2010**

Classi d'età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
<b>MASCHI</b>					
3-5	19,3 (16,5-22,2)	4,6 (2,8-6,2)	23,8 (20,8-26,8)	46,3 (42,9-49,6)	6,1 (4,2-7,9)
6-10	60,5 (59,9-61,0)	6,5 (6,3-6,9)	13,8 (13,4-14,2)	18,2 (17,8-18,6)	1,0 (0,8-1,1)
11-14	66,2 (61,8-70,5)	10,8 (7,8-13,8)	10,5 (7,5-13,4)	12,2 (9,1-15,4)	*
15-17	55,5 (54,4-56,5)	14,6 (13,8-15,4)	13,3 (12,5-14,1)	16,3 (15,4-17,2)	0,3 (0,1-0,5)
18-19	46,2 (44,8-47,5)	18,5 (17,3-19,6)	14,8 (13,8-15,9)	19,6 (18,4-20,7)	0,9 (0,4-1,2)
20-24	40,8 (37,9-43,7)	19,5 (17,1-21,9)	15,7 (13,4-17,9)	23,1 (20,6-25,7)	0,9 (0,2-1,6)
25-34	35,2 (34,3-36,1)	15,3 (14,6-16,1)	19,1 (18,3-19,8)	29,7 (28,8-30,6)	0,6 (0,5-0,9)
35-44	27,0 (26,2-27,8)	15,7 (15,0-16,4)	24,2 (23,5-25,0)	32,8 (32,0-33,7)	0,3 (0,1-0,4)
45-54	20,9 (19,5-22,3)	14,3 (13,1-15,5)	29,8 (28,3-31,3)	34,9 (33,3-36,4)	*
55-59	17,1 (15,4-19,0)	11,1 (9,5-12,6)	35,2 (33,1-37,4)	36,1 (33,9-38,3)	*
60-64	15,3 (14,4-16,2)	9,8 (9,0-10,6)	37,3 (36,1-38,4)	37,1 (35,9-38,2)	0,5 (0,3-0,8)
65-74	11,3 (10,5-12,1)	6,7 (6,0-7,3)	41,2 (40,0-42,3)	40,6 (39,5-41,8)	0,2 (0,0-0,3)
75 ed oltre	5,3 (4,0-6,6)	2,3 (1,4-3,2)	33,4 (31,1-35,8)	58,5 (56,2-60,9)	*
<b>Totale</b>	<b>27,7 (27,1-28,3)</b>	<b>12,0 (11,5-12,4)</b>	<b>26,2 (25,6-26,8)</b>	<b>33,5 (32,8-34,2)</b>	<b>0,6 (0,5-0,7)</b>
<b>FEMMINE</b>					
3-5	23,4 (20,3-26,6)	4,8 (3,0-6,7)	18,0 (15,1-20,9)	48,2 (44,7-51,8)	5,6 (3,6-7,5)
6-10	52,6 (52,0-53,1)	8,3 (7,9-8,6)	13,4 (13,0-13,8)	25,2 (24,7-25,7)	0,5 (0,4-0,7)
11-14	48,2 (43,4-53,0)	9,3 (6,4-12,2)	19,9 (16,0-23,9)	22,0 (17,9-26,0)	*
15-17	39,0 (37,9-40,1)	14,3 (13,4-15,2)	21,1 (20,1-22,0)	25,4 (24,4-26,4)	0,3 (0,1-0,5)
18-19	26,6 (25,1-27,8)	17,5 (16,3-18,8)	27,3 (25,9-28,6)	28,7 (27,4-30,1)	-
20-24	25,9 (23,3-28,6)	14,1 (11,9-16,2)	26,6 (23,9-29,2)	32,8 (30,0-35,6)	0,7 (0,1-1,2)
25-34	20,9 (20,1-21,8)	11,2 (10,6-11,9)	31,3 (30,3-32,2)	36,3 (35,4-37,3)	0,3 (0,1-0,4)
35-44	17,7 (17,0-18,4)	11,5 (10,9-12,1)	33,3 (32,5-34,2)	37,4 (36,6-38,3)	0,1 (0,0-0,2)
45-54	14,5 (13,3-15,7)	9,4 (8,4-10,4)	36,1 (34,5-37,6)	39,8 (38,3-41,4)	*
55-59	12,7 (11,1-14,3)	7,4 (6,1-8,7)	37,1 (35,0-39,3)	42,5 (40,3-44,6)	*
60-64	10,9 (10,1-11,7)	5,4 (4,8-6,0)	37,7 (36,5-38,8)	45,1 (44,0-46,2)	1,0 (0,7-1,3)
65-74	8,5 (7,8-9,1)	4,2 (3,7-4,7)	34,6 (33,6-35,6)	52,4 (51,4-53,4)	0,3 (0,1-0,5)
75 ed oltre	2,2 (1,5-3,0)	1,8 (1,2-2,5)	20,9 (19,3-22,6)	74,5 (73,0-76,1)	0,5 (0,1-0,8)
<b>Totale</b>	<b>18,1 (17,6-18,6)</b>	<b>8,5 (8,1-8,9)</b>	<b>30,1 (29,4-30,7)</b>	<b>42,8 (42,2-43,5)</b>	<b>0,5 (0,4-0,6)</b>
<b>TOTALE</b>					
3-5	21,3 (19,3-23,2)	4,7 (3,5-5,8)	21,0 (19,0-23,0)	47,2 (44,9-49,4)	5,9 (4,6-7,1)
6-10	56,6 (56,3-57,0)	7,4 (7,2-7,6)	13,6 (13,4-13,9)	21,6 (21,3-21,9)	0,8 (0,7-0,9)
11-14	57,5 (54,3-60,7)	10,1 (8,0-12,1)	15,0 (12,6-17,4)	16,9 (14,4-19,4)	*
15-17	47,4 (46,7-48,1)	14,4 (13,9-14,9)	17,1 (16,5-17,7)	20,8 (20,2-21,4)	0,3 (0,1-0,4)
18-19	37,0 (36,2-38,0)	18,0 (17,3-18,8)	20,6 (19,8-21,4)	23,8 (23,0-24,7)	0,5 (0,2-0,6)
20-24	33,4 (31,4-35,3)	16,8 (15,2-18,3)	21,1 (19,4-22,8)	28,0 (26,1-29,8)	0,8 (0,4-1,2)
25-34	28,3 (27,7-28,9)	13,3 (12,9-13,8)	25,0 (24,4-25,6)	32,9 (32,3-33,6)	0,5 (0,3-0,6)
35-44	22,3 (21,8-22,8)	13,6 (13,1-14,0)	28,9 (28,3-29,4)	35,1 (34,6-35,7)	0,2 (0,1-0,3)
45-54	17,6 (16,7-18,5)	11,8 (11,0-12,6)	33,0 (32,0-34,1)	37,4 (36,3-38,5)	0,2 (0,1-0,3)
55-59	14,9 (13,8-16,0)	9,2 (8,2-10,1)	36,2 (34,8-37,6)	39,4 (37,9-40,8)	0,4 (0,1-0,7)
60-64	13,1 (12,5-13,6)	7,6 (7,1-8,0)	37,5 (36,7-38,2)	41,1 (40,4-41,9)	0,8 (0,6-1,0)
65-74	9,8 (9,3-10,2)	5,3 (4,9-5,7)	37,6 (36,9-38,3)	47,1 (46,4-47,8)	0,3 (0,1-0,4)
75 ed oltre	3,5 (2,8-4,1)	2,0 (1,5-2,5)	25,9 (24,6-27,1)	68,2 (66,9-69,4)	0,4 (0,2-0,7)
<b>Totale</b>	<b>22,8 (22,4-23,2)</b>	<b>10,2 (9,9-10,5)</b>	<b>28,2 (27,8-28,6)</b>	<b>38,3 (37,8-38,8)</b>	<b>0,6 (0,5-0,6)</b>

-Dato non disponibile

\*Dato non attendibile

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100) che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2011**

<b>Regioni</b>	<b>Sport in modo continuativo</b>	<b>Sport in modo saltuario</b>	<b>Qualche attività fisica</b>	<b>Nessuno sport</b>	<b>Non indicato</b>
Piemonte	24,7 (24,1-25,4)	12,2 (11,7-12,7)	31,1(30,4-31,8)	31,5 (30,9-32,2)	0,4 (0,3-0,5)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	29,3 (28,1-30,4)	15,4 (14,5-16,4)	22,8 (21,7-23,8)	31,7 (30,5-32,9)	0,8 (0,5-1,1)
Lombardia	26,8 (26,5-27,1)	12,8 (12,6-13,1)	29,6 (29,3-29,9)	30,3 (30,0-30,6)	0,5 (0,3-0,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	37,9 (33,7-42,0)	18,9 (15,3-22,3)	27,9 (23,9-31,7)	15,1 (11,9-18,4)	0,3 (0,0-0,4)
<i>Trento</i>	28,7 (27,7-29,8)	17,6 (16,6-18,5)	40,0 (38,8-41,1)	13,5 (12,7-14,4)	n.a.
Veneto	28,7 (28,4-29,0)	12,6 (12,4-12,8)	34,5 (34,2-34,8)	23,9 (23,6-24,1)	0,3 (0,2-0,4)
Friuli Venezia Giulia	25,0 (23,3-26,7)	11,1 (9,8-12,4)	35,7 (33,9-37,6)	27,9 (26,2-29,7)	0,3 (0,1-0,4)
Liguria	21,8 (21,0-22,5)	8,3 (7,8-8,9)	26,9 (26,1-27,7)	42,6 (41,7-43,5)	0,4 (0,2-0,5)
Emilia-Romagna	26,4 (25,6-27,2)	11,5 (10,9-12,2)	31,5 (30,7-32,3)	30,5 (29,7-31,4)	0,0 (0,0-0,1)
Toscana	23,5 (22,7-24,2)	8,5 (8,0-9,0)	31,3 (30,5-32,1)	36,4 (35,6-37,3)	0,3 (0,2-0,4)
Umbria	21,2 (20,3-22,2)	13,4 (12,7-14,3)	27,6 (26,5-28,5)	37,5 (36,5-38,6)	0,3 (0,2-0,5)
Marche	23,7 (22,9-24,5)	10,5 (9,9-11,1)	28,6 (27,7-29,4)	36,3 (35,4-37,2)	0,9 (0,7-1,2)
Lazio	22,1 (21,3-22,8)	9,8 (9,2-10,4)	22,5 (21,8-23,3)	44,9 (44,0-45,7)	0,7 (0,5-0,9)
Abruzzo	20,8 (20,0-21,6)	9,5 (8,9-10,1)	28,7 (27,8-29,5)	40,4 (39,5-41,2)	0,6 (0,4-0,8)
Molise	20,5 (19,5-21,5)	7,5 (6,7-8,0)	21,4 (20,5-22,5)	50,3 (49,2-51,4)	0,2 (0,1-0,5)
Campania	13,1 (12,6-13,5)	6,3 (6,0-6,7)	23,5 (22,9-24,0)	56,3 (55,7-56,9)	0,8 (0,7-1,0)
Puglia	13,6 (13,0-14,2)	7,1 (6,6-7,5)	21,5 (20,9-22,2)	57,2 (56,5-58,0)	0,6 (0,4-0,7)
Basilicata	16,3 (15,4-17,1)	5,8 (5,2-6,3)	29,1 (28,0-30,0)	48,4 (47,4-49,5)	0,4 (0,2-0,5)
Calabria	14,4 (13,8-15,0)	7,6 (7,1-8,1)	26,4 (25,7-27,1)	51,0 (50,2-51,8)	0,5 (0,4-0,7)
Sicilia	15,1 (14,5-15,6)	7,9 (7,4-8,3)	19,4 (18,8-20,0)	57,0 (56,3-57,7)	0,6 (0,5-0,8)
Sardegna	21,6 (20,8-22,4)	10,6 (10,0-11,2)	32,5 (31,6-33,4)	35,2 (34,3-36,1)	0,2 (0,1-0,3)
<b>Italia</b>	<b>21,9 (21,7-22,1)</b>	<b>10,2 (10,0-10,3)</b>	<b>27,7 (27,4-27,9)</b>	<b>39,8 (39,6-40,0)</b>	<b>0,5 (0,4-0,5)</b>

n.a. = non applicabile

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 3 anni ed oltre (per 100) che praticano sport o attività fisica per classe di età e genere - Anno 2011**

Classi d'età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
<b>MASCHI</b>					
3-5	18,6 (17,1-20,2)	4,5 (3,5-5,3)	23,6 (21,9-25,2)	50,0 (48,1-51,8)	3,4 (2,6-4,2)
6-10	57,4 (57,1-57,7)	8,6 (8,4-8,8)	11,1 (10,9-11,3)	21,8 (21,5-22,1)	1,1 (1,0-1,1)
11-14	59,3 (56,9-61,7)	10,8 (9,0-12,5)	14,7 (12,8-16,6)	14,7 (12,8-16,6)	0,5 (0,0-1,0)
15-17	51,9 (51,2-52,7)	17,8 (17,1-18,5)	13,7 (13,1-14,3)	16,2 (15,5-16,8)	0,4 (0,3-0,6)
18-19	42,8 (41,7-43,9)	16,5 (15,6-17,3)	20,9 (20,0-21,9)	19,8 (19,9-20,8)	-
20-24	44,3 (42,7-45,8)	18,4 (17,1-19,7)	16,8 (15,5-18,0)	20,4 (19,1-21,8)	*
25-34	34,5 (34,0-35,0)	17,7 (17,2-18,1)	19,1 (18,6-19,5)	28,4 (28,0-28,9)	0,3 (0,2-0,4)
35-44	23,1 (22,6-23,5)	16,7 (16,3-17,1)	25,0 (24,6-25,4)	35,0 (34,5-35,5)	0,3 (0,2-0,3)
45-54	19,5 (18,7-20,2)	14,2 (13,6-14,9)	28,6 (27,8-29,4)	37,7 (36,8-38,5)	0,1 (0,0-0,2)
55-59	16,8 (15,8-17,7)	10,9 (10,1-11,8)	31,5 (30,3-32,6)	40,7 (39,4-41,9)	0,2 (0,0-0,4)
60-64	15,4 (14,8-16,0)	9,6 (9,1-10,1)	37,6 (36,9-38,3)	37,1 (36,4-37,8)	0,4 (0,3-0,5)
65-74	11,0 (10,5-11,4)	6,8 (6,4-7,1)	40,7 (40,1-41,3)	41,3 (40,7-41,9)	0,2 (0,1-0,3)
75 ed oltre	4,7 (4,0-5,5)	2,7 (2,1-3,3)	30,9 (29,6-32,3)	61,1 (59,7-62,5)	0,5 (0,2-0,8)
<b>Totale</b>	<b>26,0 (25,7-26,3)</b>	<b>12,6 (12,3-12,8)</b>	<b>26,0 (25,7-26,3)</b>	<b>35,0 (34,6-35,3)</b>	<b>0,4 (0,3-0,4)</b>
<b>FEMMINE</b>					
3-5	20,9 (19,3-22,5)	2,6 (1,9-3,4)	24,0 (22,2-25,6)	47,7 (45,8-49,6)	4,8 (3,9-5,8)
6-10	51,3 (51,0-51,6)	7,2 (7,0-7,3)	15,7 (15,4-15,9)	25,1 (24,8-25,3)	0,8 (0,7-0,9)
11-14	52,6 (50,0-55,2)	9,9 (8,2-11,7)	17,0 (15,0-19,2)	19,6 (17,4-21,8)	0,9 (0,5-1,6)
15-17	40,8 (40,1-41,7)	13,0 (12,4-13,7)	21,2 (20,4-21,9)	24,6 (23,9-25,4)	0,4 (0,2-0,5)
18-19	28,5 (27,5-29,7)	12,5 (11,7-13,4)	26,8 (25,7-27,8)	32,0 (30,9-33,0)	0,2 (0,0-0,3)
20-24	24,4 (23,0-25,9)	14,2 (13,0-15,4)	27,8 (26,3-29,3)	33,0 (31,5-34,6)	0,5 (0,1-0,8)
25-34	20,8 (20,4-21,3)	11,8 (11,4-12,1)	31,0 (30,5-31,5)	36,2 (35,7-36,7)	0,2 (0,2-0,3)
35-44	17,2 (16,8-17,6)	11,3 (11,0-11,6)	31,0 (30,5-31,4)	40,2 (39,7-40,7)	0,3 (0,2-0,4)
45-54	14,2 (13,6-14,9)	8,6 (8,1-9,2)	35,3 (34,5-36,1)	41,4 (40,6-42,2)	0,4 (0,3-0,6)
55-59	11,4 (10,5-12,2)	6,2 (5,5-6,9)	36,5 (35,3-37,7)	45,6 (44,4-46,8)	0,3 (0,1-0,5)
60-64	12,9 (12,4-13,4)	5,2 (4,8-5,5)	33,7 (33,0-34,4)	47,5 (46,9-48,2)	0,7 (0,6-0,9)
65-74	8,6 (8,2-8,9)	3,3 (3,1-3,6)	34,1 (33,5-34,6)	53,7 (53,1-54,2)	0,3 (0,2-0,4)
75 ed oltre	1,8 (1,4-2,2)	1,2 (0,9-1,5)	19,3 (18,4-20,2)	77,0 (76,1-77,9)	0,6 (0,4-0,9)
<b>Totale</b>	<b>18,0 (17,7-18,3)</b>	<b>7,9 (7,7-8,1)</b>	<b>29,2 (28,9-29,5)</b>	<b>44,4 (44,0-44,7)</b>	<b>0,6 (0,5-0,6)</b>
<b>TOTALE</b>					
3-5	19,7 (18,7-20,8)	3,6 (3,0-4,1)	23,7 (22,6-24,8)	48,9 (47,6-50,1)	4,1 (3,5-4,7)
6-10	54,3 (54,1-54,5)	7,9 (7,8-8,0)	13,4 (13,2-13,5)	23,4 (23,2-23,6)	0,9 (0,9-1,0)
11-14	56,1 (54,4-57,7)	10,4 (9,2-11,5)	15,8 (14,5-17,1)	17,0 (16,7-18,4)	0,7 (0,3-1,1)
15-17	46,5 (46,0-47,0)	15,5 (15,0-15,9)	17,4 (16,9-17,8)	20,3 (19,8-20,7)	0,4 (0,3-0,5)
18-19	35,9 (35,2-36,6)	14,6 (14,4-15,0)	23,8 (23,1-24,4)	25,6 (25,0-26,3)	0,1 (0,0-0,2)
20-24	34,7 (33,6-35,7)	16,4 (15,7-17,2)	22,1 (21,2-23,1)	26,5 (25,6-27,5)	0,3 (0,1-0,5)
25-34	27,7 (27,3-28,0)	14,7 (14,4-15,0)	25,1 (24,7-25,4)	32,3 (32,0-32,7)	0,2 (0,2-0,3)
35-44	20,2 (19,9-20,4)	14,0 (13,8-14,2)	28,0 (27,7-28,3)	37,6 (37,3-37,9)	0,3 (0,2-0,3)
45-54	16,8 (16,3-17,3)	11,4 (11,0-11,8)	32,0 (31,5-32,5)	39,6 (39,0-40,1)	0,2 (0,2-0,3)
55-59	14,1 (13,4-14,7)	8,6 (8,0-9,1)	34,0 (33,2-34,8)	43,1 (42,3-43,9)	0,2 (0,1-0,4)
60-64	14,1 (13,8-14,4)	7,3 (7,0-7,6)	35,6 (35,1-36,0)	42,5 (42,1-43,0)	0,5 (0,5-0,7)
65-74	9,7 (9,4-9,9)	4,9 (4,7-5,1)	37,2 (36,8-37,5)	48,0 (47,6-48,3)	0,3 (0,2-0,3)
75 ed oltre	2,9 (2,6-3,3)	1,8 (1,5-2,1)	23,8 (23,1-24,5)	70,9 (70,1-71,6)	0,6 (0,4-0,8)
<b>Totale</b>	<b>21,9 (21,7-22,1)</b>	<b>10,2 (10,0-10,3)</b>	<b>27,7 (27,4-27,9)</b>	<b>39,8 (39,6-40,0)</b>	<b>0,5 (0,4-0,5)</b>

-Dato non disponibile

\*Dato non attendibile

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 1 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona) per consumo di alcuni cibi per regione - Anno 2009**

REGIONI	Gruppi di alimenti con distribuzione concorde rispetto all'indicatore obiettivo (r>0)						Indicatore obiettivo	Gruppi di alimenti con distribuzione discordante rispetto all'indicatore obiettivo (r<0)		
	0 ≤ r < 0,5		0,5 ≤ r ≤ 1					Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno	-1 ≤ r ≤ -0,5	
	da 2 a 4 porzioni di verdura, ortaggi o frutta al giorno	Dolci °	Salumi °	Ortaggi *	Verdure *	Formaggio*			Uova °	1 porzione di verdura, ortaggi o frutta al giorno
Trento	78,5 (76,9-80,3)	44,3 (42,4-46,2)	63,2 (61,4-65,0)	54,6 (52,8-56,6)	65,6 (63,8-67,4)	38,4 (36,5-40,3)	10,1 (8,8-11,7)	48,2 (46,2-50,0)	11,4 (9,9-12,9)	
Trentino-Alto Adige	77,0(75,7-78,3)	46,2 (44,9-47,7)	59,9 (58,5-61,2)	51,1 (49,7-52,5)	61,8 (60,5-63,2)	39,2 (37,8-40,6)	7,9 (6,9-8,8)	49,7 (48,3-51,1)	15,1 (13,9-16,3)	
Emilia-Romagna	75,9 (74,5-77,3)	53,8 (52,3-55,4)	69,4 (68,0-70,8)	51,2 (49,7-52,7)	55,9 (54,4-57,4)	23,1 (21,8-24,5)	7,0 (6,0-8,0)	55,4 (53,9-56,9)	17,1 (15,7-18,5)	
Valle d'Aosta	72,3 (70,0-74,4)	49,3 (46,6-51,0)	61,6 (59,7-63,9)	45,8 (43,4-47,7)	52,7 (50,7-55)	38,4 (36,1-40,4)	6,5 (4,7-7,6)	53,8 (51,5-55,8)	21,3 (19,5-23,8)	
Lombardia	75,6 (74,4-76,7)	52,7 (51,5-53,9)	67,9 (66,8-69,0)	44,5 (43,3-45,7)	53,2 (52,0-54,4)	30,4 (29,2-31,5)	5,9 (5,1-6,6)	52,3 (51,1-53,5)	18,6 (17,5-19,7)	
<b>4° QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 5,80</b>										
Piemonte	80,1 (78,9-81,3)	50,9 (49,4-52,3)	57,4 (56,0-58,8)	52,9 (51,4-54,3)	60,1 (58,6-61,5)	32,3 (30,9-33,6)	5,4 (4,6-6,1)	59,7 (58,3-61,2)	14,5 (13,4-15,7)	
Campania	74,0 (72,7-75,4)	44,4 (43,0-45,8)	63,7 (62,4-65,1)	32,7 (31,4-34,0)	41,1 (39,7-42,5)	10,5 (9,6-11,5)	5,4 (4,6-6,2)	63,3 (61,9-64,6)	20,6 (19,3-21,9)	
Bolzano/Bozen	75,4 (73,6-77,4)	48,2 (46,1-50,1)	56,4 (54,5-58,4)	47,4 (45,3-49,3)	57,9 (56,0-59,9)	39,9 (38,0-42,0)	5,3 (4,1-6,5)	51,3 (49,3-53,2)	19,2 (17,4-21,2)	
Umbria	79,2 (77,4-80,9)	51,5 (49,5-53,5)	65,8 (64,0-67,7)	48,5 (46,5-50,5)	58,0 (56,0-59,9)	22,9 (21,1-24,6)	5,3 (4,1-6,5)	60,5 (58,6-62,4)	15,5 (13,8-17,2)	
Liguria	82,0 (80,4-83,5)	49,3 (47,4-51,2)	59,4 (57,6-61,2)	44,6 (42,8-46,5)	50,9 (49,0-52,7)	23,4 (21,8-25,0)	4,9 (3,9-5,9)	60,2 (58,4-62,0)	13,0 (11,5-14,5)	
Friuli-Venezia Giulia	78,0 (76,3-79,7)	54,2 (52,3-56,1)	61,4 (59,5-63,2)	48,2 (46,3-50,1)	65,4 (63,6-67,2)	31,0 (29,3-32,9)	4,8 (3,8-5,9)	51,8 (49,9-53,7)	17,2 (15,5-18,9)	
<b>Italia</b>	<b>76,5 (76,1-76,9)</b>	<b>48,5 (48,1-48,9)</b>	<b>61,8 (61,4-62,2)</b>	<b>41,7 (41,3-42,1)</b>	<b>49,9 (49,5-50,3)</b>	<b>22,9 (22,6-23,3)</b>	<b>4,8 (4,6-5,0)</b>	<b>57,0 (56,6-57,4)</b>	<b>18,7 (18,3-19,1)</b>	
Sardegna	78,8 (77,1-80,5)	45,7 (43,8-47,5)	51,9 (50,0-53,7)	42,8 (41,0-44,7)	44,8 (43,0-46,6)	30,1 (28,3-31,8)	4,7 (3,8-5,8)	51,4 (49,5-53,2)	16,5 (14,9-18,1)	
Marche	78,0 (76,4-79,6)	51,7 (49,9-53,5)	65,3 (63,6-67,0)	45,4 (43,6-47,2)	56,3 (54,5-58,1)	14,3 (13,0-15,7)	4,5 (3,5-5,4)	52,7 (50,9-54,5)	17,5 (15,9-19,1)	
Molise	75,8 (73,9-77,8)	45,6 (43,6-47,8)	70,7 (68,7-72,5)	33,6 (31,5-35,6)	39,0 (36,9-41,1)	16,0 (14,3-17,6)	4,4 (3,4-5,6)	61,9 (60,0-64,0)	19,8 (17,7-21,6)	
Veneto	74,1 (72,7-75,6)	54,2 (52,7-55,7)	60,8 (59,4-62,3)	45,3 (43,7-46,8)	57,0 (55,5-58,5)	28,8 (27,3-30,2)	4,1 (3,3-4,9)	51,9 (50,4-53,4)	21,7 (20,3-23,2)	
Toscana	81,0 (79,7-82,3)	51,5 (50,0-53,0)	56,8 (55,3-58,3)	49,9 (48,4-51,5)	55,3 (53,8-56,8)	20,3 (19,1-21,6)	4,0 (3,3-4,8)	54,8 (53,3-56,4)	15,0 (13,8-16,3)	
Lazio	77,8 (76,4-79,3)	40,2 (38,6-41,8)	54,5 (52,9-56,1)	39,2 (37,6-40,8)	57,1 (55,5-58,7)	17,7 (16,4-19,0)	4,0 (3,2-4,8)	61,7 (60,2-63,3)	18,2 (16,7-19,6)	
<b>1° QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 3,76</b>										
Puglia	77,0 (75,6-78,5)	43,1 (41,5-44,7)	57,6 (56,0-59,2)	32,4 (30,9-33,9)	34,4 (32,9-35,9)	15,8 (14,6-17,0)	3,7 (2,9-4,4)	52,3 (50,7-53,9)	19,3 (17,9-20,7)	
Sicilia	73,4 (71,9-75,0)	43,0 (41,5-44,6)	61,1 (59,6-62,7)	30,2 (28,7-31,6)	36,6 (35,1-38,1)	19,1 (17,8-20,4)	3,7 (3,0-4,4)	62,0 (60,5-63,5)	22,8 (21,4-24,3)	
Abruzzo	75,1 (73,2-76,9)	51,5 (49,6-53,4)	63,4 (61,5-65,2)	34,4 (32,5-36,2)	40,2 (38,3-42,1)	14,2 (12,9-15,7)	3,4 (2,6-4,3)	61,2 (59,4-63,1)	21,5 (19,7-23,3)	
Calabria	74,4 (73,5-75,5)	47,9 (46,9-48,9)	65,4 (64,4-66,3)	32,4 (31,4-33,4)	35,8 (34,8-36,8)	24,7 (23,8-25,6)	2,9 (2,5-3,4)	65,0 (64,1-66,0)	22,6 (21,6-23,6)	
Basilicata	70,0 (66,7-73,5)	41,8 (38,3-45,1)	67,3 (64,2-70,5)	25,9 (22,9-29,1)	28,7 (25,5-31,8)	21,1 (18,2-24,0)	1,7 (0,5-2,8)	60,7 (57,4-64,0)	28,3 (24,8-31,7)	

\*Almeno una volta al giorno. °Almeno qualche volta alla settimana

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009

**Tabella 1** - (Segue) Percentuale di persone di 3 anni ed oltre (per 100 persone della stessa zona) per consumo di alcuni cibi per regione - Anno 2009

REGIONI	Gruppi di alimenti con distribuzione discordante rispetto all'indicatore obiettivo ( $r < 0$ )									
	-0,5 < r ≤ 0									
	Verdure, ortaggi o frutta *	Carni bianche °	Carne di maiale °	Pane, pasta, riso *	Carni bovine °	Latte *	Snack °	Pesce °	Frutta *	Legumi in scatola °
Trento	84,8 (83,4-86,0)	75,0 (73,4-76,7)	49,6 (47,8-51,6)	85,1 (83,8-86,4)	62,0 (60,1-63,8)	59,0 (57,1-60,8)	21,2 (19,5-22,8)	51,2 (49,2-53,0)	73,8 (72,2-75,5)	41,3 (39,3-43,2)
Trentino-Alto Adige	81,9 (80,9-83,0)	63,0 (61,7-64,4)	39,7 (38,3-41,1)	79,2 (78,1-80,3)	53,1 (51,7-54,5)	60,4 (59,0-61,7)	17,9 (16,8-19,1)	41,4 (40,1-42,8)	70,1 (68,9-71,4)	30,3 (29,0-31,6)
Emilia-Romagna	83,7 (82,6-84,8)	81,7 (80,5-82,8)	51,3 (49,7-52,8)	87,3 (86,3-88,2)	68,3 (66,9-69,7)	54,3 (52,8-55,8)	23,4 (22,1-24,8)	54,8 (53,3-56,3)	73,7 (72,4-75,1)	40,7 (39,2-42,2)
Valle d'Aosta	79,4 (77,1-80,6)	79,4 (77,1-80,6)	38,9 (36,9-41,2)	83,6 (82,2-85,3)	73,9 (72,1-75,8)	55,3 (53,1-57,4)	22,9 (20,8-24,7)	48,0 (45,8-50,1)	66,5 (64,7-68,7)	36,4 (34,4-38,7)
Lombardia	83,3 (82,4-84,2)	81,8 (80,9-82,7)	42,7 (41,5-43,9)	82,7 (81,8-83,6)	70,4 (69,4-71,5)	56,1 (54,9-57,3)	28,5 (27,4-29,6)	53,5 (52,3-54,7)	73,3 (72,3-74,3)	37,3 (36,1-38,5)
<b>4° QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 5,80</b>										
Piemonte	87,0 (86,1-88,0)	81,8 (80,7-82,9)	39,1 (37,6-40,5)	81,4 (80,3-82,5)	72,7 (71,4-73,9)	56,3 (54,9-57,7)	21,8 (20,5-23,0)	51,6 (50,2-53,1)	78,2 (77,0-79,4)	33,7 (32,3-35,1)
Campania	81,0 (79,9-82,0)	85,9 (85,0-86,9)	55,6 (54,2-57,0)	86,4 (85,5-87,3)	75,4 (74,2-76,5)	61,8 (60,4-63,1)	32,5 (31,2-33,8)	68,5 (67,3-69,8)	75,7 (74,5-76,9)	71,4 (70,2-72,7)
Bolzano/Bozen	79,0 (77,4-80,5)	50,6 (48,7-52,6)	29,4 (27,5-31,2)	73,1 (71,4-74,8)	43,9 (42,0-45,9)	61,9 (60,0-63,8)	14,5 (13,1-16,1)	31,3 (29,4-33,1)	66,2 (64,4-68,1)	18,9 (17,3-20,6)
Umbria	85,6 (84,2-86,9)	86,1 (84,7-87,3)	63,5 (61,5-65,3)	82,7 (81,3-84,2)	74,0 (72,3-75,7)	62,4 (60,5-64,2)	18,9 (17,2-20,5)	62,2 (60,3-64,1)	76,0 (74,3-77,6)	52,9 (51,0-54,9)
Liguria	81,9 (80,6-83,4)	77,2 (75,6-78,7)	34,7 (32,9-36,5)	83,5 (82,2-84,9)	67,5 (65,7-69,2)	58,2 (56,4-60,0)	20,0 (18,5-21,6)	57,9 (56,1-59,7)	76,7 (75,1-78,2)	33,7 (31,9-35,5)
Friuli-Venezia Giulia	83,9 (82,5-85,3)	78,2 (76,6-79,7)	45,9 (44,0-47,8)	81,2 (79,7-82,7)	66,9 (65,2-68,8)	57,8 (55,9-59,7)	21,2 (19,5-22,8)	52,9 (51,0-54,8)	69,7 (67,9-71,4)	32,4 (30,5-34,2)
<b>Italia</b>	<b>83,7 (83,4-84,0)</b>	<b>81,0 (80,7-81,3)</b>	<b>47,9 (47,5-48,3)</b>	<b>84,9 (84,6-85,2)</b>	<b>71,7 (71,3-72,0)</b>	<b>59,4 (59,0-59,8)</b>	<b>25,4 (25,0-25,8)</b>	<b>58,4 (58,0-58,8)</b>	<b>75,4 (75,0-75,7)</b>	<b>45,9 (45,5-46,3)</b>
Sardegna	81,2 (79,8-82,6)	76,4 (74,9-77,9)	54,4 (52,6-56,3)	80,1 (78,6-81,5)	70,4 (68,8-72,1)	62,3 (60,6-64,1)	23,7 (22,0-25,3)	55,1 (53,3-57,0)	75,6 (74,0-77,2)	36,8 (35,0-38,6)
Marche	85,8 (84,6-87,1)	85,5 (84,3-86,7)	51,9 (50,1-53,7)	89,0 (87,9-90,1)	71,4 (69,8-73,0)	60,2 (58,4-61,9)	19,8 (18,3-21,4)	61,6 (59,9-63,4)	75,5 (74,0-77,1)	37,8 (36,0-39,5)
Molise	84,7 (83,2-86,1)	80,8 (79,2-82,4)	58,1 (56,1-60,2)	88,8 (87,5-90,1)	68,2 (66,1-70,0)	61,9 (59,6-63,7)	33,7 (31,5-35,6)	64,5 (62,6-66,5)	79,4 (77,6-80,9)	64,4 (62,2-66,2)
Veneto	82,1 (80,9-83,2)	79,6 (78,4-80,8)	46,9 (45,3-48,4)	81,5 (80,3-82,6)	67,8 (66,4-69,2)	55,3 (53,8-56,8)	27,5 (26,1-29,0)	51,9 (50,4-53,4)	68,1 (66,7-69,5)	35,0 (33,5-36,4)
Toscana	85,4 (84,3-86,4)	85,6 (84,5-86,6)	53,0 (51,5-54,5)	89,0 (88,0-89,9)	76,6 (75,3-77,9)	66,9 (65,5-68,3)	19,3 (18,1-20,6)	58,7 (57,2-60,2)	77,7 (76,4-78,9)	48,2 (46,7-49,7)
Lazio	84,6 (83,4-85,7)	81,7 (80,5-82,9)	50,9 (49,3-52,5)	83,8 (82,6-85,0)	77,4 (76,1-78,8)	65,5 (64,0-67,0)	20,8 (19,5-22,2)	65,8 (64,3-67,3)	75,7 (74,4-77,1)	42,6 (41,0-44,2)
<b>1° QUINTO (Porzioni di verdura, ortaggi o frutta consumate 5 e più volte al giorno): 3,76</b>										
Puglia	85,6 (84,5-86,7)	74,3 (72,9-75,7)	43,9 (42,4-45,5)	85,3 (84,2-86,4)	65,5 (64,0-67,0)	68,8 (67,3-70,2)	27,6 (26,2-29,1)	60,7 (59,1-62,2)	81,2 (80,0-82,5)	59,2 (57,7-60,8)
Sicilia	84,2 (83,1-85,3)	78,5 (77,2-79,8)	47,0 (45,4-48,6)	89,6 (88,6-90,5)	76,3 (75,0-77,6)	53,9 (52,3-55,4)	26,9 (25,5-28,3)	62,4 (60,9-63,9)	79,3 (78,1-80,6)	51,2 (49,7-52,8)
Abruzzo	82,1 (80,7-83,6)	84,2 (82,8-85,6)	54,4 (52,4-56,3)	87,6 (86,3-88,8)	72,8 (71,0-74,4)	57,7 (55,8-59,6)	23,2 (21,5-24,9)	56,3 (54,4-58,2)	75,6 (73,9-77,2)	53,2 (51,3-55,1)
Calabria	81,6 (80,8-82,4)	83,1 (82,4-83,9)	53,3 (52,3-54,3)	90,8 (90,2-91,4)	74,6 (73,7-75,5)	57,6 (56,6-58,6)	30,9 (29,9-31,9)	68,2 (67,2-69,1)	75,4 (74,5-76,2)	65,0 (64,1-66,0)
Basilicata	84,7 (82,2-87,0)	77,3 (74,5-80,1)	50,3 (46,9-53,7)	87,9 (85,8-90,1)	64,5 (61,3-67,8)	59,3 (56,0-62,7)	29,7 (26,5-32,9)	57,3 (53,9-60,6)	78,8 (76,2-81,6)	67,9 (64,7-71,0)

\*Almeno una volta al giorno. °Almeno qualche volta alla settimana

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009

**Tabella 1 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre che consumano 5 porzioni e più al giorno di verdura, ortaggi e frutta, tasso medio annuo di variazione e quinto di appartenenza per regione - Anni 2005, 2011**

Regioni	5+VOF*		Tasso % (2005-2011)	Quinto	
	2005	2011		2005	2011
Piemonte	6,7 (6,2-7,1)	6,2 (5,8-6,6)	-1,3	5	4
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	4,4 (3,8-5,0)	6,4 (5,5-7,0)	6,4	2	4
Lombardia	4,9 (4,6-5,3)	6,0 (5,6-6,5)	3,3	5	3
<i>Bolzano-Bozen</i>	4,6 (3,9-5,3)	4,4 (3,6-5,0)	-0,7	5	2
<i>Trento</i>	8,7 (7,9-9,4)	7,4 (6,4-8,1)	-2,6	5	5
Veneto	6,7 (6,2-7,2)	6,0 (5,5-6,5)	-1,7	5	3
Friuli Venezia Giulia	7,7 (7,1-8,4)	7,0 (6,3-7,6)	-1,6	4	5
Liguria	5,5 (5,0-6,1)	5,3 (4,7-5,8)	-0,8	2	3
Emilia-Romagna	5,1 (4,6-5,5)	5,2 (4,7-5,7)	0,4	3	2
Toscana	5,7 (5,3-6,1)	3,8 (3,4-4,2)	-6,5	4	1
Umbria	5,2 (4,6-5,7)	6,4 (5,6-7,0)	3,6	3	4
Marche	4,5 (4,0-5,0)	5,5 (5,0-6,1)	3,4	2	3
Lazio	5,5 (5,0-6,0)	3,9 (3,4-4,3)	-5,6	3	2
Abruzzo	4,3 (3,9-4,7)	6,6 (6,1-7,2)	7,5	1	5
Molise	4,7 (4,2-5,3)	6,1 (5,5-6,9)	4,3	2	4
Campania	5,9 (5,6-6,3)	3,8 (3,5-4,1)	-7,2	4	1
Puglia	3,3 (3,0-3,6)	2,7 (2,4-3,0)	-3,4	1	1
Basilicata	3,2 (2,9-3,6)	4,7 (4,2-5,4)	6,5	1	2
Calabria	2,5 (2,1-2,8)	2,5 (2,2-2,8)	0,3	1	1
Sicilia	4,4 (4,1-4,8)	3,7 (3,4-4,0)	-2,9	1	1
Sardegna	6,4 (5,9-7,0)	8,1 (7,5-8,8)	3,9	4	5
<b>Italia</b>	<b>5,3 (5,1-5,4)</b>	<b>4,9 (4,8-5,1)</b>	<b>-1,3</b>		

\*Per 100 persone di 3 anni ed oltre che consumano almeno una porzione al giorno di VOF nella regione

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito [www.osservasalute.it](http://www.osservasalute.it)

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana, 2011, 2005". Anno 2012

**Tabella 1 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre per consumo di alcuni cibi in relazione all'indicatore obiettivo (5 porzioni e più al giorno di Verdura, Ortaggi e Frutta) per regione - Anno 2010**

	TRE	PIE	SAR	VDA	FVG	CAM	LOM	VEN	TOS	LAZ	ABR
VOF 1 <sup>a</sup>	16,7 (15,7-18,0)	13,6 (12,9-14,3)	17,0 (16,2-17,9)	15,9 (14,8-17,0)	14,8 (14,0-15,6)	19,1 (18,6-19,6)	17,4 (16,9-17,9)	20,3 (19,6-21,0)	16,9 (16,1-17,8)	16,0 (15,2-16,8)	21,6 (20,6-22,7)
Frutta*	73,2 (72,1-74,2)	79,1 (78,4-79,7)	76,3 (75,5-77,1)	75,8 (74,7-76,9)	73,6 (72,8-74,5)	78,1 (77,6-78,6)	73,1 (72,5-73,6)	69,5 (68,8-70,2)	79,3 (78,6-80,1)	77,5 (76,7-78,2)	72,8 (71,9-73,7)
VOF <sup>o</sup>	84,1 (83,2-84,9)	87,1 (86,6-87,7)	84,2 (83,5-84,9)	86,3 (85,4-87,2)	86,2 (85,6-86,9)	82,9 (82,4-83,3)	83,1 (82,6-83,6)	82,9 (82,4-83,5)	87,1 (86,5-87,7)	85,4 (84,8-86,0)	79,9 (79,1-80,7)
VOF da 2 a 4 <sup>a</sup>	75,5 (74,5-76,7)	79,6 (78,8-80,3)	76,4 (75,5-77,3)	77,6 (76,4-78,7)	79,4 (78,5-80,1)	75,0 (74,4-75,5)	76,8 (76,2-77,3)	73,8 (73,1-74,6)	77,2 (76,4-78,1)	78,2 (77,4-79,0)	72,6 (71,5-73,6)
Ortaggi*	56,4 (55,2-57,6)	53,8 (53,0-54,7)	39,9 (38,9-40,8)	52,4 (51,1-53,7)	50,0 (49,1-51,0)	32,7 (32,2-33,3)	44,6 (44,0-45,3)	45,6 (44,8-46,3)	49,8 (48,8-50,7)	43,7 (42,9-44,6)	33,2 (32,2-34,3)
Verdure* <sup>o</sup>	67,5 (66,4-68,7)	62,1 (61,3-62,9)	45,9 (44,9-46,8)	60,6 (59,2-61,7)	65,9 (65,0-66,8)	42,1 (41,5-42,7)	54,0 (53,4-54,6)	58,0 (57,3-58,7)	55,3 (54,3-56,2)	57,6 (56,7-58,4)	40,0 (38,9-41)
5+VOF <sup>a</sup>	7,8 (6,9-8,7)	6,8 (6,3-7,3)	6,6 (6,0-7,2)	6,5 (5,7-7,3)	5,9 (5,3-6,4)	5,9 (5,6-6,2)	5,8 (5,5-6,2)	5,8(5,4-6,2)	5,8 (5,2-6,4)	5,8 (5,3-6,3)	5,8 (5,1-6,4)
Quinto	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Formaggio*	43,3 (42,2-44,7)	31,0 (30,2-31,9)	33,0 (32,0-33,9)	46,8 (45,5-48,1)	34,4 (33,5-35,3)	10,4 (10,0-10,8)	31,8 (31,2-32,4)	31,4 (30,7-32,1)	24,4 (23,6-25,3)	17,1 (16,4-17,8)	18,0 (17,1-18,8)
Dolci <sup>o</sup>	50,7 (49,6-52,0)	50,3 (49,4-51,1)	49,0 (48,0-49,9)	55,7 (54,4-56,9)	52,5 (51,5-53,5)	46,1 (45,5-46,7)	53,7 (53,1-54,3)	56,0 (55,3-56,7)	50,8 (49,9-51,8)	43,6 (42,7-44,5)	55,9 (54,8-56,9)
Latte*	60,6 (59,4-61,7)	55,4 (54,6-56,3)	59,1 (58,1-60,0)	58,9 (57,6-60,1)	59,2 (58,3-60,2)	59,9 (59,3-60,4)	57,5 (56,9-58,1)	56,0 (55,3-56,7)	67,8 (67,0-68,7)	66,3 (65,5-67,1)	59,1 (58,1-60,2)
Carni bianche <sup>o</sup>	74,3 (73,3-75,3)	83,6 (83,0-84,2)	76,8 (76,0-77,6)	81,5 (80,5-82,4)	80,1 (79,4-80,9)	85,2 (84,8-85,6)	81,2 (80,7-81,6)	79,7 (79,1-80,3)	85,1 (84,4-85,7)	81,0 (80,4-81,7)	85,7 (84,9-86,4)
Carni bovine <sup>o</sup>	59,2 (58,0-60,4)	72,9 (72,1-73,6)	69,3 (68,4-70,1)	78,8 (77,2-79,3)	64,8 (63,8-65,7)	73,8 (73,3-74,4)	69,3 (68,7-69,8)	68,8 (68,1-69,4)	72,4 (71,6-73,2)	74,1 (73,3-74,9)	73,0 (72,1-74,0)
Pane, pasta, riso*	83,6 (82,6-84,3)	83,3 (82,7-83,9)	79,6 (78,8-80,3)	82,3 (81,3-83,2)	81,8 (81,0-82,5)	87,7 (87,3-88,1)	82,8 (82,3-83,3)	83,0 (82,4-83,5)	89,7 (89,1-90,2)	83,3 (82,7-84,0)	88,7 (88,1-89,4)
Carni di maiale <sup>o</sup>	45,6 (44,4-46,9)	38,1 (37,3-38,9)	60,2 (59,3-61,1)	37,9 (36,6-39,2)	46,0 (45,0-46,9)	56,0 (55,4-56,6)	39,9 (39,3-40,5)	44,1 (43,3-44,8)	51,2 (50,2-52,1)	48,2 (47,3-49,1)	54,3 (53,3-55,3)
Snack <sup>o</sup>	22,9 (21,8-24,0)	22,4 (21,7-23,2)	21,5 (20,6-22,3)	19,9 (19,1-21,3)	20,0 (19,1-20,8)	32,4 (31,8-32,9)	28,8 (28,3-29,4)	27,3 (26,7-28,0)	18,9 (18,2-19,7)	21,6 (20,8-22,3)	28,5 (27,6-29,5)
Pesce <sup>o</sup>	47,3 (46,2-48,6)	53,9 (53,0-54,7)	55,8 (54,8-56,7)	54,9 (53,6-56,1)	50,6 (49,7-51,6)	72,9 (72,4-73,5)	55,8 (55,2-56,4)	51,0 (50,3-51,8)	60,5 (59,6-61,4)	62,5 (61,7-63,4)	60,3 (59,2-61,2)
Salumi <sup>o</sup>	61,4 (60,2-62,5)	56,4 (55,6-57,2)	56,0 (55,0-56,9)	63,8 (62,5-64,9)	62,4 (61,5-63,4)	64,2 (63,6-64,7)	66,4 (65,9-67,0)	57,8 (57,1-58,5)	60,8 (59,9-61,7)	57,0 (56,1-57,8)	66,0 (65,0-67,0)
Uova <sup>o</sup>	46,1 (45,0-47,4)	57,6 (56,8-58,4)	55,3 (54,3-56,2)	60,5 (59,2-61,7)	54,0 (53,1-55,0)	62,7 (62,1-63,2)	49,6 (48,9-50,2)	49,7 (48,9-50,4)	55,0 (54,0-55,9)	59,1 (58,3-60,0)	63,3 (62,3-64,3)
Legumi in scatola <sup>o</sup>	39,9 (38,6-41,1)	31,8 (31,0-32,7)	40,0 (39,0-40,9)	37,8 (36,6-39,2)	32,3 (31,4-33,2)	78,7 (78,2-79,2)	36,5 (35,9-37,1)	34,7 (34,0-35,4)	48,3 (47,4-49,3)	43,6 (42,7-44,5)	56,5 (55,4-57,5)

<sup>a</sup>Per 100 persone di 3 anni ed oltre che consumano almeno una porzione al giorno di VOF nella regione.

\*Almeno una volta al giorno.

<sup>o</sup>Almeno qualche volta alla settimana.

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana, 2011, 2005". Anno 2012



**Tabella 1 - (segue) Percentuale di persone di 3 anni ed oltre per consumo di alcuni cibi in relazione all'indicatore obiettivo (5 porzioni e più al giorno di Verdura, Ortaggi e Frutta) per regione - Anno 2010**

	MAR	BOL	ITALIA	E-R	LIG	SIC	UMB	CAL	MOL	PUG	BAS
VOF 1 <sup>a</sup>	18,9 (18,0-19,8)	25,9 (24,6-27,2)	18,0 (17,9-18,2)	15,3 (14,6-15,9)	15,4 (14,5-16,2)	19,3 (18,7-19,9)	16,8 (15,7-17,9)	21,7 (20,9-22,4)	19,5 (18,4-20,6)	22,8 (22,1-23,5)	26,3 (25,2-27,4)
Frutta*	72,7 (71,8-73,5)	62,1 (61,0-63,3)	76,2 (76,0-76,4)	75,5 (74,9-76,2)	77,2 (76,4-78,0)	80,3 (79,7-80,8)	76,8 (75,8-77,7)	74,1 (73,4-74,8)	81,4 (80,5-82,2)	82,3 (81,7-82,9)	77,2 (76,2-78,0)
VOF <sup>o</sup>	85,2 (84,6-85,9)	77,0 (76,2-78,1)	84,2 (84,1-84,4)	84,0 (83,5-84,6)	83,5 (82,8-84,2)	83,8 (83,4-84,3)	84,3 (83,5-85,2)	79,6 (79,0-80,3)	85,8 (85,1-86,6)	87,7 (87,2-88,2)	83,0 (82,2-83,9)
VOF da 2 a 4 <sup>a</sup>	75,3 (74,5-76,2)	68,5 (67,2-69,7)	76,5 (76,3-76,7)	79,3 (78,6-79,9)	79,5 (78,6-80,3)	76,2 (75,6-76,8)	78,9 (77,9-80,0)	74,1 (73,3-74,9)	76,9 (75,7-77,8)	74,0 (73,3-74,7)	70,5 (69,4-71,6)
Ortaggi*	46,5 (45,6-47,5)	39,5 (38,3-40,7)	42,1 (41,9-42,3)	50,1 (49,4-50,9)	45,4 (44,4-46,4)	31,5 (30,9-32,1)	48,1 (47,0-49,3)	28,5 (27,7-29,2)	36,4 (35,2-37,5)	32,9 (32,2-33,6)	23,7 (22,6-24,6)
Verdure* <sup>o</sup>	56,6 (55,7-57,6)	51,4 (50,2-52,5)	50,9 (50,7-51,1)	56,5 (55,7-57,2)	53,7 (52,8-54,7)	39,9 (39,2-40,5)	55,1 (53,9-56,2)	36,1 (35,3-36,8)	37,9 (36,8-39,1)	35,6 (34,9-36,3)	29,1 (28,0-30,1)
5+VOF <sup>a</sup>	5,7 (5,1-6,3)	5,6 (4,9-6,5)	5,5 (5,4-5,6)	5,5 (5,0-5,9)	5,1 (4,6-5,7)	4,5 (4,2-4,9)	4,3 (3,7-5,0)	4,2 (3,8-4,6)	3,5 (2,8-3,9)	3,1 (2,8-3,5)	3,1 (2,6-3,7)
Quinto	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Formaggio*	13,8 (13,1-14,5)	43,1 (41,8-44,2)	24,5 (24,4-24,7)	26,2 (25,5-26,9)	26,4 (25,5-27,3)	22,1 (21,5-22,7)	16,9 (16,0-17,9)	26,9 (26,2-27,6)	16,8 (15,8-17,7)	19,5 (18,9-20,2)	16,2 (15,4-17,1)
Dolci <sup>o</sup>	52,9 (51,9-53,8)	47,3 (46,2-48,6)	49,8 (49,6-50,0)	56,3 (55,5-57,0)	48,5 (47,5-49,4)	44,5 (43,9-45,2)	50,2 (49,1-51,4)	48,5 (47,8-49,4)	47,8 (46,7-49,1)	43,2 (42,4-43,9)	43,5 (42,4-44,6)
Latte*	59,4 (58,5-60,3)	60,0 (58,9-61,2)	58,9 (58,7-59,1)	51,7 (50,9-52,4)	58,9 (57,9-59,8)	52,0 (51,3-52,6)	58,5 (57,3-59,6)	58,4 (57,6-59,2)	61,1 (60,0-62,2)	66,1 (65,4-66,8)	56,9 (55,7-57,9)
Carni bianche <sup>o</sup>	85,0 (84,3-85,7)	51,7 (50,6-53,0)	81,2 (81,0-81,3)	80,7 (80,1-81,3)	81,0 (80,3-81,7)	79,1 (78,5-79,6)	87,2 (86,5-88,0)	81,1 (80,5-81,8)	85,9 (85,1-86,6)	76,7 (76,1-77,4)	80,3 (79,4-81,1)
Carni bovine <sup>o</sup>	73,4 (72,6-74,2)	43,2 (42,0-44,4)	70,7 (70,5-70,9)	67,3 (66,6-68,0)	69,7 (68,8-70,6)	73,7 (73,1-74,3)	77,5 (76,5-78,4)	72,0 (71,3-72,8)	76,8 (75,9-77,8)	67,1 (66,4-67,8)	66,0 (64,9-66,9)
Pane, pasta, riso*	87,7 (87,1-88,3)	73,6 (72,6-74,6)	84,9 (84,8-85,1)	85,8 (85,3-86,3)	81,1 (80,4-81,9)	88,2 (87,8-88,6)	85,7 (84,9-86,5)	89,2 (88,8-89,7)	79,8 (78,8-80,7)	84,2 (83,7-84,8)	91,6 (91,0-92,2)
Carni di maiale <sup>o</sup>	53,1 (52,2-54,1)	29,3 (28,2-30,5)	47,0 (46,8-47,1)	50,9 (50,2-51,7)	35,5 (34,5-36,4)	44,3 (43,7-45,0)	62,8 (61,7-63,9)	51,6 (50,8-52,4)	61,2 (60,0-62,2)	47,2 (46,4-47,9)	50,7 (49,6-51,8)
Snack <sup>o</sup>	21,6 (20,8-22,4)	15,1 (14,2-16,1)	25,4 (25,2-25,5)	24,2 (23,5-24,9)	19,0 (18,2-19,8)	24,6 (24,0-25,1)	20,0 (19,0-21,1)	31,8 (31,0-32,5)	30,6 (29,4-31,7)	26,8 (26,1-27,5)	26,8 (25,7-27,8)
Pesce <sup>o</sup>	65,4 (64,5-66,3)	28,8 (27,8-30,0)	59,2 (59,0-59,4)	53,0 (52,2-53,7)	62,9 (62,0-63,9)	62,7 (62,1-63,3)	58,7 (57,5-59,8)	65,5 (64,8-66,3)	66,3 (65,1-67,3)	60,9 (60,2-61,7)	60,0 (58,9-61,0)
Salumi <sup>o</sup>	65,4 (64,5-66,3)	60,3 (59,1-61,4)	62,0 (61,9-62,2)	67,6 (66,9-68,3)	57,6 (56,7-58,6)	61,2 (60,6-61,8)	64,6 (63,4-65,6)	68,6 (67,9-69,4)	73,1 (72,0-74,0)	59,9 (59,1-60,6)	63,9 (62,8-64,9)
Uova <sup>o</sup>	56,0 (55,1-57,0)	50,2 (49,1-51,5)	55,9 (55,7-56,1)	51,9 (51,1-52,7)	61,1 (60,2-62,1)	59,7 (59,1-60,3)	60,8 (59,7-62,0)	63,8 (63,1-64,6)	69,0 (68,1-70,2)	54,3 (53,5-55,0)	61,7 (60,6-62,8)
Legumi in scatola <sup>o</sup>	40,9 (39,9-41,8)	21,2 (20,1-22,3)	46,0 (45,8-46,2)	39,4 (38,6-40,2)	36,5 (35,5-37,4)	48,5 (47,8-49,1)	48,3 (47,1-49,5)	62,9 (62,2-63,7)	66,0 (64,8-67,0)	55,1 (54,4-55,9)	71,7 (70,7-72,7)

<sup>a</sup>Per 100 persone di 3 anni ed oltre che consumano almeno una porzione al giorno di VOF nella regione.

\*Almeno una volta al giorno.

<sup>o</sup>Almeno qualche volta alla settimana.

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana, 2011, 2005". Anno 2012

**Tabella 2 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre per consumo di alcuni cibi in relazione all'indicatore obiettivo (5 porzioni e più al giorno di Verdura, Ortaggi e Frutta) per regione - Anno 2011**

	SAR	TRE	FVG	ABR	VDA	UMB	PIE	MOL	LOM	VEN	MAR
VOF 1 <sup>a</sup>	15,4 (14,6-16,2)	15,6 (14,6-16,8)	14,5 (13,6-15,3)	15,9 (15,2-16,7)	18,8 (17,6-19,9)	16,8 (15,9-17,8)	15,1 (14,5-15,7)	21,5 (20,5-22,6)	19,2 (18,5-19,9)	18,1 (17,4-18,8)	14,8 (14,1-15,6)
Frutta*	80,0 (79,2-80,7)	72,8 (71,8-73,9)	75,4 (74,5-76,2)	80,7 (80,0-81,4)	66,7 (65,5-67,8)	77,5 (76,5-78,3)	78,4 (77,8-79,0)	81,6 (80,6-82,3)	72,6 (72,0-73,2)	72,3 (71,6-73,1)	78,7 (77,9-79,4)
VOF <sup>o</sup>	85,9 (85,2-86,5)	84,2 (83,2-84,9)	86,5 (85,7-87,1)	86,4 (85,8-87,1)	78,0 (77,0-79,1)	86,8 (86,0-87,5)	88,3 (87,9-88,8)	87,9 (87,1-88,5)	83,4 (82,9-83,9)	85,2 (84,6-85,8)	87,8 (87,2-88,3)
VOF da 2 a 4 <sup>a</sup>	76,5 (75,7-77,4)	77,0 (75,9-78,2)	78,6 (77,7-79,5)	77,5 (76,7-78,3)	74,0 (72,7-75,2)	76,8 (75,9-77,8)	78,7 (78,1-79,3)	72,4 (71,2-73,3)	74,8 (74,1-75,4)	75,9 (75,2-76,7)	79,6 (78,9-80,4)
Verdure* <sup>o</sup>	47,4 (46,4-48,3)	67,7 (66,6-68,9)	63,5 (62,5-64,5)	48,1 (47,2-49,0)	52,0 (50,8-53,3)	56,1 (55,1-57,2)	60,5 (59,8-61,2)	36,0 (34,8-37,0)	53,4 (52,7-54,1)	59,7 (58,9-60,5)	58,7 (57,8-59,6)
Ortaggi*	44,1 (43,2-45,1)	57,9 (56,7-59,1)	48,0 (47,0-49,1)	41,2 (40,3-42,1)	45,5 (44,3-46,8)	49,0 (47,9-50,1)	54,2 (53,5-55,0)	28,9 (27,8-29,9)	45,2 (44,5-45,9)	49,9 (49,1-50,7)	50,3 (49,4-51,2)
5+VOF <sup>o</sup>	8,1 (7,5-8,8)	7,4 (6,4-8,1)	7,0 (6,3-7,6)	6,6 (6,1-7,2)	6,4 (5,5-7,0)	6,4 (5,6-7,0)	6,2 (5,8-6,6)	6,1 (5,5-6,9)	6,0 (5,6-6,5)	6,0 (5,5-6,5)	5,5 (5,0-6,1)
Quinto	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3
Dolci <sup>o</sup>	50,9 (49,9-51,8)	45,6 (44,2-46,7)	52,9 (51,9-53,9)	48,1 (47,2-49,0)	51,2 (50,0-52,5)	52,7 (51,6-53,8)	51,3 (50,5-52,0)	49,8 (48,6-50,8)	54,2 (53,5-54,9)	57,8 (57,0-58,6)	54,4 (53,4-55,2)
Formaggio*	32,9 (31,9-33,7)	34,2 (33,0-35,5)	33,4 (32,4-34,4)	17,0 (16,3-17,7)	39,0 (37,8-40,2)	17,4 (16,5-18,2)	32,0 (31,3-32,7)	16,3 (15,4-17,2)	30,3 (29,6-31,0)	29,9 (29,1-30,6)	16,8 (16,1-17,5)
Carni di maiale <sup>o</sup>	55,6 (54,6-56,5)	43,5 (42,3-44,7)	45,6 (44,6-46,6)	53,6 (52,7-54,5)	40,7 (39,4-41,9)	64,2 (63,2-65,3)	38,4 (37,7-39,1)	59,3 (58,2-60,4)	39,9 (39,2-40,6)	43,6 (42,7-44,4)	50,7 (49,8-51,6)
Carni bianche <sup>o</sup>	76,9 (76,1-77,7)	76,2 (75,1-77,2)	78,9 (78,0-79,6)	84,2 (83,6-84,9)	85,4 (84,5-86,2)	86,6 (85,8-87,3)	83,8 (83,3-84,4)	83,1 (82,2-83,8)	83,7 (83,2-84,3)	79,1 (78,5-79,8)	84,7 (84,0-85,3)
Carni bovine <sup>o</sup>	70,2 (69,4-71,1)	57,4 (56,3-58,7)	62,2 (61,2-63,2)	71,8 (71,0-72,7)	76,4 (75,4-77,5)	75,4 (74,5-76,4)	71,9 (71,3-72,5)	68,6 (67,6-69,6)	67,9 (67,2-68,5)	66,7 (65,9-67,5)	71,0 (70,2-71,8)
Latte*	62,4 (61,5-63,3)	58,8 (57,6-60,1)	58,1 (57,1-59,1)	60,0 (59,2-60,9)	50,4 (49,2-51,6)	65,4 (64,4-66,4)	55,8 (55,1-56,6)	67,0 (65,9-68,0)	57,6 (56,9-58,3)	56,5 (55,7-57,3)	58,6 (57,7-59,5)
Pane, pasta, riso*	83,8 (83,1-84,5)	83,5 (82,6-84,4)	80,9 (80,1-81,6)	89,6 (89,1-90,2)	80,4 (79,5-81,4)	85,1 (84,3-85,8)	84,1 (83,6-84,6)	90,7 (90,1-91,3)	81,0 (80,4-81,5)	83,3 (82,7-83,8)	86,8 (86,2-87,4)
Salumi <sup>o</sup>	54,4 (53,4-55,3)	58,2 (56,9-59,3)	63,0 (62,0-64,0)	58,2 (57,3-59,1)	62,2 (61,4-63,8)	65,1 (64,0-66,1)	56,5 (55,8-57,3)	70,6 (69,5-71,5)	67,8 (67,1-68,4)	59,3 (58,5-60,1)	67,6 (66,8-68,4)
Snack <sup>o</sup>	23,4 (22,6-24,2)	19,3 (18,2-20,3)	22,1 (21,2-23,0)	25,5 (24,7-26,3)	24,5 (23,3-25,5)	19,3 (18,4-20,2)	21,0 (20,3-21,6)	31,8 (30,7-32,8)	31,8 (31,2-32,5)	28,4 (27,6-29,2)	18,9 (18,2-19,7)
Pesce <sup>o</sup>	55,4 (54,4-56,3)	50,3 (49,2-51,6)	50,0 (49,0-51,0)	61,1 (60,2-62,0)	53,6 (52,4-54,9)	64,0 (62,9-65,0)	52,9 (52,2-53,7)	59,5 (58,5-60,7)	56,9 (56,2-57,6)	51,9 (51,1-52,8)	64,4 (63,5-65,2)
Legumi in scatola <sup>o</sup>	38,2 (37,2-39,1)	41,2 (39,9-42,4)	37,1 (36,1-38,1)	56,8 (55,9-57,7)	39,8 (38,6-41,1)	56,7 (55,7-57,8)	33,8 (33,1-34,5)	61,9 (60,8-62,9)	36,1 (35,4-36,8)	35,0 (34,3-35,8)	41,7 (40,8-42,6)
Uova <sup>o</sup>	54,0 (53,1-54,9)	45,6 (44,4-46,9)	52,6 (51,6-53,6)	60,9 (60,0-61,8)	54,5 (53,2-55,7)	60,6 (59,4-61,6)	58,6 (57,9-59,3)	65,6 (64,7-66,8)	51,0 (50,3-51,7)	51,5 (50,6-52,3)	55,1 (54,2-56,0)

<sup>a</sup>Per 100 persone di 3 anni ed oltre che consumano almeno una porzione al giorno di VOF nella regione.

\*Almeno una volta al giorno.

<sup>o</sup>Almeno qualche volta alla settimana.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana, 2011, 2005". Anno 2012

**Tabella 2 - (segue) Percentuale di persone di 3 anni ed oltre per consumo di alcuni cibi in relazione all'indicatore obiettivo (5 porzioni e più al giorno di Verdura, Ortaggi e Frutta) per regione - Anno 2011**

	LIG	E-R	Italia	BAS	BOL	LAZ	TOS	CAM	SIC	PUG	CAL
VOF 1 <sup>a</sup>	15,3 (14,5-16,1)	16,8 (16,0-17,5)	18,5 (18,3-18,7)	25,9 (24,8-27,0)	20,0 (18,8-21,2)	17,6 (16,8-18,4)	16,6 (15,9-17,4)	22,2 (21,6-22,8)	19,7 (19,1-20,4)	22,1 (21,3-22,8)	23,4 (22,7-24,2)
Frutta*	79,9 (79,2-80,7)	74,4 (73,6-75,1)	76,3 (76,1-76,5)	74,9 (74,1-75,9)	66,9 (65,8-67,9)	74,7 (74,0-75,4)	75,6 (74,9-76,3)	77,3 (76,8-77,8)	80,0 (79,4-80,5)	81,7 (81,1-82,3)	79,5 (78,9-80,2)
VOF <sup>o</sup>	87,1 (86,5-87,7)	85,0 (84,4-85,6)	85,0 (84,9-85,2)	79,6 (78,9-80,6)	75,6 (74,7-76,6)	84,8 (84,2-85,3)	84,9 (84,3-85,5)	83,0 (82,5-83,4)	85,2 (84,7-85,7)	87,3 (86,8-87,7)	84,7 (84,2-85,3)
VOF da 2 a 4 <sup>a</sup>	79,5 (78,7-80,3)	78,1 (77,3-78,8)	76,6 (76,4-76,8)	69,4 (68,2-70,4)	75,6 (74,3-76,6)	78,5 (77,8-79,3)	79,6 (78,8-80,3)	74,0 (73,4-74,6)	76,6 (75,9-77,2)	75,2 (74,6-76,0)	74,1 (73,3-74,8)
Verdure* <sup>o</sup>	52,7 (51,8-53,7)	58,2 (57,3-59,0)	51,4 (51,2-51,7)	27,4 (26,5-28,4)	53,1 (52,0-54,3)	59,3 (58,5-60,2)	55,0 (54,2-55,9)	40,5 (39,9-41,2)	40,3 (39,6-41,0)	38,2 (37,5-39,0)	38,4 (37,6-39,2)
Ortaggi*	46,5 (45,6-47,4)	50,9 (50,0-51,7)	43,7 (43,5-43,9)	22,4 (21,4-23,3)	44,0 (42,8-45,1)	47,0 (46,2-47,9)	49,6 (48,8-50,4)	33,9 (33,3-34,5)	32,2 (31,6-32,9)	34,2 (33,5-34,9)	31,8 (31,0-32,5)
5+VOF <sup>a</sup>	5,3 (4,7-5,8)	5,2 (4,7-5,7)	4,9 (4,8-5,1)	4,7 (4,2-5,4)	4,4 (3,6-5,0)	3,9 (3,4-4,3)	3,8 (3,4-4,2)	3,8 (3,5-4,1)	3,7 (3,4-4,0)	2,7 (2,4-3,0)	2,5 (2,2-2,8)
Quinto	3	2		2	2	2	1	1	1	1	1
Dolci <sup>o</sup>	53,3 (52,4-54,2)	52,1 (51,2-52,9)	49,1 (48,8-49,3)	49,8 (48,8-50,9)	51,6 (50,4-52,7)	42,9 (42,1-43,8)	46,2 (45,3-47,0)	44,1 (43,5-44,7)	42,0 (41,3-42,7)	43,7 (42,9-44,4)	44,9 (44,1-45,7)
Formaggio*	26,6 (25,8-27,5)	22,0 (21,2-22,7)	23,6 (23,4-23,8)	19,5 (18,7-20,5)	43,0 (41,8-44,1)	18,3 (17,6-19,0)	19,9 (19,1-20,6)	10,2 (9,9-10,6)	22,5 (21,9-23,1)	19,0 (18,4-19,7)	23,4 (22,7-24,1)
Carni di maiale <sup>o</sup>	37,2 (36,3-38,1)	51,3 (50,4-52,2)	46,5 (46,3-46,7)	48,2 (47,2-49,3)	30,9 (29,8-32,0)	47,1 (46,2-47,9)	49,3 (48,4-50,1)	55,1 (54,5-55,8)	45,4 (44,7-46,1)	45,2 (44,5-46,0)	53,9 (53,1-54,8)
Carni bianche <sup>o</sup>	81,8 (81,1-82,5)	82,5 (81,8-83,1)	81,7 (81,5-81,9)	82,9 (82,3-83,8)	53,4 (52,2-54,5)	81,8 (81,1-82,4)	83,3 (82,7-83,9)	84,2 (83,8-84,7)	77,3 (76,7-77,9)	79,7 (79,2-80,3)	83,0 (82,4-83,6)
Carni bovine <sup>o</sup>	70,6 (69,7-71,4)	66,2 (65,4-67,0)	69,8 (69,6-70,0)	68,7 (67,7-69,7)	47,4 (46,3-48,6)	74,2 (73,4-74,9)	69,9 (69,2-70,7)	74,6 (74,1-75,1)	71,0 (70,4-71,7)	67,3 (66,6-68,0)	73,5 (72,8-74,2)
Latte*	62,3 (61,4-63,2)	53,5 (52,6-54,4)	59,6 (59,4-59,8)	55,2 (54,2-56,3)	59,1 (58,0-60,2)	67,4 (66,7-68,2)	63,7 (62,9-64,4)	59,4 (58,8-60,0)	53,5 (52,8-54,2)	70,8 (70,1-71,5)	56,8 (56,0-57,6)
Pane, pasta, riso*	79,1 (78,4-79,8)	83,1 (82,5-83,8)	84,2 (84,1-84,4)	87,6 (86,9-88,3)	71,5 (70,6-72,6)	84,1 (83,5-84,7)	84,7 (84,1-85,3)	87,0 (86,6-87,4)	87,2 (86,7-87,7)	84,8 (84,2-85,3)	90,4 (89,9-90,9)
Salumi <sup>o</sup>	63,5 (62,7-64,5)	69,7 (68,9-70,5)	62,0 (61,8-62,2)	65,3 (64,4-66,4)	62,1 (60,9-63,1)	54,9 (54,1-55,8)	56,2 (55,4-57,0)	64,6 (64,0-65,2)	57,8 (57,1-58,5)	61,2 (60,5-61,9)	70,4 (69,6-71,1)
Snack <sup>o</sup>	25,4 (24,6-26,3)	21,9 (21,2-22,7)	25,6 (25,4-25,8)	30,9 (29,9-32,0)	17,9 (16,8-18,7)	21,9 (21,1-22,6)	16,7 (16,1-17,4)	30,9 (30,4-31,5)	24,8 (24,2-25,4)	28,1 (27,4-28,8)	29,5 (28,8-30,3)
Pesce <sup>o</sup>	63,9 (63,0-64,8)	54,2 (53,3-55,1)	59,4 (59,2-59,6)	63,6 (62,6-64,6)	35,8 (34,7-36,9)	65,2 (64,4-66,0)	56,7 (55,9-57,6)	70,6 (70,0-71,2)	60,8 (60,1-61,4)	63,3 (62,6-64,0)	66,1 (65,4-66,9)
Legumi in scatola <sup>o</sup>	39,3 (38,4-40,3)	40,7 (39,9-41,6)	46,2 (46,0-46,4)	68,1 (67,2-69,2)	25,1 (24,1-26,2)	44,4 (43,6-45,3)	46,5 (45,6-47,3)	73,4 (72,9-73,9)	47,8 (47,1-48,5)	56,3 (55,5-57,0)	71,5 (70,8-72,2)
Uova <sup>o</sup>	63,6 (62,7-64,5)	51,1 (50,2-52,0)	56,8 (56,5-57,0)	62,8 (61,7-63,8)	52,3 (51,2-53,5)	61,2 (60,4-62,0)	54,1 (53,3-55,0)	63,7 (63,1-64,3)	59,1 (58,4-59,8)	57,2 (56,5-58,0)	69,1 (68,4-69,8)

<sup>a</sup>Per 100 persone di 3 anni ed oltre che consumano almeno una porzione al giorno di VOF nella regione.

\*Almeno una volta al giorno.

<sup>o</sup>Almeno qualche volta alla settimana.

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana, 2011, 2005". Anno 2012

**Tabella 1** - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per regione - Anno 2010

Regioni	Fumatori %	Ex fumatori %	Non fumatori %	Numero medio sigarette al giorno
Piemonte	22,4 (21,1-23,6)	24,5 (23,2-25,7)	51,1 (49,7-52,5)	11,9 (11,7-12,1)
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	19,8 (18,0-22,0)	25,2 (23,3-27,6)	54,3 (52,2-56,9)	12,0 (11,7-12,3)
Lombardia	22,7 (21,3-24,1)	24,3 (22,9-25,7)	51,2 (49,6-52,8)	11,5 (11,4-11,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>21,8 (20,3-23,5)</i>	<i>21,9 (20,3-23,5)</i>	<i>54,0 (52,3-55,8)</i>	<i>11,5 (10,4-12,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>17,9 (16,7-19,4)</i>	<i>26,1 (24,7-27,7)</i>	<i>53,1 (51,7-54,9)</i>	<i>10,5 (10,3-10,7)</i>
Veneto	20,2 (18,8-21,6)	27,9 (26,3-29,4)	49,7 (48,0-51,4)	11,5 (11,4-11,6)
Friuli Venezia Giulia	21,6 (20,0-23,4)	26,7 (24,9-28,5)	50,0 (48,0-51,9)	11,2 (10,7-11,7)
Liguria	20,8 (19,2-22,3)	25,4 (23,7-27,0)	52,4 (50,6-54,3)	12,1 (11,9-12,3)
Emilia-Romagna	22,3 (20,8-23,7)	25,9 (24,3-27,4)	50,6 (48,8-52,3)	12,3 (12,1-12,5)
Toscana	22,6 (21,2-24,0)	25,4 (24,0-26,8)	50,7 (49,2-52,3)	12,6 (12,4-12,8)
Umbria	23,4 (21,7-25,1)	24,5 (22,8-26,3)	50,5 (48,6-52,5)	13,0 (12,8-13,2)
Marche	23,0 (21,4-24,5)	22,2 (20,7-23,8)	52,5 (50,7-54,2)	11,6 (11,4-11,8)
Lazio	26,7 (25,3-28,0)	23,7 (22,4-25,1)	47,1 (45,6-48,6)	13,5 (13,3-13,7)
Abruzzo	21,8 (20,1-23,5)	23,1 (21,4-24,8)	52,8 (50,9-54,8)	13,5 (13,3-13,7)
Molise	21,0 (19,1-22,7)	21,3 (19,5-23,1)	55,9 (53,6-57,8)	13,7 (13,4-14,0)
Campania	26,1 (24,5-27,7)	19,4 (18,0-20,9)	53,8 (52,0-55,6)	14,5 (14,2-14,8)
Puglia	22,2 (20,9-23,5)	20,0 (18,7-21,2)	56,9 (55,3-58,4)	12,9 (12,7-13,1)
Basilicata	21,3 (19,4-23,1)	20,7 (18,8-22,5)	55,2 (53,0-57,3)	13,4 (13,1-13,7)
Calabria	20,5 (18,9-22,2)	19,9 (18,3-21,4)	58,2 (56,3-60,1)	13,2 (12,9-13,5)
Sicilia	22,7 (21,3-24,1)	19,4 (18,1-20,8)	55,8 (54,2-57,4)	14,6 (14,4-14,8)
Sardegna	21,3 (19,7-23,0)	25,8 (24,1-27,6)	49,6 (47,7-51,5)	12,8 (12,6-13,0)
<b>Italia</b>	<b>22,8 (22,4-23,3)</b>	<b>23,4 (23,0-23,9)</b>	<b>52,0 (51,5-52,5)</b>	<b>12,7 (12,6-12,8)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 3 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per classe di età e genere - Anno 2010**

Classe di età	Maschi				Femmine			
	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori	N medio sigarette al giorno	Fumatori	Ex -fumatori	Non fumatori	N medio sigarette al giorno
14-17	9,4 (7,6-11,3)	3,6 (2,3-4,9)	85,6 (83,7-87,5)	6,1 (5,7-6,5)	6,4 (4,7-8,0)	4,0 (2,6-5,4)	87,2 (85,3-89,1)	5,3 (4,8-5,8)
18-19	32,4 (31,5-33,1)	7,6 (7,1-8,2)	59,0 (58,2-59,9)	8,2 (8,1-8,3)	19,9 (19,2-20,8)	6,3 (5,8-6,9)	72,4 (71,6-73,2)	8,8 (8,7-8,9)
20-24	35,2 (31,3-39,0)	7,5 (5,3-9,7)	54,5 (50,6-58,5)	10,9 (10,7-11,1)	18,6 (15,4-21,8)	7,7 (5,4-9,9)	70,5 (66,9-74,2)	7,9 (7,7-8,1)
25-34	39,7 (39,3-40,2)	16,3 (15,9-16,7)	41,4 (40,9-41,8)	12,7 (12,5-12,9)	24,4 (24,0-24,9)	15,9 (15,6-16,3)	58,0 (57,6-58,5)	9,7 (9,4-10)
35-44	36,7 (36,4-37,1)	22,9 (22,6-23,2)	38,7 (38,3-39,0)	14,4 (14,4-14,4)	19,0 (18,7-19,3)	18,5 (18,2-18,8)	60,8 (60,5-61,2)	10,9 (10,9-10,9)
45-54	34,0 (32,4-35,6)	31,0 (29,4-32,5)	33,7 (32,1-35,3)	16,1 (16,0-16,2)	24,4 (23,0-25,9)	22,1 (20,7-23,5)	52,1 (50,4-53,7)	12,2 (12,2-12,2)
55-59	29,5 (28,2-30,9)	40,1 (38,7-41,5)	29,4 (28,0-30,7)	16,7 (16,4-17,0)	20,2 (19,0-21,3)	21,7 (20,5-22,9)	57,1 (55,7-58,5)	12,1 (11,7-12,5)
60-64	25,4 (24,0-26,8)	45,6 (44,0-47,1)	27,3 (25,8-28,7)	15,9 (15,7-16,1)	16,3 (15,1-17,6)	20,8 (19,5-22,1)	61,1 (59,7-62,6)	13,3 (13,1-13,5)
65-74	17,5 (15,9-19,1)	53,6 (51,6-55,6)	27,4 (25,5-29,2)	14,2 (13,9-14,5)	10,5 (9,3-11,7)	16,9 (15,5-18,4)	71,1 (69,4-72,7)	10,6 (10,3-10,9)
75 ed oltre	9,9 (8,6-11,2)	59,9 (58-61,8)	27,7 (25,9-29,5)	11,1 (10,7-11,5)	3,8 (3,1-4,5)	12,4 (11,3-13,5)	82,0 (80,9-83,1)	9,7 (9,2-10,2)
<b>Totale</b>	<b>29,2 (28,5-29,9)</b>	<b>30,7 (30,0-31,4)</b>	<b>38,3 (37,5-39,0)</b>	<b>13,9 (13,8-14)</b>	<b>16,9 (16,4-17,5)</b>	<b>16,7 (16,1-17,2)</b>	<b>64,7 (64,1-65,4)</b>	<b>10,9 (10,8-11)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 3 - (Segue) Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per classe di età e genere - Anno 2010**

Classe di età	Totale			
	Fumatori	Ex -fumatori	Non fumatori	N medio sigarette al giorno
14-17	8,0 (6,8-9,1)	3,8 (2,9-4,7)	86,4 (85,1-87,6)	5,8 (5,5-6,1)
18-19	26,6 (26,0-27,1)	7,0 (6,7-7,4)	65,3 (64,7-65,8)	8,4 (8,3-8,5)
20-24	26,9 (24,4-29,4)	7,6 (6,0-9,1)	62,5 (59,8-65,2)	9,8 (9,7-9,9)
25-34	32,3 (32,0-32,6)	16,1 (15,9-16,3)	49,5 (49,2-49,8)	11,6 (11,4-11,8)
35-44	27,7 (27,5-27,9)	20,7 (20,5-20,9)	49,9 (49,7-50,1)	13,2 (13,1-13,3)
45-54	29,1 (28,1-30,2)	26,4 (25,4-27,5)	43,1 (42,0-44,2)	14,4 (14,3-14,5)
55-59	24,7 (23,9-25,6)	30,7 (29,8-31,6)	43,5 (42,6-44,5)	14,8 (14,6-15,0)
60-64	20,8 (20,0-21,7)	33,0 (32,1-34,0)	44,4 (43,3-45,4)	14,8 (14,7-14,9)
65-74	13,7 (12,7-14,6)	33,5 (32,3-34,8)	51,3 (50,0-52,6)	12,6 (12,4-12,8)
75 ed oltre	6,2 (5,5-6,8)	31,2 (30,1-32,2)	60,6 (59,5-61,7)	10,6 (10,3-10,9)
<b>Totale</b>	<b>22,8 (22,4-23,3)</b>	<b>23,4 (23,0-23,9)</b>	<b>52,0 (51,5-52,5)</b>	<b>12,7 (12,6-12,8)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 1** - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per regione - Anno 2011

Regioni	Fumatori %	Ex fumatori %	Non fumatori %
Piemonte	23,0 (22,3-23,7)	26,2 (25,5-26,9)	49,1 (48,3-49,8)
Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste	16,3 (15,3-17,4)	25,8 (24,3-26,3)	55,4 (54,1-55,8)
Lombardia	23,0 (22,3-23,6)	23,6 (23,0-24,3)	51,8 (51,1-52,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>19,2 (18,2-20,4)</i>	<i>23,2 (22,2-24,4)</i>	<i>54,5 (53,3-55,8)</i>
<i>Trento</i>	<i>17,8 (16,7-19,0)</i>	<i>23,8 (22,7-25,1)</i>	<i>55,0 (53,6-56,2)</i>
Veneto	18,6 (17,9-19,4)	26,0 (25,2-26,8)	54,4 (53,5-55,3)
Friuli Venezia Giulia	21,4 (20,4-22,3)	26,3 (25,3-27,3)	50,4 (49,3-51,4)
Liguria	20,9 (20,1-21,8)	26,6 (25,7-27,5)	51,8 (50,8-52,8)
Emilia-Romagna	21,2 (20,4-22,0)	27,3 (26,4-28,2)	49,8 (48,9-50,8)
Toscana	23,0 (22,2-23,8)	24,4 (23,6-25,2)	50,4 (49,6-51,3)
Umbria	21,6 (20,6-22,6)	24,8 (23,7-25,8)	52,0 (50,9-53,2)
Marche	21,4 (20,5-22,2)	24,0 (23,2-24,9)	52,8 (51,9-53,8)
Lazio	27,2 (26,4-28,1)	22,6 (21,8-23,4)	48,8 (47,9-49,7)
Abruzzo	24,0 (23,1-24,8)	25,1 (24,2-25,9)	49,4 (48,5-50,4)
Molise	21,7 (20,7-22,8)	23,1 (22,1-24,2)	54,7 (53,6-56,0)
Campania	23,1 (22,5-23,7)	19,7 (19,1-20,2)	56,5 (55,8-57,1)
Puglia	21,0 (20,3-21,7)	19,2 (18,6-19,9)	58,7 (57,9-59,5)
Basilicata	23,3 (22,4-24,4)	20,9 (19,9-21,9)	53,0 (51,8-54,1)
Calabria	18,8 (18,1-19,5)	19,4 (18,7-20,1)	60,5 (59,7-60,3)
Sicilia	22,7 (22,1-23,4)	19,9 (19,3-20,5)	53,9 (53,1-54,6)
Sardegna	19,4 (18,6-20,2)	26,6 (25,7-27,5)	52,3 (51,3-53,3)
<b>Italia</b>	<b>22,3 (22,1-22,5)</b>	<b>23,4 (23,1-23,6)</b>	<b>52,7 (52,5-52,9)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 14 anni ed oltre (per 100) per abitudine al fumo e numero medio di sigarette fumate al giorno per classe di età e genere - Anno 2011**

Classe di età	Maschi			Femmine			Totale		
	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori
14-17	12,0 (10,9-13,1)	4,2 (3,5-5,0)	81,2 (80,0-82,4)	5,7 (4,8-6,5)	2,8 (2,2-3,5)	90,2 (89,2-91,0)	8,8 (8,2-9,5)	3,5 (3,1-4,0)	85,7 (84,9-86,4)
18-19	29,0 (28,5-29,4)	5,9 (5,6-6,1)	61,6 (61,1-62,0)	19,5 (19,2-20,0)	6,6 (6,2-6,8)	72,5 (72,1-73,0)	24,4 (24,2-24,7)	6,2 (6,1-6,5)	66,9 (66,6-67,2)
20-24	31,7 (29,7-33,6)	9,4 (8,0-10,7)	56,5 (54,5-58,6)	19,5 (17,7-21,3)	8,4 (7,0-9,8)	69,8 (67,8-71,7)	25,8 (24,5-27,0)	8,9 (8,0-9,8)	62,9 (61,6-64,2)
25-34	38,9 (38,5-39,2)	16,8 (16,5-17,1)	42,1 (41,7-42,4)	22,4 (22,1-22,7)	17,5 (17,2-17,8)	58,4 (58,0-58,7)	30,6 (30,4-30,8)	17,2 (17,0-17,3)	50,2 (50,0-50,5)
35-44	35,2 (34,9-35,5)	23,4 (23,1-23,6)	40,1 (39,8-40,4)	19,6 (19,4-19,9)	17,2 (17,0-17,5)	62,0 (61,6-62,2)	27,5 (27,3-27,7)	20,3 (20,1-20,5)	51,0 (50,8-51,2)
45-54	32,1 (31,3-33,0)	30,4 (29,6-31,2)	35,6 (34,7-36,4)	23,3 (22,5-24,0)	21,0 (20,3-21,7)	54,3 (53,5-55,1)	27,6 (27,1-28,1)	25,6 (25,1-26,1)	45,1 (44,6-45,7)
55-59	29,8 (29,0-30,5)	42,2 (41,4-43,0)	26,8 (26,1-27,5)	20,4 (19,7-21,0)	22,5 (21,9-23,2)	55,1 (54,3-55,9)	25,1 (24,6-25,6)	32,4 (31,9-32,9)	40,9 (40,4-41,4)
60-64	25,9 (25,1-26,7)	44,9 (44,0-45,7)	27,7 (26,9-28,5)	17,4 (16,7-18,0)	19,7 (19,0-20,4)	60,8 (59,9-61,5)	21,5 (21,0-21,9)	31,8 (31,3-32,3)	44,9 (44,4-45,5)
65-74	18,5 (17,5-19,4)	49,5 (48,4-50,7)	30,8 (29,8-31,9)	9,9 (9,2-10,6)	17,3 (16,5-18,1)	70,9 (70,0-71,8)	13,9 (13,3-14,4)	32,2 (31,6-32,9)	52,3 (51,7-53,0)
75 ed oltre	8,9 (8,2-9,6)	58,5 (57,4-59,6)	31,9 (30,8-32,9)	3,6 (3,2-4,0)	14,1 (13,4-14,7)	81,0 (80,3-81,6)	5,6 (5,6-6,0)	31,2 (30,6-31,8)	62,0 (61,4-62,6)
<b>Totale</b>	<b>28,4 (28,1-28,8)</b>	<b>30,5 (30,2-30,9)</b>	<b>39,4 (39,0-39,7)</b>	<b>16,6 (16,3-16,9)</b>	<b>16,7 (16,4-17,0)</b>	<b>65,1 (64,7-65,4)</b>	<b>22,3 (22,1-22,5)</b>	<b>23,4 (23,1-23,6)</b>	<b>52,7 (52,5-52,9)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100) in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2010**

<b>Regioni</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>	<b>Persone obese</b>
Piemonte	33,7 (32,3-35,1)	8,6 (7,7-9,6)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	35,2 (32,5-37,3)	9,4 (7,8-11,0)
Lombardia	31,4 (29,8-32,9)	10,1 (9,1-11,1)
<i>Bolzano-Bozen</i>	33,5 (31,7-35,2)	8,2 (7,1-9,5)
<i>Trento</i>	30,9 (29,4-32,7)	7,8 (6,7-8,9)
Veneto	35,4 (33,8-37,1)	9,7 (8,6-10,8)
Friuli Venezia Giulia	38,0 (36,0-40,0)	10,1 (8,7-11,3)
Liguria	32,7 (31,0-34,5)	7,8 (6,6-8,8)
Emilia-Romagna	35,7 (34,0-37,4)	10,6 (9,5-11,8)
Toscana	34,5 (32,9-36,0)	8,9 (7,8-9,9)
Umbria	38,1 (36,1-40,1)	11,1 (9,6-12,4)
Marche	36,5 (34,7-38,2)	10,0 (8,8-11,2)
Lazio	34,9 (33,4-36,4)	10,6 (9,5-11,6)
Abruzzo	36,7 (34,7-38,6)	11,7 (10,3-13,1)
Molise	41,8 (39,8-44,1)	11,1 (9,7-12,8)
Campania	40,8 (38,9-42,6)	11,6 (10,4-12,9)
Puglia	38,1 (36,5-39,7)	12,3 (11,2-13,5)
Basilicata	41,0 (38,7-43,2)	12,7 (11,1-14,3)
Calabria	38,6 (36,7-40,6)	11,7 (10,3-13,0)
Sicilia	37,8 (36,2-39,5)	10,7 (9,6-11,8)
Sardegna	35,7 (33,8-37,6)	10,2 (8,9-11,5)
<b>Italia</b>	<b>35,6 (35,1-36,1)</b>	<b>10,3 (10,5-10,7)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.



**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100) in sovrappeso ed obese per classe di età e genere - Anno 2010**

Classi di età	Persone in sovrappeso			Persone obese		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
18-24	21,6 (19,9-23,4)	9,6 (8,2-11,0)	15,7 (14,7-16,8)	3,8 (2,9-4,8)	2,2 (1,4-3,0)	3,0 (2,5-3,6)
25-34	33,5 (33,2-33,8)	15,1 (14,9-15,4)	24,6 (24,4-24,8)	5,9 (5,7-6,0)	3,8 (3,7-4,0)	4,9 (4,8-5,0)
35-44	45,1 (43,0-47,2)	20,2 (18,5-21,9)	32,5 (31,1-33,8)	9,8 (8,4-11,1)	6,2 (5,1-7,3)	7,9 (7,1-8,8)
45-54	49,9 (49,5-50,3)	28,3 (27,9-28,7)	38,9 (38,6-39,1)	13,5 (13,2-13,9)	9,6 (9,3-9,9)	11,5 (11,3-11,7)
55-64	51,7 (51,3-52,2)	37,8 (37,4-38,2)	44,7 (44,4-44,9)	15,3 (15,0-15,7)	12,8 (12,5-13,1)	14,0 (13,8-14,3)
65-74	52,4 (50,3-54,4)	39,1 (37,3-40,9)	45,1 (43,8-46,4)	15,6 (14,0-17,2)	16,7 (15,2-18,2)	16,2 (15,2-17,2)
75 ed oltre	50,0 (48,7-51,3)	38,8 (37,8-39,8)	43,2 (42,5-44,0)	13,0 (12,1-13,9)	14,4 (13,6-15,1)	13,8 (13,3-14,4)
<b>Totale</b>	<b>44,3 (43,6-45,1)</b>	<b>27,6 (27,0-28,3)</b>	<b>35,6 (35,1-36,1)</b>	<b>11,1 (10,6-11,6)</b>	<b>9,6 (9,1-10,0)</b>	<b>10,3 (10,0-10,7)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010.

**Tabella 1 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100) in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2011**

<b>Regioni</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>	<b>Persone obese</b>
Piemonte	32,5 (31,8-33,3)	9,1 (8,6-9,6)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	34,6 (33,3-35,9)	8,7 (7,8-9,5)
Lombardia	34,4 (32,2-36,6)	8,3 (6,9-9,7)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>32,9 (32,7-33,1)</i>	8,9 (8,8-9,1)
<i>Trento</i>	<i>33,4 (31,9-34,7)</i>	<i>6,4 (5,7-7,4)</i>
Veneto	31,4 (28,1-34,7)	8,4 (6,2-10,5)
Friuli Venezia Giulia	34,7 (34,2-35,0)	9,9 (9,6-10,2)
Liguria	37,9 (36,7-39,1)	11,8 (11,0-12,7)
Emilia-Romagna	36,2 (35,2-37,1)	12,0 (11,4-12,7)
Toscana	35,2 (34,3-36,1)	8,7 (8,1-9,3)
Umbria	38,2 (36,9-39,3)	11,2 (10,5-12,1)
Marche	38,1 (37,1-39,0)	9,6 (8,9-10,2)
Lazio	34,0 (33,1-34,9)	9,2 (8,6-9,8)
Abruzzo	39,2 (38,3-40,2)	8,7 (8,1-9,3)
Molise	37,1 (35,9-38,3)	13,5 (12,6-14,4)
Campania	40,1 (39,4-40,8)	10,9 (10,4-11,3)
Puglia	40,4 (39,6-41,3)	12,6 (12,0-13,2)
Basilicata	36,1 (34,9-37,2)	13,1 (12,3-14,0)
Calabria	37,1 (36,3-38,0)	11,4 (10,8-12,0)
Sicilia	37,8 (37,0-38,6)	9,8 (9,3-10,3)
Sardegna	32,9 (31,9-33,9)	10,2 (9,5-10,9)
<b>Italia</b>	<b>35,8 (35,5-36,0)</b>	<b>10,0 (9,8-10,2)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 2 - Prevalenza di persone di 18 anni ed oltre (per 100) in sovrappeso ed obese per classe di età e genere - Anno 2011**

<b>Classi di età</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>			<b>Persone obese</b>		
	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
18-24	22,1 (21,2-23,1)	8,8 (8,1-9,5)	15,7 (15,1-16,3)	3,2 (2,8-3,7)	1,7 (1,3-2,0)	2,5 (2,2-2,8)
25-34	35,7 (35,7-36,1)	14,3 (14,1-14,4)	25,1 (25,0-25,2)	5,6 (5,5-5,6)	3,2 (3,2-3,3)	4,4 (4,3-4,4)
35-44	45,0 (44,6-45,5)	19,8 (19,4-20,2)	32,5 (32,2-32,8)	8,8 (8,5-9,1)	5,6 (5,3-5,8)	7,2 (7,0-7,4)
45-54	50,1 (49,0-51,2)	26,5 (25,5-27,5)	38,1 (37,3-38,8)	13,7 (12,9-14,6)	9,8 (9,0-10,5)	11,7 (11,2-12,2)
55-64	55,0 (54,7-55,4)	35,8 (35,5-36,2)	45,2 (45,0-45,5)	15,5 (15,2-15,8)	13,9 (13,6-14,2)	14,7 (14,5-14,9)
65-74	54,1 (53,7-54,5)	40,3 (40,0-40,7)	46,7 (46,5-47,0)	14,9 (14,6-15,2)	15,9 (15,6-16,2)	15,5 (15,3-15,7)
75 ed oltre	50,1 (49,7-50,7)	37,4 (35,5-36,2)	42,3 (42,0-42,6)	11,4 (11,0-11,8)	13,9 (13,6-14,2)	13,0 (12,7-13,2)
<b>Totale</b>	<b>45,5 (45,1-45,9)</b>	<b>26,8 (26,4-27,1)</b>	<b>35,8 (35,5-36,0)</b>	<b>10,7 (10,4-11,0)</b>	<b>9,4 (9,1-9,6)</b>	<b>10,0 (9,8-10,2)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 1** - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 14 anni ed oltre per abitudine al fumo per regione - Anno 2012

<b>Regioni</b>	<b>Fumatori</b>	<b>Ex fumatori</b>	<b>Non fumatori</b>
Piemonte	21,4 (20,6-22,1)	23,7 (52,8-54,5)	53,7 (52,8-54,5)
Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste	15,5 (14,1-16,5)	25,2 (55,2-58,2)	56,9 (55,2-58,2)
Lombardia	22,5 (21,8-23,1)	22,8 (53,1-54,6)	53,9 (53,1-54,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>20,9 (19,9-22,0)</i>	25,3 (51,0-53,4)	52,2 (51,0-53,4)
<i>Trento</i>	<i>18,2 (17,2-19,1)</i>	25,0 (52,0-54,4)	53,1 (52,0-54,4)
Veneto	19,8 (19,1-20,6)	25,5 (52,7-54,4)	53,6 (52,7-54,4)
Friuli Venezia Giulia	20,7 (19,7-21,6)	26,5 (49,5-51,7)	50,7 (49,5-51,7)
Liguria	21,4 (20,4-22,3)	25,0 (51,2-53,4)	52,4 (51,2-53,4)
Emilia-Romagna	20,8 (19,9-21,6)	24,4 (51,9-53,8)	52,9 (51,9-53,8)
Toscana	23,5 (22,7-24,1)	25,3 (49,0-50,6)	49,9 (49,0-50,6)
Umbria	20,2 (19,0-21,3)	26,9 (50,6-53,1)	51,9 (50,6-53,1)
Marche	20,6 (19,6-21,5)	24,1 (52,1-54,2)	53,2 (52,1-54,2)
Lazio	22,8 (22,0-23,5)	21,7 (52,4-54,0)	53,2 (52,4-54,0)
Abruzzo	23,3 (22,4-24,2)	20,4 (53,1-55,1)	54,1 (53,1-55,1)
Molise	21,0 (20,0-21,9)	19,0 (57,9-60,1)	59,1 (57,9-60,1)
Campania	24,6 (23,9-25,2)	18,1 (55,9-57,3)	56,7 (55,9-57,3)
Puglia	19,2 (18,4-19,8)	19,4 (60,0-61,6)	60,9 (60,0-61,6)
Basilicata	21,3 (20,2-22,3)	20,1 (54,2-56,6)	55,4 (54,2-56,6)
Calabria	19,1 (18,3-19,9)	19,2 (59,1-61,0)	60,1 (59,1-61,0)
Sicilia	24,5 (23,8-25,2)	21,2 (52,1-53,8)	53,0 (52,1-53,8)
Sardegna	19,0 (18,1-19,8)	25,6 (53,0-55,1)	54,1 (53,0-55,1)
<b>Italia</b>	<b>21,9 (21,7-22,2)</b>	<b>22,6 (22,4-22,9)</b>	<b>54,2 (54,0-54,5)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 14 anni ed oltre per abitudine al fumo per classe di età e genere - Anno 2012**

Classe di età	Maschi			Femmine			Totale		
	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori	Fumatori	Ex - fumatori	Non fumatori
14-17	9,3 (8,0-10,3)	2,9 (2,1-3,6)	85,9 (85,8-87,0)	4,3 (3,4-5,1)	4,2 (3,2-4,9)	89,4 (88,3-90,4)	6,7 (6,0-7,4)	3,5 (2,9-4,0)	87,7 (86,9-88,4)
18-19	27,5 (26,8-27,8)	4,3 (4,1-4,6)	66,9 (66,9-67,4)	14,0 (13,6-14,5)	6,4 (6,0-6,7)	78,3 (77,9-78,8)	21,0 (20,7-21,3)	5,3 (5,0-5,4)	72,4 (72,0-72,7)
20-24	32,6 (30,6-34,6)	9,1 (7,8-10,4)	56,4 (56,4-58,4)	22,4 (20,5-24,2)	8,6 (7,2-9,9)	68,3 (66,3-70,3)	27,8 (26,4-29,0)	8,9 (7,9-9,7)	62,1 (60,7-63,4)
25-34	35,9 (35,4-36,2)	15,7 (15,3-15,9)	46,9 (46,9-47,2)	21,3 (20,9-21,6)	15,2 (14,9-15,5)	62,5 (62,1-62,8)	28,6 (28,3-28,8)	15,5 (15,2-15,6)	54,7 (54,4-54,9)
35-44	35,1 (34,7-35,3)	23,3 (23,0-23,5)	40,1 (40,1-40,3)	19,5 (19,2-19,7)	16,8 (16,5-17,0)	62,4 (62,1-62,6)	27,3 (27,1-27,4)	20,1 (19,9-20,2)	51,2 (51,0-51,4)
45-54	33,9 (33,6-34,2)	28,2 (27,9-28,5)	36,7 (36,6-36,9)	23,4 (23,1-23,7)	20,0 (19,7-20,2)	55,5 (55,1-55,7)	28,7 (28,4-28,8)	24,1 (23,9-24,2)	46,1 (45,8-46,3)
55-59	29,5 (28,1-30,8)	38,0 (36,5-39,4)	31,8 (31,8-33,2)	21,4 (20,2-22,6)	20,4 (19,2-21,6)	56,8 (55,4-58,1)	25,3 (24,4-26,1)	28,9 (27,9-29,7)	44,8 (43,8-45,7)
60-64	23,9 (23,1-24,5)	45,7 (44,8-46,5)	29,5 (29,4-30,2)	15,4 (14,7-16,0)	21,1 (20,4-21,7)	62,3 (61,5-63,1)	19,4 (18,9-19,8)	32,9 (32,3-33,3)	46,6 (46,0-47,0)
65-74	18,5 (17,8-19,0)	48,3 (47,6-49,0)	32,2 (32,2-32,8)	10,6 (10,1-11,0)	17,6 (17,1-18,1)	70,4 (69,8-70,9)	14,3 (13,9-14,6)	32,2 (31,7-32,6)	52,3 (51,8-52,7)
75 ed oltre	8,2 (7,4-9,0)	58,0 (56,6-59,3)	32,5 (32,4-33,7)	3,5 (3,0-3,8)	13,4 (12,6-14,1)	81,5 (80,7-82,2)	5,3 (4,8-5,6)	30,2 (29,4-30,9)	63,0 (62,3-63,7)
<b>Totale</b>	<b>27,9 (27,5-28,2)</b>	<b>29,6 (29,2-29,9)</b>	<b>41,2 (40,9-41,6)</b>	<b>16,3 (16,0-16,6)</b>	<b>16,1 (15,8-16,4)</b>	<b>66,3 (65,9-66,6)</b>	<b>21,9 (21,7-22,2)</b>	<b>22,6 (22,4-22,8)</b>	<b>54,2 (54,0-54,5)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 1 - Distribuzione dei non consumatori e dei consumatori (per 100) per regione - Anni 2010-2012**

Regioni	2010			2011				
	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Totale non consumatori	Consumatori
Piemonte	3,6 (2,9-4,2)	25,9 (24,6-27,1)	29,4 (28,1-30,7)	68,8 (67,5-70,0)	4,4 (3,7-5,0)	26,8 (25,5-27,9)	31,2 (29,9-32,4)	67,1 (65,8-68,3)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	4,5 (3,4-5,7)	23,1 (21,1-25,2)	27,7 (25,5-29,8)	72,0 (69,9-74,0)	4,7 (3,5-5,8)	22,1 (19,9-24,1)	26,7 (24,5-28,9)	71,1 (68,9-73,1)
Lombardia	4,3 (3,6-5,0)	24,7 (23,4-26,1)	29,0 (27,6-30,4)	69,2 (67,8-70,7)	5,2 (4,5-5,8)	25,0 (23,9-26,0)	30,2 (29,0-31,2)	68,6 (67,5-69,7)
Bolzano-Bozen	6,7 (5,7-7,8)	17,8 (16,4-19,2)	24,5 (23,0-26,1)	73,1 (71,6-74,6)	7,5 (6,4-8,6)	17,1 (15,5-18,5)	24,6 (22,9-26,2)	72,0 (70,4-73,5)
Trento	6,0 (5,1-7,0)	26,9 (25,4-28,4)	32,9 (31,3-34,5)	66,0 (64,5-67,4)	9,3 (7,9-10,5)	26,7 (24,8-28,4)	35,9 (34,0-37,8)	63,7 (61,8-65,5)
Veneto	5,4 (4,6-6,2)	23,7 (22,3-25,1)	29,1 (27,6-30,6)	68,9 (67,4-70,4)	6,1 (5,2-6,8)	24,4 (23,0-25,6)	30,5 (29,1-31,7)	69,0 (67,6-70,2)
Friuli Venezia Giulia	3,9 (3,0-4,8)	25,4 (23,7-27,1)	29,3 (27,5-31,1)	69,4 (67,7-71,2)	6,3 (5,2-7,3)	24,3 (22,5-25,9)	30,5 (28,7-32,2)	67,6 (65,8-69,3)
Liguria	4,0 (3,2-4,8)	27,7 (26,0-29,3)	31,7 (30,0-33,4)	67,0 (65,4-68,7)	5,3 (4,3-6,1)	28,6 (27,0-30,1)	33,8 (32,2-35,4)	65,7 (64,1-67,2)
Emilia-Romagna	5,5 (4,6-6,3)	26,2 (24,7-27,8)	31,7 (30,1-33,3)	67,0 (65,4-68,6)	5,3 (4,5-6,0)	24,6 (23,2-25,8)	29,8 (28,5-31,1)	68,7 (67,4-69,9)
Toscana	4,8 (4,0-5,6)	25,0 (23,6-26,4)	29,8 (28,4-31,3)	69,0 (67,6-70,4)	6,6 (5,7-7,4)	26,8 (25,4-28,1)	33,4 (31,9-34,8)	64,6 (63,1-65,9)
Umbria	4,2 (3,3-5,1)	29,6 (27,8-31,5)	33,9 (32,0-35,7)	64,8 (63,0-66,6)	4,8 (3,8-5,7)	29,1 (27,2-30,9)	33,9 (31,9-35,7)	64,9 (63,0-66,7)
Marche	4,8 (3,9-5,7)	28,1 (26,5-29,7)	32,9 (31,3-34,6)	64,8 (63,2-66,5)	6,9 (5,9-7,8)	26,9 (25,3-28,4)	33,8 (32,1-35,4)	64,5 (62,9-66,0)
Lazio	4,8 (4,0-5,5)	26,8 (25,4-28,1)	31,5 (30,1-33,0)	65,9 (64,6-67,3)	5,8 (5,0-6,5)	26,0 (24,7-27,2)	31,8 (30,4-33,1)	66,9 (65,5-68,1)
Abruzzo	5,5 (4,5-6,5)	26,2 (24,4-27,9)	31,7 (29,8-33,5)	66,5 (64,7-68,3)	5,8 (4,7-6,7)	29,5 (27,8-31,2)	35,3 (33,4-37,1)	63,5 (61,6-65,2)
Molise	4,1 (3,1-5,0)	30,8 (28,8-32,8)	34,9 (32,8-36,9)	64,1 (62,1-66,0)	5,2 (4,2-6,2)	32,9 (31,0-34,6)	38,1 (36,2-39,9)	61,1 (59,2-62,9)
Campania	4,9 (4,1-5,7)	36,0 (34,3-37,7)	40,9 (39,1-42,6)	58,3 (56,6-60,1)	5,2 (4,4-5,9)	33,5 (32,0-34,8)	38,6 (37,1-40,1)	60,4 (58,9-61,8)
Puglia	2,8 (2,2-3,3)	32,2 (30,8-33,7)	35,0 (33,5-36,4)	64,1 (62,6-65,5)	5,0 (4,2-5,7)	32,8 (31,3-34,1)	37,8 (36,3-39,1)	61,7 (60,2-63,0)
Basilicata	3,0 (2,2-3,9)	32,6 (30,6-34,7)	35,7 (33,6-37,8)	61,9 (59,8-63,9)	3,1 (2,3-3,9)	34,0 (32,0-35,8)	37,1 (35,1-39,0)	60,1 (58,2-62,0)
Calabria	3,8 (3,0-4,6)	31,4 (29,6-33,2)	35,2 (33,4-37,0)	63,2 (61,4-65,0)	4,5 (3,7-5,3)	30,7 (29,0-32,3)	35,2 (33,5-36,8)	63,6 (61,9-65,2)
Sicilia	4,3 (3,6-5,0)	34,5 (33,0-36,1)	38,9 (37,3-40,4)	59,1 (57,5-60,6)	6,3 (5,5-7,0)	34,5 (33,1-35,8)	40,8 (39,4-42,1)	56,3 (54,9-57,6)
Sardegna	5,9 (4,9-6,9)	28,5 (26,7-30,2)	34,4 (32,6-36,2)	62,8 (61,0-64,6)	7,5 (6,4-8,5)	28,9 (27,3-30,5)	36,4 (34,7-38,1)	62,5 (60,8-64,1)
<b>Italia</b>	<b>4,5 (4,3-4,7)</b>	<b>28,1 (27,7-28,6)</b>	<b>32,7 (32,2-33,1)</b>	<b>65,7 (65,2-66,1)</b>	<b>5,6 (5,3-5,7)</b>	<b>28,0 (27,6-28,4)</b>	<b>33,6 (33,2-33,9)</b>	<b>65,0 (64,6-65,3)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2009, 2012.

**Tabella 2** - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 11-18 anni per genere e regione - Anno 2011

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	16,3 (8,9-23,7)	8,1 (2,4-13,7)	12,1 (7,7-16,5)
Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste	25,9 (13,6-38,2)	12,9 (2,5-23,3)	19,8 (11,9-27,5)
Lombardia	14,2 (8,1-20,3)	14,3 (8,2-20,4)	14,3 (10,2-18,3)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>24,0 (14,0-33,9)</i>	<i>20,7 (11,0-30,3)</i>	<i>22,4 (15,9-28,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>10,9 (2,9-18,8)</i>	<i>7,7 (0,2-15,0)</i>	<i>9,4 (4,3-14,4)</i>
Veneto	20,9 (13,1-28,6)	12,3 (5,2-19,4)	16,9 (11,9-21,9)
Friuli Venezia Giulia	20,0 (7,7-32,1)	13,5 (4,2-22,7)	16,3 (9,2-23,4)
Liguria	12,3 (4,4-20,1)	8,2 (0,7-15,6)	10,4 (5,2-15,5)
Emilia-Romagna	17,3 (9,0-25,6)	7,7 (1,0-14,2)	12,7 (7,6-17,7)
Toscana	13,5 (5,9-20,9)	7,4 (0,4-14,3)	10,8 (5,8-15,7)
Umbria	15,2 (4,2-26,1)	*	9,8 (3,3-16,2)
Marche	15,8 (6,9-24,7)	*	10,2 (5,2-15,0)
Lazio	18,8 (11,0-26,5)	*	12,4 (7,7-17,0)
Abruzzo	7,1 (0,5-13,5)	*	6,5 (2,2-10,7)
Molise	17,1 (7,1-27,0)	6,2 (0,0-12,4)	11,1 (5,7-16,4)
Campania	11,1 (6,1-16,0)	3,7 (0,5-6,8)	7,5 (4,5-10,3)
Puglia	10,4 (5,0-15,7)	5,0 (0,6-9,3)	7,9 (4,5-11,2)
Basilicata	18,1 (8,5-27,5)	9,0 (1,1-16,9)	13,8 (7,8-19,7)
Calabria	12,0 (5,3-18,5)	10,5 (4,1-16,8)	11,2 (6,8-15,6)
Sicilia	6,7 (2,6-10,8)	6,5 (1,8-11,2)	6,7 (3,7-9,5)
Sardegna	20,0 (10,0-29,9)	*	13,9 (7,8-19,9)
<b>Italia</b>	<b>14,1 (12,2-16,0)</b>	<b>8,4 (6,7-10,0)</b>	<b>11,4 (10,1-12,5)</b>

\*dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 3** - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 19-64 anni per genere e regione - Anno 2011

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	23,0 (20,7-25,1)	8,0 (6,5-9,5)	15,5 (14,2-16,8)
Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste	31,7 (27,4-35,8)	8,2 (5,4-10,9)	20,0 (17,5-22,5)
Lombardia	21,8 (19,8-23,7)	6,4 (5,0-7,6)	14,2 (13,0-15,3)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>35,5 (32,1-38,8)</i>	<i>11,1 (8,5-13,5)</i>	<i>23,4 (21,4-25,4)</i>
<i>Trento</i>	<i>29,1 (25,5-32,6)</i>	<i>6,0 (3,8-8,1)</i>	<i>17,6 (15,6-19,6)</i>
Veneto	24,5 (22,0-26,8)	5,6 (4,1-6,9)	15,1 (13,7-16,4)
Friuli Venezia Giulia	29,3 (25,9-32,5)	7,0 (4,9-9)	18,2 (16,2-20,1)
Liguria	17,1 (14,4-19,7)	4,7 (3,0-6,3)	10,8 (9,3-12,3)
Emilia-Romagna	18,5 (16,2-20,7)	6,6 (5,0-8,1)	12,5 (11,2-13,8)
Toscana	17,6 (15,2-19,8)	6,0 (4,4-7,5)	11,7 (10,3-13,0)
Umbria	16,5 (13,5-19,4)	4,3 (2,5-6,0)	10,3 (8,6-11,9)
Marche	18,0 (15,4-20,5)	5,9 (4,1-7,5)	11,9 (10,4-13,4)
Lazio	20,9 (18,6-23,2)	6,8 (5,2-8,3)	13,7 (12,4-15,0)
Abruzzo	28,3 (25,1-31,4)	5,6 (3,8-7,3)	16,9 (15,0-18,6)
Molise	34,9 (31,3-38,4)	5,1 (3,1-7,0)	20,1(18,0-22,1)
Campania	14,4 (12,4-16,3)	2,7 (1,7-3,6)	8,5 (7,4-9,5)
Puglia	13,7 (11,6-15,6)	3,3 (2,1-4,4)	8,4 (7,2-9,5)
Basilicata	18,2 (15,1-21,2)	4,1 (2,3-5,8)	11,2 (9,4-12,8)
Calabria	15,3 (12,9-17,7)	2,8 (1,6-4,0)	9,0 (7,6-10,3)
Sicilia	13,4 (11,5-15,3)	2,6 (1,6-3,5)	7,8 (6,8-8,8)
Sardegna	29,3 (26,3-32,2)	4,6 (3,0-6,1)	16,9 (15,2-18,5)
<b>Italia</b>	<b>19,8 (19,1-20,4)</b>	<b>5,3 (4,9-5,7)</b>	<b>12,5 (12,1-12,8)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 4 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) di 19-64 anni per tipologia di comportamento a rischio, genere e regione - Anno 2011**

Regioni	Maschi		Femmine		Totale	
	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking	Eccedenti i limiti giornalieri	Binge drinking
Piemonte	7,4 (5,9-8,8)	18,6 (16,5-20,6)	2,7 (1,6-3,6)	6,0 (4,6-7,4)	5,0 (4,1-5,8)	12,3 (11,1-13,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	9,7 (6,8-12,5)	27,5 (23,3-31,5)	1,8 (0,3-3,2)	6,4 (3,9-8,8)	5,8 (4,1-7,3)	17,0 (14,6-19,4)
Lombardia	7,0 (5,7-8,3)	16,9 (15,1-18,7)	1,6 (0,8-2,3)	5,1 (3,8-6,2)	4,3 (3,6-5,0)	11,1 (10,0-12,0)
Bolzano-Bozen	5,7 (3,7-7,6)	33,1 (29,8-36,4)	1,2 (0,1-2,2)	10,1 (7,7-12,4)	3,5 (2,4-4,5)	21,7 (19,7-23,7)
Trento	6,5 (4,2-8,6)	25,5 (22,0-28,9)	1,4 (0,1-2,6)	4,6 (2,6-6,5)	4,0 (2,7-5,1)	15,1 (13,1-17,0)
Veneto	7,1 (5,5-8,6)	20,1 (17,8-22,3)	1,8 (0,8-2,7)	4,1 (2,8-5,3)	4,5 (3,6-5,3)	12,2 (10,9-13,4)
Friuli Venezia Giulia	7,3 (5,1-9,3)	26,3 (23,0-29,5)	0,6 (0,1-1,3)	6,4 (4,4-8,3)	4,0 (2,8-5,0)	16,4 (14,5-18,2)
Liguria	8,4 (6,3-10,4)	10,6 (8,3-12,8)	2,0 (0,8-3,0)	3,5 (2,0-4,8)	5,1 (4,0-6,2)	7,0 (5,7-8,2)
Emilia-Romagna	6,9 (5,3-8,5)	12,6 (10,6-14,6)	2,2 (1,2-3,2)	4,9 (3,5-6,3)	4,6 (3,6-5,4)	8,8 (7,6-9,8)
Toscana	9,1 (7,2-10,9)	9,9 (7,9-11,7)	2,2 (1,1-3,2)	4,2 (2,8-5,5)	5,6 (4,6-6,6)	7,0 (5,8-8,0)
Umbria	6,5 (4,3-8,5)	11,7 (9,0-14,3)	1,4 (0,2-2,4)	3,0 (1,4-4,4)	3,9 (2,7-5,0)	7,2 (5,7-8,6)
Marche	9,0 (6,9-10,9)	10,6 (8,4-12,7)	1,7 (0,6-2,6)	4,7 (3,1-6,2)	5,3 (4,2-6,4)	7,6 (6,3-8,8)
Lazio	6,9 (5,3-8,5)	16,5 (14,3-18,6)	1,7 (0,8-2,6)	5,3 (3,8-6,6)	4,3 (3,4-5,1)	10,8 (9,5-12,0)
Abruzzo	10,7 (8,3-12,9)	23,4 (20,3-26,3)	1,3 (0,3-2,2)	4,5 (2,8-6,0)	5,9 (4,7-7,1)	13,8 (12,1-15,5)
Molise	13,5 (10,7-16,1)	27,7 (24,2-31,0)	1,5 (0,2-2,6)	3,8 (2,1-5,5)	7,5 (6,0-8,9)	15,9 (13,9-17,7)
Campania	7,7 (6,1-9,1)	9,7 (8,0-11,4)	1,0 (0,4-1,6)	1,8 (1,0-2,6)	4,3 (3,5-5,1)	5,7 (4,8-6,6)
Puglia	7,1 (5,5-8,7)	8,6 (6,8-10,2)	1,2 (0,4-1,9)	2,1 (1,1-3,0)	4,1 (3,3-4,9)	5,3 (4,3-6,2)
Basilicata	9,8 (7,3-12,2)	13,3 (10,6-16,0)	1,1 (0,0-2,0)	3,9 (2,1-5,5)	5,4 (4,1-6,7)	8,6 (7,0-10,1)
Calabria	5,6 (3,9-7,2)	12,1 (9,8-14,2)	0,5 (0,0-1,0)	2,4 (1,2-3,4)	3,0 (2,1-3,8)	7,2 (5,9-8,3)
Sicilia	4,3 (3,1-5,5)	10,2 (8,5-11,9)	0,3 (0,0-0,6)	2,4 (1,4-3,2)	2,3 (1,6-2,8)	6,2 (5,2-7,0)
Sardegna	8,3 (6,3-10,2)	26,4 (23,5-29,2)	0,7 (0,0-1,3)	4,1 (2,6-5,5)	4,5 (3,4-5,4)	15,2 (13,5-16,7)
<b>Italia</b>	<b>7,2 (6,8-7,7)</b>	<b>15,0 (14,4-15,6)</b>	<b>1,5 (1,2-1,7)</b>	<b>4,1 (3,7-4,4)</b>	<b>4,3 (4,1-4,5)</b>	<b>9,5 (9,2-9,8)</b>

\*dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 5 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 65-74 anni per genere e regione - Anno 2011**

Regioni	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	52,2 (45,3-59,0)	12,2 (7,6-16,7)	31,0 (26,8-35,2)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	53,5 (40,3-66,6)	21,6 (12,1-31,0)	35,0 (27,1-42,7)
Lombardia	46,0 (39,4-52,4)	14,8 (10,1-19,3)	29,2 (25,3-33,0)
Bolzano-Bozen	37,7 (26,9-48,4)	11,5 (4,0-18,8)	24,0 (17,7-30,2)
Trento	48,4 (37,2-59,5)	11,9 (4,6-19,2)	28,6 (22,0-35,1)
Veneto	51,4 (43,5-59,2)	11,6 (6,5-16,6)	29,7 (25,0-34,3)
Friuli Venezia Giulia	48,8 (39,3-58,2)	14,1 (8,0-20,1)	29,1 (23,7-34,5)
Liguria	51,2 (42,9-59,5)	21,2 (14,2-28,1)	35,8 (30,4-41,0)
Emilia-Romagna	50,0 (42,1-57,7)	11,4 (5,9-16,7)	30,2 (25,4-35,0)
Toscana	46,3 (38,2-54,2)	13,5 (8,0-18,9)	28,7 (23,9-33,4)
Umbria	40,4 (29,7-51,0)	14,2 (6,4-22,0)	26,9 (20,4-33,2)
Marche	41,4 (32,7-50,1)	14,5 (8,1-20,8)	27,4 (22,1-32,6)
Lazio	39,3 (30,6-47,8)	12,4 (6,7-18,0)	24,5 (19,6-29,4)
Abruzzo	49,8 (39,7-59,9)	5,5 (0,6-10,3)	26,2 (20,3-32,1)
Molise	62,0 (51,7-72,3)	11,8 (4,3-19,2)	36,2 (29,3-43,0)
Campania	48,4 (40,2-56,6)	9,1 (4,4-13,7)	27,5 (22,5-32,4)
Puglia	40,0 (31,8-48,2)	6,4 (2,2-10,5)	21,9 (17,3-26,4)
Basilicata	40,0 (28,1-51,7)	15,4 (7,6-23,2)	25,9 (19,3-32,4)
Calabria	44,9 (34,8-55,0)	11,1 (4,6-17,5)	27,3 (21,2-33,3)
Sicilia	31,1 (23,4-38,7)	5,4 (1,7-8,9)	16,7 (12,7-20,7)
Sardegna	50,5 (41,0-59,9)	8,6 (3,1-13,9)	27,8 (22,2-33,3)
<b>Italia</b>	<b>45,7 (43,4-47,9)</b>	<b>11,7 (10,2-13,1)</b>	<b>27,4 (26,1-28,7)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.

**Tabella 6 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 75 anni ed oltre per genere e regione - Anno 2011**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	52,8 (44,7-60,7)	14,4 (9,7-18,9)	29,1 (24,7-33,3)
Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste	41,3 (27,4-55,2)	19,3 (9,2-29,3)	28,9 (20,8-37,0)
Lombardia	46,3 (37,3-55,2)	13,7 (8,8-18,5)	25,6 (21,1-30,0)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>41,3 (27,0-55,4)</i>	<i>6,0 (0,0-12,0)</i>	<i>19,4 (12,6-26,0)</i>
<i>Trento</i>	<i>55,8 (39,7-71,8)</i>	<i>10,6 (2,5-18,7)</i>	<i>27,0 (18,8-35,1)</i>
Veneto	42,6 (32,4-52,7)	17,2 (10,9-23,4)	27,0 (21,7-32,3)
Friuli Venezia Giulia	51,3 (39,7-62,8)	15,6 (8,4-22,6)	29,8 (23,4-36,2)
Liguria	43,3 (33,9-52,5)	11,9 (7,2-16,4)	22,9 (18,4-27,3)
Emilia-Romagna	39,6 (30,5-48,5)	14,8 (9,6-19,8)	23,9 (19,4-28,3)
Toscana	40,6 (31,9-49,1)	7,2 (3,3-11,1)	20,1 (15,9-24,3)
Umbria	39,1 (28,1-50,0)	8,4 (3,1-13,6)	20,1 (14,7-25,4)
Marche	31,6 (22,1-41,0)	10,8 (5,6-15,9)	18,7 (14,0-23,4)
Lazio	33,5 (24,7-42,2)	8,4 (3,9-12,8)	18,3 (14,0-22,6)
Abruzzo	45,2 (34,8-55,6)	8,0 (3,1-12,9)	22,8 (17,4-28,1)
Molise	44,6 (32,7-56,3)	8,8 (3,2-14,4)	22,1 (16,3-27,8)
Campania	41,9 (32,3-51,5)	7,9 (3,7-12,1)	20,7 (16,0-25,4)
Puglia	35,5 (26,1-44,8)	5,1 (1,2-8,9)	17,3 (12,7-21,7)
Basilicata	39,3 (28,1-50,4)	9,6 (3,1-16,0)	22,8 (16,6-28,9)
Calabria	29,2 (20,2-38,2)	*	13,1 (8,9-17,2)
Sicilia	21,0 (13,7-28,3)	3,6 (0,4-6,6)	10,9 (7,3-14,3)
Sardegna	33,7 (22,4-44,8)	*	14,8 (9,5-20,0)
<b>Italia</b>	<b>39,5 (36,9-42,0)</b>	<b>10,2 (8,8-11,5)</b>	<b>21,5 (20,2-22,7)</b>

\*dato non attendibile.

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2011.



**Tabella 1** - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre che consumano 5 porzioni e più al giorno di verdura, ortaggi e frutta, tasso medio annuo di variazione e quinto di appartenenza per regione - Anni 2005, 2011

Regioni	5+VOF*		Quinto	
	2005	2012	2005	2012
Trento	8,7 (7,9-9,4)	8,1 (7,3-8,8)	5	5
Piemonte	6,7 (6,2-7,1)	5,3 (4,8-5,7)	5	4
Veneto	6,7 (6,2-7,2)	5,5 (4,9-5,9)	5	4
Friuli Venezia Giulia	7,7 (7,1-8,4)	5,5 (4,8-6,1)	5	4
Liguria	5,5 (5,0-6,1)	4,2 (3,6-4,7)	4	2
Sardegna	6,4 (5,9-7,0)	6,0 (5,4-6,5)	4	5
Toscana	5,7 (5,3-6,1)	4,6 (4,1-4,9)	4	3
Campania	5,9 (5,6-6,3)	3,7 (3,3-4,0)	4	2
Lazio	5,5 (5,0-6,0)	5,4 (4,9-5,8)	3	4
Emilia-Romagna	5,1 (4,6-5,5)	5,4 (4,8-5,8)	3	4
Umbria	5,2 (4,6-5,7)	4,7 (4,0-5,3)	3	3
Lombardia	4,9 (4,6-5,3)	5,8 (5,3-6,1)	2	5
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	4,4 (3,8-5,0)	5,0 (4,1-5,7)	2	3
Bolzano/Bozen	4,6 (3,9-5,3)	3,3 (2,8-3,9)	2	1
Molise	4,7 (4,2-5,3)	2,6 (2,0-2,9)	2	1
Marche	4,5 (4,0-5,0)	3,4 (2,8-4,0)	2	2
Abruzzo	4,3 (3,9-4,7)	3,8 (3,2-4,1)	1	2
Sicilia	4,4 (4,1-4,8)	4,3 (3,8-4,6)	1	3
Basilicata	3,2 (2,9-3,6)	1,7 (1,3-2,2)	1	1
Puglia	3,3 (3,0-3,6)	2,0 (1,7-2,3)	1	1
Calabria	2,5 (2,1-2,8)	2,1 (1,6-2,4)	1	1
<b>Italia</b>	<b>5,3 (5,1-5,4)</b>	<b>4,7 (4,5-4,7)</b>		

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana, 2011, 2005". Anno 2012

**Tabella 1 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 18 anni ed oltre in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2012**

<b>Regioni</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>	<b>Persone obese</b>
Piemonte	34,9 (33,9-35,7)	9,1 (8,5-9,7)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	32,8 (31,1-34,2)	9,3 (8,3-10,3)
Lombardia	32,6 (31,8-33,3)	10,3 (9,7-10,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>32,5 (31,4-33,7)</i>	<i>7,5 (6,8-8,3)</i>
<i>Trento</i>	<i>32,6 (31,5-33,8)</i>	<i>8,4 (7,6-9,1)</i>
Veneto	34,2 (33,3-35,1)	10,7 (10,1-11,3)
Friuli Venezia Giulia	34,9 (33,7-36,0)	10,7 (9,8-11,4)
Liguria	32,3 (31,2-33,4)	6,9 (6,2-7,5)
Emilia-Romagna	33,7 (32,6-34,5)	10,6 (9,9-11,2)
Toscana	36,5 (35,6-37,2)	8,8 (8,3-9,3)
Umbria	37,4 (36,0-38,6)	12,0 (10,9-12,8)
Marche	33,8 (32,7-34,8)	10,8 (10,0-11,5)
Lazio	33,7 (32,8-34,4)	9,3 (8,7-9,8)
Abruzzo	39,4 (38,3-40,4)	12,4 (11,6-13,1)
Molise	39,6 (38,4-40,7)	13,5 (12,7-14,4)
Campania	41,1 (40,3-41,8)	11,0 (10,5-11,5)
Puglia	39,0 (38,1-39,8)	12,9 (12,3-13,5)
Basilicata	39,9 (38,5-41,0)	12,6 (11,6-13,4)
Calabria	37,2 (36,1-38,2)	10,6 (9,9-11,3)
Sicilia	38,3 (37,5-39,1)	10,8 (10,2-11,4)
Sardegna	33,9 (32,9-34,9)	9,1 (8,3-9,7)
<b>Italia</b>	<b>35,6 (35,3-35,8)</b>	<b>10,4 (10,2-10,5)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 18 anni ed oltre in sovrappeso ed obese per classe di età e genere - Anno 2012**

<b>Classi di età</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>			<b>Persone obese</b>		
	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
18-24	20,2 (18,9-21,5)	10,9 (9,7-12,0)	15,8 (14,9-16,5)	3,2 (2,5-3,8)	2,3 (1,7-2,9)	2,8 (2,3-3,1)
25-34	33,6 (32,6-34,5)	14,8 (14,0-15,5)	24,2 (23,5-24,7)	5,7 (5,2-6,2)	4,7 (4,2-5,2)	5,2 (4,8-5,5)
35-44	46,4 (45,9-46,9)	20,5 (20,0-20,9)	33,5 (33,1-33,8)	10,3 (9,9-10,6)	6,0 (5,7-6,2)	8,2 (7,9-8,3)
45-54	47,6 (46,7-48,4)	27,7 (26,9-28,5)	37,6 (37,0-38,1)	12,8 (12,1-13,3)	9,5 (8,8-10,0)	11,1 (10,6-11,4)
55-64	52,1 (51,0-53,0)	36,1 (35,1-37,0)	43,8 (43,1-44,4)	15,5 (14,7-16,2)	13,4 (12,6-14,0)	14,4 (13,9-14,8)
65-74	52,5 (51,3-53,6)	39,6 (38,5-40,7)	45,8 (45,0-46,4)	16,1 (15,1-16,9)	15,8 (14,9-16,6)	15,9 (15,3-16,5)
75 ed oltre	49,5 (48,1-50,8)	38,3 (37,2-39,2)	42,5 (41,7-43,2)	14,0 (12,9-15,0)	12,8 (11,9-13,5)	13,2 (12,6-13,8)
<b>Totale</b>	<b>44,2 (43,8-44,6)</b>	<b>27,6 (27,2-27,9)</b>	<b>35,6 (35,3-35,9)</b>	<b>11,3 (11,0-11,6)</b>	<b>9,5 (9,3-9,7)</b>	<b>10,4 (10,2-10,5)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 1** - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 3 anni ed oltre che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2012

Regioni	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
Piemonte	25,0 (24,2-25,7)	11,6 (11,0-12,1)	33,3 (32,5-34,1)	29,7 (28,9-30,5)	0,3 (0,1-0,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	26,4 (24,6-27,3)	14,6 (13,5-15,7)	27,6 (26,3-28,9)	30,9 (29,5-32,2)	0,4 (0,4-1,1)
Lombardia	26,8 (26,1-27,4)	10,3 (9,8-10,8)	31,2 (30,4-31,8)	31,4 (30,7-32,0)	0,3 (0,1-0,4)
<i>Bolzano-Bozen</i>	37,3 (36,1-38,3)	18,1 (17,2-19,0)	29,8 (28,6-30,7)	14,2 (13,4-15,1)	0,7(0,3-0,8)
<i>Trento</i>	29,4 (28,3-30,4)	16,1 (15,3-17,0)	38,5 (37,5-39,6)	16,0 (15,1-16,8)	n.a.
Veneto	27,6 (26,8-28,3)	12,4 (11,8-13,0)	37,0 (36,2-37,8)	22,8 (22,0-23,5)	0,2 (0,0-0,2)
Friuli Venezia Giulia	24,8 (23,8-25,7)	10,5 (9,6-11,1)	34,1 (33,0-35,1)	30,3 (29,3-31,3)	0,2 (0,0-0,4)
Liguria	24,3 (23,4-25,2)	7,7 (7,0-8,3)	32,2 (31,1-33,2)	35,4 (34,3-36,3)	0,4 (0,2-0,6)
Emilia-Romagna	25,6 (24,7-26,3)	9,7(9,1-10,3)	32,9 (32,0-33,7)	31,1 (30,2-31,9)	0,7 (0,4-0,8)
Toscana	24,9 (24,2-25,5)	8,7 (8,2-9,1)	30,2 (29,5-30,9)	35,9 (35,1-36,6)	0,3 (0,1-0,4)
Umbria	21,9 (20,8-22,9)	8,2 (7,4-8,9)	30,7 (29,5-31,8)	39,1 (37,9-40,3)	0,1 (0,0-0,2)
Marche	23,7 (22,8-24,6)	8,1 (7,5-8,8)	31,6 (30,6-32,5)	35,8 (34,8-36,7)	0,8 (0,4-0,9)
Lazio	22,2 (21,4-22,8)	8,4 (7,9-8,8)	24,9 (24,1-25,5)	43,8 (42,9-44,5)	0,8 (0,6-0,9)
Abruzzo	19,8 (18,9-20,5)	8,0 (7,4-8,5)	28,1 (27,2-29,0)	43,5 (42,5-44,4)	0,5 (0,3-0,7)
Molise	17,5 (16,4-18,2)	8,1 (7,3-8,6)	23,5 (22,5-24,4)	50,7 (49,7-51,8)	0,2 (0,1-0,4)
Campania	13,6 (13,1-14,1)	5,7 (5,3-6,0)	22,9 (22,2-23,4)	57,3 (56,6-57,9)	0,5 (0,4-0,6)
Puglia	14,5 (13,9-15,1)	7,2 (6,7-7,6)	26,2 (25,4-26,9)	51,1 (50,2-51,8)	0,9 (0,7-1,1)
Basilicata	16,8 (15,9-17,7)	5,9 (5,3-6,5)	29,8 (28,7-30,8)	47,0 (45,8-48,1)	0,6 (0,2-0,7)
Calabria	15,3 (14,5-16,0)	8,4 (7,8-8,9)	27,1 (26,2-27,9)	47,3 (46,3-48,2)	1,9 (1,6-2,2)
Sicilia	13,5 (12,9-14,0)	8,7 (8,1-9,1)	22,0 (21,2-22,6)	55,2 (54,4-55,9)	0,7 (0,5-0,8)
Sardegna	19,9 (19,1-20,7)	9,4 (8,8-10,0)	28,7 (27,8-29,6)	41,7 (40,7-42,6)	0,2 (0,0-0,3)
<b>Italia</b>	<b>21,9 (21,7-22,1)</b>	<b>9,2 (9,1-9,4)</b>	<b>29,2 (29,0-29,4)</b>	<b>39,2 (38,9-39,4)</b>	<b>0,5(0,5-0,6)</b>

n.a. = non applicabile

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 3 anni ed oltre che praticano sport o attività fisica per classe di età e genere - Anno 2012**

Classi d'età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessuno sport	Non indicato
<b>MASCHI</b>					
3-5	19,3 (17,5-21,1)	4,1 (3,0-5,1)	24,5 (22,6-26,5)	48,3 (46,2-50,4)	3,8 (2,7-4,7)
6-10	60,8 (60,4-61,0)	9,0 (8,8-9,2)	14,0 (13,7-14,2)	14,8 (14,5-15,0)	1,5 (1,3-1,5)
11-14	60,8 (58,4-63,1)	9,1 (7,5-10,6)	12,5 (10,7-14,2)	16,5 (14,5-18,4)	1,0 (0,3-1,6)
15-17	52,5 (51,7-53,3)	17,2 (16,5-17,8)	13,1 (12,5-13,6)	17,1 (16,4-17,7)	0,2 (0,0-0,2)
18-19	39,9 (38,8-40,8)	18,0 (17,1-18,7)	17,7 (16,8-18,4)	24,1 (23,2-25,0)	n.a.
20-24	44,6 (43,0-46,2)	16,7 (15,4-17,9)	17,4 (16,0-18,6)	20,9 (19,5-22,2)	0,4 (0,0-0,6)
25-34	34,3 (33,8-34,8)	15,0 (14,5-15,4)	20,7 (20,2-21,2)	29,6 (29,1-30,1)	0,3 (0,1-0,3)
35-44	24,4 (23,9-24,8)	14,9 (14,5-15,3)	25,8 (25,2-26,2)	34,6 (34,0-35,1)	0,4 (0,2-0,4)
45-54	19,8 (19,0-20,5)	12,3 (11,6-12,9)	29,8 (28,9-30,6)	37,9 (37,0-38,7)	0,2 (0,1-0,3)
55-59	16,8 (15,9-17,7)	9,1 (8,3-9,7)	35,6 (34,5-36,6)	38,3 (37,2-39,4)	0,2 (0,0-0,3)
60-64	15,4 (14,7-16,0)	8,7 (8,1-9,1)	38,6 (37,8-39,4)	36,8 (36,0-37,5)	0,5 (0,3-0,6)
65-74	11,4 (10,9-11,8)	6,4 (6,0-6,7)	41,1 (40,4-41,7)	40,8 (40,0-41,4)	0,3 (0,1-0,4)
75 ed oltre	4,6 (3,9-5,2)	3,5 (2,9-4,0)	32,7 (31,4-33,9)	58,7 (57,4-60,0)	0,5 (0,2-0,6)
<b>Totale</b>	<b>26,4 (26,1-26,8)</b>	<b>11,3 (11,0-11,5)</b>	<b>27,2 (26,9-27,5)</b>	<b>34,6 (34,2-34,9)</b>	<b>0,5 (0,4-0,6)</b>
<b>FEMMINE</b>					
3-5	19,9 (18,0-21,5)	4,5 (3,4-5,5)	21,6 (19,8-23,4)	50,0 (47,8-52,0)	4,0 (3,0-5,0)
6-10	53,2 (52,8-53,5)	7,1 (6,9-7,3)	18,1 (17,8-18,3)	20,6 (20,3-20,9)	0,9 (0,8-1,0)
11-14	45,4 (42,8-47,9)	8,5 (6,8-10,0)	22,7 (20,4-24,9)	22,2 (19,9-24,3)	1,2 (0,4-1,8)
15-17	44,5 (43,6-45,2)	9,1 (8,6-9,7)	22,0 (21,3-22,7)	23,8 (23,0-24,5)	0,6 (0,4-0,7)
18-19	29,0 (28,0-30,0)	13,1 (12,4-13,9)	27,8 (26,8-28,7)	29,7 (28,7-30,7)	0,4 (0,1-0,5)
20-24	22,4 (20,9-23,8)	14,4 (13,0-15,6)	30,0 (28,3-31,5)	33,2 (31,6-34,8)	*
25-34	20,6 (20,0-21,0)	10,7 (10,3-11,1)	31,1 (30,5-31,6)	37,4 (36,8-37,9)	0,2 (0,1-0,3)
35-44	17,4 (16,9-17,8)	10,2 (9,8-10,5)	34,4 (33,8-34,8)	37,6 (37,1-38,1)	0,4 (0,3-0,5)
45-54	14,6 (13,8-15,2)	7,9 (7,3-8,4)	36,7 (35,8-37,5)	40,6 (39,7-41,4)	0,2 (0,0-0,3)
55-59	11,7 (11,0-12,4)	5,5 (4,9-6,0)	40,4 (39,3-41,4)	42,1 (40,9-43,0)	0,2 (0,1-0,3)
60-64	9,4 (8,9-9,9)	4,8 (4,4-5,2)	38,5 (37,7-39,1)	46,9 (46,1-47,6)	0,4 (0,2-0,5)
65-74	7,7 (7,3-8,0)	4,0 (3,6-4,2)	36,8 (36,1-37,4)	51,1 (50,5-51,7)	0,4 (0,2-0,5)
75 ed oltre	2,5 (2,0-2,8)	1,2 (0,8-1,4)	18,6 (17,7-19,3)	76,9 (76,1-77,7)	0,9 (0,6-1,0)
<b>Totale</b>	<b>17,6 (17,3-17,8)</b>	<b>7,3 (7,1-7,5)</b>	<b>31,1 (30,8-31,4)</b>	<b>43,5 (43,1-43,8)</b>	<b>0,6 (0,5-0,6)</b>
<b>TOTALE</b>					
3-5	19,6 (18,3-20,7)	4,3 (3,6-4,9)	23,1 (21,8-24,3)	49,2 (47,7-50,5)	3,9 (3,2-4,5)
6-10	57,0 (56,7-57,2)	8,1 (7,9-8,2)	16,0 (15,8-16,2)	17,7 (17,5-17,8)	1,2 (1,1-1,2)
11-14	53,4 (51,7-55,0)	8,8 (7,7-9,8)	17,4 (16,0-18,7)	19,3 (17,8-20,6)	1,1 (0,6-1,5)
15-17	48,5 (48,0-49,0)	13,2 (12,7-13,5)	17,5 (17,1-17,9)	20,4 (19,9-20,8)	0,4 (0,2-0,4)
18-19	34,7 (33,9-35,2)	15,7 (15,1-16,2)	22,5 (21,9-23,1)	26,8 (26,1-27,3)	0,4 (0,2-0,4)
20-24	34,0 (33,0-35,0)	15,6 (14,7-16,4)	23,4 (22,4-24,3)	26,8 (25,7-27,7)	0,2 (0,0-0,3)
25-34	27,4 (27,0-27,7)	12,9 (12,5-13,1)	25,9 (25,5-26,2)	33,5 (33,1-33,8)	0,3 (0,2-0,3)
35-44	20,9 (20,6-21,1)	12,6 (12,3-12,8)	30,0 (29,7-30,3)	36,1 (35,7-36,4)	0,4 (0,3-0,4)
45-54	17,2 (16,6-17,6)	10,1 (9,6-10,4)	33,3 (32,6-33,8)	39,3 (38,6-39,8)	0,2 (0,1-0,3)
55-59	14,2 (13,6-14,7)	7,2 (6,7-7,6)	38,1 (37,4-38,8)	40,3 (39,5-40,9)	0,2 (0,1-0,3)
60-64	12,3 (11,9-12,6)	6,7 (6,3-6,9)	38,5 (38,0-39,0)	42,1 (41,5-42,5)	0,4 (0,3-0,5)
65-74	9,5 (9,2-9,7)	5,1 (4,9-5,3)	38,8 (38,4-39,2)	46,2 (45,7-46,6)	0,3 (0,2-0,4)
75 ed oltre	3,3 (2,9-3,5)	2,0 (1,7-2,3)	23,9 (23,2-24,5)	70,1 (69,4-70,7)	0,7 (0,5-0,8)
<b>Totale</b>	<b>21,9 (21,7-22,1)</b>	<b>9,2 (9,1-9,4)</b>	<b>29,2 (29,0-29,4)</b>	<b>39,2 (38,9-39,4)</b>	<b>0,5 (0,5-0,6)</b>

n.a. = non applicabile

\*Dato non attendibile

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 1 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 14 anni ed oltre per abitudine al fumo per regione - Anno 2013**

<b>Regioni</b>	<b>Fumatori</b>	<b>Ex fumatori</b>	<b>Non fumatori</b>
Piemonte	20,9 (20,2-21,6)	22,4 (21,6-23,1)	55,2 (54,4-56,1)
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	18,0 (16,8-19,3)	24,3 (23,0-25,7)	56,8 (55,3-58,2)
Lombardia	20,5 (19,8-21,1)	24,1 (23,4-24,7)	54,4 (53,7-55,1)
<i>Bozano/Bozen</i>	<i>19,4 (18,3-20,5)</i>	<i>26,3 (25,1-27,5)</i>	<i>52,7 (51,4-54,0)</i>
<i>Trento</i>	<i>16,3 (15,3-17,3)</i>	<i>24,8 (23,7-26,0)</i>	<i>56,0 (54,8-57,3)</i>
Veneto	18,6 (17,9-19,3)	26,2 (25,4-27,0)	54,5 (53,6-55,3)
Friuli Venezia Giulia	19,1 (18,2-20,1)	27,4 (26,3-28,4)	52,0 (50,9-53,1)
Liguria	19,5 (18,6-20,4)	24,4 (23,5-25,3)	54,9 (53,9-55,9)
Emilia-Romagna	20,7 (19,8-21,5)	26,2 (25,3-27,1)	52,0 (51,0-53,0)
Toscana	22,3 (21,5-23,2)	27,2 (26,3-28,1)	49,5 (48,5-50,4)
Umbria	23,0 (22,0-24,1)	25,6 (24,5-26,6)	51,0 (49,8-52,2)
Marche	18,8 (17,9-19,7)	25,2 (24,2-26,2)	55,0 (53,9-56,0)
Lazio	23,6 (22,8-24,3)	21,9 (21,1-22,6)	53,4 (52,5-54,3)
Abruzzo	21,6 (20,7-22,4)	22,0 (21,2-22,8)	54,7 (53,7-55,6)
Molise	19,2 (18,5-20,0)	22,8 (22,0-23,6)	56,9 (56,0-57,9)
Campania	22,9 (22,2-23,5)	19,3 (18,7-19,9)	57,2 (56,4-57,9)
Puglia	18,8 (18,1-19,4)	21,0 (20,3-21,6)	59,6 (58,8-60,4)
Basilicata	18,8 (17,7-19,9)	22,9 (21,7-24,1)	56,4 (55,1-57,6)
Calabria	18,2 (17,4-18,9)	18,7 (17,9-19,5)	61,4 (60,5-62,3)
Sicilia	22,2 (21,5-22,8)	19,8 (19,2-20,5)	56,1 (55,3-56,8)
Sardegna	21,2 (20,4-22,1)	27,2 (26,3-28,1)	51,1 (50,1-52,1)
<b>Italia</b>	<b>20,9 (20,6-21,1)</b>	<b>23,3 (23,0-23,5)</b>	<b>54,7 (54,5-55,0)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2014

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 14 anni ed oltre per abitudine al fumo per classe di età e genere - Anno 2013**

Classi di età	Maschi			Femmine			Totale		
	Fumatori	Ex fumatori	Non fumatori	Fumatori	Ex fumatori	Non fumatori	Fumatori	Ex fumatori	Non fumatori
14-17	8,0 (7,0-9,0)	3,4 (2,7-4,0)	86,9 (85,8-87,9)	4,4 (3,6-5,2)	3,5 (2,7-4,2)	90,1 (89,1-91,1)	6,3 (5,7-6,9)	3,4 (2,9-3,9)	88,4 (87,7-89,1)
18-19	27,7 (27,1-28,1)	6,8 (6,4-7,0)	64,5 (64,0-65,0)	15,1 (14,6-15,5)	6,8 (6,5-7,1)	76,5 (76,0-76,9)	21,7 (21,3-22,0)	6,8 (6,5-7,0)	70,2 (69,9-70,5)
20-24	34,0 (32,1-35,9)	10,2 (8,9-11,5)	52,6 (50,6-54,6)	19,4 (17,7-21,0)	8,8 (7,6-10,0)	70,7 (69,0-72,5)	26,7 (25,5-27,9)	9,5 (8,7-10,4)	61,7 (60,4-62,9)
25-34	36,2 (35,9-36,6)	16,8 (16,5-17,1)	45,4 (45,0-45,8)	20,4 (20,1-20,7)	16,0 (15,7-16,3)	61,7 (61,4-62,1)	28,4 (28,2-28,6)	16,4 (16,2-16,6)	53,5 (53,2-53,7)
35-44	32,7 (32,4-33,0)	24,2 (23,9-24,4)	42,5 (42,2-42,8)	19,3 (19,0-19,6)	17,4 (17,2-17,7)	62,4 (62,1-62,7)	26,0 (25,8-26,2)	20,8 (20,6-21,0)	52,5 (52,3-52,7)
45-54	31,7 (30,9-32,5)	29,3 (28,5-30,0)	38,5 (37,7-39,4)	22,1 (21,3-22,8)	19,7 (19,0-20,4)	57,4 (56,6-58,2)	26,7 (26,2-27,2)	24,3 (23,9-24,8)	48,2 (47,7-48,8)
55-59	27,1 (26,4-27,8)	38,5 (37,8-39,3)	33,7 (33,0-34,5)	19,5 (18,8-20,2)	20,4 (19,8-21,1)	58,0 (57,2-58,8)	23,3 (22,8-23,8)	29,5 (29,0-30,0)	45,9 (45,4-46,4)
60-64	23,2 (22,4-24,0)	44,0 (43,1-44,9)	31,7 (30,8-32,6)	16,6 (15,9-17,3)	19,3 (18,5-20,0)	62,9 (62,1-63,7)	19,8 (19,3-20,3)	31,4 (30,8-31,9)	47,6 (47,0-48,2)
65-74	16,6 (15,7-17,5)	52,0 (50,8-53,1)	30,5 (29,4-31,7)	9,9 (9,2-10,7)	19,4 (18,4-20,3)	69,8 (68,8-70,8)	13,1 (12,5-13,6)	34,7 (34,0-35,4)	51,3 (50,6-52,0)
75 ed oltre	7,3 (6,7-8,0)	58,2 (57,0-59,3)	33,8 (32,7-34,9)	3,7 (3,3-4,1)	12,2 (11,6-12,9)	83,0 (82,4-83,7)	5,1 (4,7-5,4)	29,9 (29,3-30,6)	64,0 (63,4-64,7)
<b>Totale</b>	<b>26,4 (26,2-26,5)</b>	<b>30,8 (30,6-30,9)</b>	<b>41,8 (41,6-41,9)</b>	<b>15,7 (15,6-15,9)</b>	<b>16,3 (16,1-16,4)</b>	<b>66,8 (66,7-66,9)</b>	<b>20,9 (20,8-21,0)</b>	<b>23,3 (23,2-23,3)</b>	<b>54,7 (54,6-54,8)</b>

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2014

**Tabella 1 - Prevalenza (per 100) dei non consumatori e dei consumatori per regione - Anni 2011-2012**

Regioni	2011				2012			
	Consumavano	Mai	Non consumatori	Consumatori	Consumavano	Mai	Non consumatori	Consumatori
Piemonte	4,4 (3,7-5,0)	26,8 (25,5-27,9)	31,2 (29,9-32,4)	67,1 (65,8-68,3)	4,7 (4,0-5,4)	30,0 (28,7-31,3)	34,7 (33,3-36,1)	64,4 (63,1-65,8)
Valle d'Aosta	4,7 (3,5-5,8)	22,1 (19,9-24,1)	26,7 (24,5-28,9)	71,1 (68,9-73,1)	4,7 (3,5-5,9)	25,5 (23,4-27,7)	30,2 (28,0-32,4)	68,2 (66,1-70,4)
Lombardia	5,2 (4,5-5,8)	25,0 (23,9-26,0)	30,2 (29,0-31,2)	68,6 (67,5-69,7)	4,9 (4,2-5,6)	28,1 (26,8-29,3)	33,0 (31,7-34,3)	66,4 (65,1-67,7)
Bolzano	7,5 (6,4-8,6)	17,1 (15,5-18,5)	24,6 (22,9-26,2)	72,0 (70,4-73,5)	5,5 (4,4-6,6)	18,0 (16,3-19,6)	23,5 (21,7-25,2)	74,6 (72,9-76,3)
Trento	9,3 (7,9-10,5)	26,7 (24,8-28,4)	35,9 (34,0-37,8)	63,7 (61,8-65,5)	7,6 (6,3-8,8)	28,4 (26,5-30,4)	36,0 (33,9-38,0)	63,6 (61,6-65,6)
Veneto	6,1 (5,2-6,8)	24,4 (23,0-25,6)	30,5 (29,1-31,7)	69,0 (67,6-70,2)	4,5 (3,8-5,2)	24,3 (23,0-25,5)	28,7 (27,4-30,1)	70,4 (69,1-71,7)
Friuli Venezia Giulia	6,3 (5,2-7,3)	24,3 (22,5-25,9)	30,5 (28,7-32,2)	67,6 (65,8-69,3)	4,3 (3,5-5,2)	23,7 (22,1-25,3)	28,0 (26,3-29,7)	69,9 (68,3-71,5)
Liguria	5,3 (4,3-6,1)	28,6 (27,0-30,1)	33,8 (32,2-35,4)	65,7 (64,1-67,2)	3,4 (2,7-4,2)	25,9 (24,3-27,5)	29,3 (27,7-30,9)	69,5 (68,0-71,1)
Emilia Romagna	5,3 (4,5-6,0)	24,6 (23,2-25,8)	29,8 (28,5-31,1)	68,7 (67,4-69,9)	4,7 (3,8-5,5)	26,4 (24,8-27,9)	31,0 (29,4-32,6)	66,8 (65,3-68,4)
Toscana	6,6 (5,7-7,4)	26,8 (25,4-28,1)	33,4 (31,9-34,8)	64,6 (63,1-65,9)	4,1 (3,4-4,8)	27,9 (26,4-29,4)	32,0 (30,5-33,5)	66,6 (65,1-68,2)
Umbria	4,8 (3,8-5,7)	29,1 (27,2-30,9)	33,9 (31,9-35,7)	64,9 (63,0-66,7)	4,4 (3,4-5,3)	31,4 (29,6-33,2)	35,8 (33,9-37,6)	63,6 (61,9-65,4)
Marche	6,9 (5,9-7,8)	26,9 (25,3-28,4)	33,8 (32,1-35,4)	64,5 (62,9-66,0)	4,3 (3,4-5,1)	26,0 (24,4-27,6)	30,3 (28,6-32,0)	67,8 (66,2-69,5)
Lazio	5,8 (5,0-6,5)	26,0 (24,7-27,2)	31,8 (30,4-33,1)	66,9 (65,5-68,1)	3,5 (2,9-4,2)	28,9 (27,5-30,4)	32,5 (31,0-34,0)	65,3 (63,8-66,8)
Abruzzo	5,8 (4,7-6,7)	29,5 (27,8-31,2)	35,3 (33,4-37,1)	63,5 (61,6-65,2)	3,5 (2,7-4,4)	31,5 (29,6-33,3)	35,0 (33,1-36,9)	62,9 (61,0-64,8)
Molise	5,2 (4,2-6,2)	32,9 (31,0-34,6)	38,1 (36,2-39,9)	61,1 (59,2-62,9)	5,9 (4,8-7,1)	31,9 (29,8-34,0)	37,8 (35,6-40,0)	61,4 (59,2-63,5)
Campania	5,2 (4,4-5,9)	33,5 (32,0-34,8)	38,6 (37,1-40,1)	60,4 (58,9-61,8)	4,0 (3,3-4,7)	35,7 (34,1-37,2)	39,7 (38,1-41,3)	59,6 (58,0-61,2)
Puglia	5,0 (4,2-5,7)	32,8 (31,3-34,1)	37,8 (36,3-39,1)	61,7 (60,2-63,0)	3,2 (2,5-3,8)	34,4 (32,9-35,9)	37,6 (36,1-39,1)	61,6 (60,1-63,1)
Basilicata	3,1 (2,3-3,9)	34,0 (32,0-35,8)	37,1 (35,1-39,0)	60,1 (58,2-62,0)	3,1 (2,2-3,9)	37,4 (35,4-39,4)	40,5 (38,4-42,5)	56,5 (54,4-58,5)
Calabria	4,5 (3,7-5,3)	30,7 (29,0-32,3)	35,2 (33,5-36,8)	63,6 (61,9-65,2)	4,5 (3,6-5,4)	34,9 (33,2-36,6)	39,4 (37,6-41,1)	59,7 (58,0-61,4)
Sicilia	6,3 (5,5-7,0)	34,5 (33,1-35,8)	40,8 (39,4-42,1)	56,3 (54,9-57,6)	2,6 (2,0-3,2)	36,3 (34,9-37,8)	38,9 (37,5-40,4)	59,8 (58,4-61,2)
Sardegna	7,5 (6,4-8,5)	28,9 (27,3-30,5)	36,4 (34,7-38,1)	62,5 (60,8-64,1)	4,5 (3,6-5,4)	34,7 (32,9-36,5)	39,2 (37,3-41,0)	59,7 (57,9-61,6)
<b>Italia</b>	<b>5,6 (5,3-5,7)</b>	<b>28,0 (27,6-28,4)</b>	<b>33,6 (33,2-33,9)</b>	<b>65,0 (64,6-65,3)</b>	<b>4,1 (3,9-4,4)</b>	<b>30,0 (29,6-30,5)</b>	<b>34,2 (33,7-34,6)</b>	<b>64,6 (64,2-65,0)</b>

Fonte dei dati: Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anni 2012, 2013.

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS\*) della classe di età 11-17 anni per genere e regione - Anno 2012**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	22,1 (12,0-32,2)	17,1 (8,7-25,6)	19,4 (13,3-25,5)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	34,4 (18,1-50,7)	28,2 (6,1-50,3)	32,1 (19,9-44,4)
Lombardia	19,9 (12,0-27,9)	15,8 (8,6-23,1)	17,9 (12,8-23,0)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>28,1 (15,2-41,1)</i>	<i>29,4 (18,8-40,1)</i>	<i>28,9 (21,2-36,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>27,3 (15,8-38,8)</i>	<i>23,4 (10,3-36,5)</i>	<i>25,6 (17,5-33,8)</i>
Veneto	22,9 (14,1-31,6)	21,4 (12,0-30,9)	22,2 (16,2-28,2)
Friuli Venezia Giulia	24,4 (12,3-36,4)	26,9 (13,6-40,2)	25,5 (17,2-33,9)
Liguria	15,6 (5,4-25,8)	28,2 (14,6-41,8)	21,3 (13,5-29,1)
Emilia-Romagna	30,2 (17,7-42,8)	17,6 (7,1-28,2)	23,8 (16,0-31,6)
Toscana	23,4 (14,7-32,0)	22,1 (12,6-31,6)	22,8 (16,7-28,9)
Umbria	22,0 (7,1-37,0)	21,2 (8,5-33,8)	21,6 (12,6-30,5)
Marche	29,3 (17,2-41,4)	14,1 (3,5-24,8)	22,3 (14,5-30,1)
Lazio	12,0 (4,5-19,6)	9,8 (2,4-17,3)	11,0 (5,9-16,0)
Abruzzo	15,5 (4,5-26,6)	12,1 (3,1-21,2)	13,7 (7,0-20,4)
Molise	34,7 (21,0-48,3)	*	20,1 (12,4-27,9)
Campania	15,2 (8,6-21,7)	15,0 (8,6-21,4)	15,1 (10,6-19,5)
Puglia	31,1(22,5-39,7)	21,9 (13,8-29,9)	26,6 (21,0-32,2)
Basilicata	20,4 (9,8-31,0)	14,1 (3,3-25,0)	17,6 (10,4-24,9)
Calabria	21,0 (11,6-30,4)	11,2 (3,4-19,0)	16,2 (10,3-22,1)
Sicilia	26,3 (18,8-33,8)	19,2 (11,7-26,7)	23,0 (18,0-28,1)
Sardegna	23,9 (12,1-35,6)	9,9 (0,6-19,1)	17,2 (9,9-24,6)
<b>Italia</b>	<b>22,0 (19,5-24,6)</b>	<b>17,3 (14,9-19,7)</b>	<b>19,7 (18,0-21,4)</b>

\*Dato non attendibile

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.



**Tabella 3 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 18-64 anni per genere e regione - Anno 2012**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	20,0 (17,7-22,2)	8,9 (7,2-10,7)	14,5 (13,1-15,8)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	27,6 (23,5-31,7)	13,3 (10,1-16,6)	20,5 (18,0-22,9)
Lombardia	17,3 (15,3-19,3)	10,5 (8,8-12,3)	14,0 (12,7-15,3)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>41,2 (37,6-44,8)</i>	<i>16,3 (13,4-19,3)</i>	<i>29,1 (26,8-31,3)</i>
<i>Trento</i>	<i>29,3 (25,7-32,9)</i>	<i>10,5 (7,9-13,1)</i>	<i>19,8 (17,7-22,0)</i>
Veneto	23,8 (21,5-26,2)	9,0 (7,3-10,8)	16,5 (15,1-17,9)
Friuli Venezia Giulia	29,3 (26,0-32,5)	8,1 (5,9-10,3)	18,7 (16,8-20,6)
Liguria	16,4 (13,7-19,2)	11,3 (9,0-13,7)	13,8 (12,1-15,5)
Emilia-Romagna	21,9 (19,2-24,6)	9,3 (7,3-11,3)	15,6 (14,0-17,2)
Toscana	21,2 (18,7-23,8)	11,3 (9,3-13,3)	16,2 (14,6-17,8)
Umbria	15,3 (12,4-18,1)	5,6 (3,6-7,6)	10,4 (8,8-12,1)
Marche	19,3 (16,5-22,1)	9,8 (7,6-12,0)	14,5 (12,8-16,2)
Lazio	14,0 (11,9-16,1)	7,9 (6,2-9,6)	10,9 (9,6-12,2)
Abruzzo	24,5 (21,3-27,7)	8,2 (6,0-10,3)	16,3 (14,5-18,2)
Molise	28,1 (24,3-31,9)	10,2 (7,5-12,9)	19,1 (16,8-21,4)
Campania	14,8 (12,7-16,9)	7,4 (5,8-9,0)	11,1 (9,8-12,4)
Puglia	17,1 (14,8-19,4)	7,8 (6,1-9,5)	12,4 (11,0-13,7)
Basilicata	21,1 (17,8-24,3)	5,8 (3,8-7,9)	13,5 (11,6-15,3)
Calabria	24,9 (22,0-27,9)	5,1 (3,4-6,7)	14,9 (13,3-16,5)
Sicilia	17,2 (15,0-19,4)	6,7 (5,2-8,2)	11,8 (10,6-13,1)
Sardegna	30,2 (27,0-33,4)	7,5 (5,5-9,5)	18,9 (17,0-20,8)
<b>Italia</b>	<b>19,5 (18,8-20,2)</b>	<b>8,7 (8,2-9,2)</b>	<b>14,1 (13,7-14,5)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 4 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) nella popolazione di età 18-64 anni per genere, tipologia di comportamento a rischio e regione - Anno 2012**

Regioni	Maschi		Femmine	
	Eccedenti i limiti giornalieri	<i>Binge drinking</i>	Eccedenti i limiti giornalieri	<i>Binge drinking</i>
Piemonte	8,1 (6,4-9,8)	14,9 (12,9-17,0)	5,0 (3,6-6,4)	4,5 (3,2-5,9)
Valle d'Aosta	10,4 (7,4-13,5)	22,7 (18,8-26,6)	7,6 (4,9-10,3)	5,7 (3,3-8,2)
Lombardia	6,2 (4,8-7,6)	13,0 (11,2-14,9)	6,4 (5,0-7,9)	4,7 (3,4-5,9)
<i>Bolzano</i>	<i>8,3 (6,1-10,6)</i>	<i>37,8 (34,3-41,4)</i>	<i>3,1 (1,5-4,7)</i>	<i>13,8 (11,0-16,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>9,8 (7,3-12,3)</i>	<i>23,3 (19,9-26,7)</i>	<i>4,3 (2,5-6,1)</i>	<i>6,6 (4,4-8,7)</i>
Veneto	9,3 (7,6-11,0)	17,4 (15,3-19,6)	4,7 (3,4-6,1)	4,7 (3,4-6,1)
Friuli Venezia Giulia	10,5 (8,1-12,8)	22,8 (19,7-25,8)	4,2 (2,5-5,8)	4,8 (3,1-6,6)
Liguria	9,0 (6,8-11,2)	10,4 (8,1-12,7)	8,5 (6,4-10,7)	3,8 (2,3-5,4)
Emilia Romagna	11,5 (9,4-13,7)	13,8 (11,5-16,1)	6,2 (4,5-7,9)	3,9 (2,5-5,4)
Toscana	12,6 (10,5-14,8)	11,6 (9,5-13,6)	8,2 (6,4-10,0)	4,1 (2,8-5,4)
Umbria	6,4 (4,3-8,5)	10,8 (8,3-13,3)	3,3 (1,7-5,0)	2,3 (0,9-3,7)
Marche	10,4 (8,1-12,7)	13,8 (11,2-16,3)	7,5 (5,5-9,6)	2,6 (1,3-3,9)
Lazio	7,3 (5,7-9,0)	9,4 (7,6-11,2)	5,1 (3,7-6,5)	3,0 (1,9-4,2)
Abruzzo	11,9 (9,4-14,3)	16,8 (14,0-19,7)	3,7 (2,2-5,3)	4,8 (3,1-6,6)
Molise	11,9 (9,1-14,8)	20,3 (16,9-23,8)	5,9 (3,7-8,0)	4,8 (2,8-6,8)
Campania	8,0 (6,4-9,7)	8,8 (7,1-10,6)	4,8 (3,5-6,1)	2,8 (1,8-3,8)
Puglia	9,5 (7,7-11,4)	10,2 (8,3-12,1)	5,3 (3,9-6,8)	2,9 (1,8-4,1)
Basilicata	11,9 (9,2-14,6)	14,2 (11,3-17,1)	4,3 (2,5-6,1)	2,0 (0,6-3,3)
Calabria	10,8 (8,5-13,0)	20,5 (17,8-23,3)	2,4 (1,2-3,6)	3,1 (1,8-4,4)
Sicilia	5,5 (4,1-7,0)	13,8 (11,8-15,9)	4,1 (2,9-5,3)	4,3 (3,1-5,6)
Sardegna	11,3 (9,0-13,6)	24,1 (21,1-27,1)	3,9 (2,4-5,4)	4,0 (2,4-5,5)
<b>Italia</b>	<b>8,7 (8,1-9,2)</b>	<b>13,8 (13,2-14,4)</b>	<b>5,4 (5,0-5,8)</b>	<b>4,0 (3,6-4,3)</b>

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 5 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 65-74 anni per genere e regione - Anno 2012**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	46,5 (39,3-53,7)	6,6 (2,6-10,5)	25,7 (21,5-30,0)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	56,0 (42,3-69,6)	11,8 (3,1-20,4)	31,3 (23,1-39,4)
Lombardia	50,1 (42,8-57,4)	16,8 (11,4-22,1)	32,3 (27,8-36,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>51,3 (39,8-62,8)</i>	<i>12,7 (5,0-20,5)</i>	<i>30,8 (23,8-37,8)</i>
<i>Trento</i>	<i>44,1 (33,1-55,1)</i>	<i>16,3 (8,0-24,5)</i>	<i>29,6 (22,9-36,3)</i>
Veneto	45,1 (37,5-52,6)	12,2 (6,8-17,7)	28,7 (24,0-33,4)
Friuli Venezia Giulia	45,7 (35,8-55,7)	12,5 (5,4-19,7)	29,0 (22,8-35,1)
Liguria	50,9 (41,7-60,1)	16,7 (10,2-23,1)	31,7 (26,3-37,1)
Emilia-Romagna	40,8 (32,0-49,6)	17,4 (10,8-24,0)	28,3 (23,0-33,5)
Toscana	49,3 (41,7-56,9)	11,6 (6,7-16,5)	29,5 (24,8-34,2)
Umbria	38,3 (27,7-48,9)	13,1 (5,3-20,8)	25,4 (19,1-31,7)
Marche	46,7 (37,7-55,6)	6,1 (1,2-10,9)	26,0 (20,7-31,4)
Lazio	31,9 (23,8-40,0)	11,5 (6,2-16,7)	20,6 (16,1-25,2)
Abruzzo	51,4 (41,4-61,4)	8,4 (2,5-14,4)	29,3 (23,1-35,5)
Molise	50,0 (37,2-62,7)	9,8 (2,7-17,0)	27,4 (20,1-34,7)
Campania	37,2 (29,1-45,4)	10,6 (5,5-15,8)	23,4 (18,6-28,2)
Puglia	43,9 (35,3-52,5)	4,7 (0,5-8,8)	24,0 (18,9-29,1)
Basilicata	52,4 (40,9-63,8)	*	27,0 (20,2-33,7)
Calabria	33,8 (24,1-43,4)	8,9 (2,4-15,4)	21,6 (15,7-27,4)
Sicilia	27,5 (19,9-35,1)	7,8 (3,1-12,5)	17,2 (12,9-21,5)
Sardegna	46,2 (36,2-56,1)	9,0 (3,3-14,8)	26,1 (20,3-31,9)
<b>Italia</b>	<b>42,9 (40,6-45,3)</b>	<b>11,6 (10,1-13,2)</b>	<b>26,5 (25,1-27,9)</b>

\*Dato non attendibile

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 6 - Prevalenza (per 100) di consumatori a rischio (criterio ISS) della classe di età 75 anni ed oltre per genere e regione - Anno 2012**

<b>Regioni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Piemonte	40,7 (31,9-49,6)	10,1 (5,7-14,5)	21,5 (17,2-25,8)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	36,5 (22,2-50,7)	21,2 (10,9-31,5)	27,6 (19,6-35,5)
Lombardia	42,3 (33,4-51,3)	14,7 (9,6-19,7)	25,0 (20,5-29,6)
<i>Bolzano-Bozen</i>	35,9 (22,2-49,6)	14,5 (6,1-22,8)	23,0 (15,8-30,2)
<i>Trento</i>	38,7 (23,7-53,8)	10,2 (3,1-17,3)	20,2 (13,2-27,2)
Veneto	46,1 (35,4-56,9)	10,6 (5,7-15,5)	22,6 (17,6-27,5)
Friuli Venezia Giulia	47,9 (37,4-58,4)	9,0 (4,1-13,8)	23,1 (18,0-28,2)
Liguria	40,0 (30,8-49,1)	11,0 (6,0-16,0)	22,4 (17,8-27,0)
Emilia-Romagna	43,0 (33,3-52,7)	9,6 (4,6-14,5)	22,8 (17,8-27,7)
Toscana	35,1 (26,3-43,8)	10,1 (5,7-14,5)	19,5 (15,2-23,8)
Umbria	44,0 (32,8-55,3)	6,6 (1,7-11,5)	20,8 (15,4-26,1)
Marche	47,1 (35,5-58,7)	6,8 (2,0-11,6)	21,3 (15,8-26,8)
Lazio	29,7 (20,8-38,5)	7,9 (3,5-12,4)	16,5 (12,2-20,9)
Abruzzo	41,3 (30,0-52,7)	4,1 (0,2-8,1)	18,3 (12,9-23,7)
Molise	50,3 (39,2-61,5)	14,9 (7,9-22,0)	29,8 (23,4-36,2)
Campania	36,3 (25,4-47,3)	4,7 (1,0-8,5)	16,0 (11,1-20,9)
Puglia	38,3 (28,6-48,0)	*	16,1 (11,8-20,5)
Basilicata	43,4 (30,9-56,0)	11,8 (4,8-18,8)	24,5 (17,9-31,1)
Calabria	26,5 (16,4-36,6)	*	11,2 (6,9-15,6)
Sicilia	18,5 (10,8-26,2)	4,1 (0,7-7,4)	9,6 (6,1-13,1)
Sardegna	37,6 (25,6-49,7)	5,8 (0,6-11,0)	18,7 (12,7-24,6)
<b>Italia</b>	<b>37,7 (34,9-40,4)</b>	<b>8,7 (7,4-10,0)</b>	<b>19,6 (18,3-21,0)</b>

\*Dato non attendibile

**Fonte dei dati:** Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e del WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2013.

**Tabella 1 - Prevalenza (per 100) di persone della classe di età 18 anni ed oltre in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2013**

<b>Regioni</b>	<b>Sovrappeso</b>	<b>Obesità</b>
Piemonte	33,1 (32,3-33,9)	8,3 (7,8-8,8)
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	32,1 (30,6-33,6)	11,3 (10,2-12,4)
Lombardia	31,8 (31,1-32,5)	10,2 (9,8-10,7)
<i>Bolzano/Bozen</i>	<i>32,3 (31,0-33,6)</i>	<i>6,8 (6,1-7,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>34,5 (33,2-35,6)</i>	<i>8,8 (7,9-9,5)</i>
Veneto	34,5 (33,7-35,4)	10,6 (10,0-11,2)
Friuli Venezia Giulia	35,6 (34,5-36,7)	10,2 (9,5-11,1)
Liguria	31,6 (30,6-32,6)	9,6 (8,9-10,3)
Emilia-Romagna	34,3 (33,3-35,3)	10,7 (10,0-11,4)
Toscana	35,1 (34,1-36,0)	10,0 (9,4-10,6)
Umbria	34,7 (33,6-35,9)	11,1 (10,3-11,9)
Marche	34,5 (33,4-35,5)	9,8 (9,1-10,5)
Lazio	35,7 (34,8-36,6)	9,9 (9,3-10,5)
Abruzzo	35,3 (34,3-36,2)	12,1 (11,4-12,8)
Molise	38,9 (38,1-40,0)	12,7 (12,0-13,3)
Campania	41,6 (40,8-42,3)	10,3 (9,8-10,8)
Puglia	39,2 (38,4-40,0)	12,0 (11,4-12,5)
Basilicata	38,5 (37,1-39,8)	14,2 (13,3-15,3)
Calabria	37,5 (36,6-38,5)	10,5 (9,9-11,2)
Sicilia	39,1 (38,3-40,0)	10,8 (10,3-11,4)
Sardegna	32,9 (31,8-33,8)	9,9 (9,3-10,6)
<b>Italia</b>	<b>35,5 (35,2-35,7)</b>	<b>10,3 (10,1-10,5)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2014

**Tabella 2 - Prevalenza (per 100) di persone in sovrappeso ed obese per genere e classe di età - Anno 2013**

<b>Classi di età</b>	<b>Persone in sovrappeso</b>			<b>Persone obese</b>		
	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
18-24	20,1 (19,1-21,1)	10,0 (9,2-10,8)	15,1 (14,5-15,7)	2,6 (2,1-3,1)	2,3 (1,9-2,7)	2,5 (2,2-2,8)
25-34	33,0 (32,8-33,2)	15,1 (15,0-15,3)	24,2 (24,1-24,3)	6,0 (5,9-6,1)	3,8 (3,7-3,9)	4,9 (4,8-5,0)
35-44	42,9 (41,9-43,9)	20,4 (19,6-21,3)	31,6 (31,0-32,3)	10,7 (10,0-11,4)	5,8 (5,3-6,4)	8,3 (7,8-8,7)
45-54	50,6 (50,3-50,9)	26,9 (26,6-27,2)	38,4 (38,2-38,6)	12,3 (12,1-12,5)	9,5 (9,3-9,7)	10,8 (10,7-11,0)
55-64	51,9 (51,5-52,2)	33,9 (33,6-34,3)	42,8 (42,6-43,0)	16,9 (16,6-17,2)	12,1 (11,9-12,4)	14,5 (14,3-14,7)
65-74	52,5 (51,5-53,6)	41,0 (40,0-42,0)	46,4 (45,8-47,1)	17,9 (17,0-18,7)	15,1 (14,4-15,9)	16,4 (15,9-17,0)
75 ed oltre	49,3 (48,6-50,1)	39,9 (39,3-40,4)	43,5 (43,1-43,9)	10,8 (10,3-11,3)	14,0 (13,6-14,4)	12,8 (12,5-13,1)
<b>Totale</b>	<b>44,1 (43,9-44,3)</b>	<b>27,5 (27,4-27,7)</b>	<b>35,5 (35,4-35,6)</b>	<b>11,5 (11,3-11,6)</b>	<b>9,3 (9,1-9,4)</b>	<b>10,3 (10,2-10,4)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2014

**Tabella 1 – Prevalenza (per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che praticano sport o attività fisica per regione - Anno 2013**

<b>Regioni</b>	<b>Sport in modo continuativo</b>	<b>Sport in modo saltuario</b>	<b>Qualche attività fisica</b>	<b>Nessuno sport</b>	<b>Non indicato</b>
Piemonte	19,4 (18,8-20,1)	10 (9,5-10,5)	35,1 (34,3-35,8)	35,3 (34,5-36,0)	0,2 (0,1-0,3)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	28,1 (26,7-29,3)	12,0 (11,0-13,0)	28,0 (26,7-29,3)	31,0 (29,9-32,5)	n.a.
Lombardia	26,1 (25,4-26,7)	10,3 (9,9-10,8)	29,9 (29,2-30,5)	33,4 (32,7-34,0)	0,4 (0,3-0,5)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>34,4 (33,2-35,5)</i>	<i>18,0 (17,0-19,0)</i>	<i>32,5 (31,4-33,7)</i>	<i>14,1 (13,2-15,1)</i>	<i>0,9 (0,5-1,1)</i>
<i>Trento</i>	<i>25,8 (24,7-26,8)</i>	<i>17,6 (16,7-18,6)</i>	<i>40,7 (39,5-41,8)</i>	<i>15,9 (15,0-16,8)</i>	<i>n.a.</i>
Veneto	26,9 (26,2-27,6)	11,2 (10,6-11,7)	37,4 (36,6-38,2)	24,4 (23,7-25,2)	0,1 (0,0-0,2)
Friuli Venezia Giulia	26,8 (25,8-27,8)	12,1 (11,4-12,9)	32,6 (31,5-33,6)	28,4 (27,4-29,4)	0,2 (0,0-0,3)
Liguria	21,0 (20,2-21,9)	6,8 (6,2-7,3)	29,2 (28,3-30,1)	42,8 (41,8-43,7)	0,2 (0,1-0,3)
Emilia-Romagna	26,1 (25,2-27,0)	10,0 (9,3-10,6)	32,6 (31,7-33,5)	31,2 (30,3-32,1)	0,1 (0,0-0,2)
Toscana	24,3 (23,6-25,2)	9,0 (8,5-9,6)	29,3 (28,5-30,2)	37,0 (36,2-37,9)	0,3 (0,1-0,4)
Umbria	21,4 (20,4-22,3)	10,0 (9,3-10,7)	28,0 (27,0-29,0)	40,7 (39,6-41,8)	n.a.
Marche	23,7 (22,8-24,6)	9,6 (8,9-10,2)	31,0 (30,0-31,9)	35,5 (34,5-36,5)	0,3 (0,1-0,4)
Lazio	24,0 (23,2-24,7)	8,5 (8,0-9,0)	23,3 (22,6-24,1)	43,8 (42,9-44,6)	0,4 (0,3-0,5)
Abruzzo	20,0 (19,3-20,7)	7,3 (6,8-7,8)	27,9 (27,1-28,8)	44,3 (43,4-45,2)	0,4 (0,3-0,6)
Molise	17,9 (17,4-18,8)	6,1 (5,7-6,6)	25,2 (24,4-25,9)	50,7 (49,8-51,5)	n.a.
Campania	12,7 (12,2-13,2)	6,2 (5,8-6,6)	21,1 (20,5-21,7)	59,6 (58,9-60,3)	0,4 (0,3-0,5)
Puglia	17,2 (16,6-17,8)	8,2 (7,8-8,7)	19,7 (19,1-20,3)	54,3 (53,6-55,0)	0,6 (0,5-0,7)
Basilicata	17,5 (16,6-18,6)	7,2 (6,5-7,9)	23,9 (22,8-25,0)	51,2 (50,1-52,5)	0,2 (0,0-0,4)
Calabria	14,3 (13,7-15,0)	6,6 (6,2-7,1)	26,3 (25,5-27,1)	52,4 (51,5-53,2)	0,3 (0,2-0,4)
Sicilia	13,1 (12,6-13,6)	8,1 (7,7-8,6)	19,1 (18,5-19,7)	59,3 (58,6-60,1)	0,3 (0,2-0,5)
Sardegna	22,1 (21,3-22,9)	8,7 (8,1-9,2)	30,5 (29,6-31,4)	38,6 (37,6-39,5)	0,2 (0,1-0,3)
<b>Italia</b>	<b>21,5 (21,3-21,7)</b>	<b>9,1 (9,0-9,3)</b>	<b>27,9 (27,7-28,1)</b>	<b>41,2 (40,9-41,4)</b>	<b>0,3 (0,2-0,3)</b>

n.a. = non applicabile.

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2014.

**Tabella 2 – Prevalenza (per 100) di persone che praticano sport o attività fisica per genere e classe di età - Anno 2013**

Classi di età	Sport in modo continuativo	Sport in modo saltuario	Qualche attività fisica	Nessun sport	Non indicato
<b>MASCHI</b>					
3-5	20,3 (18,6-21,9)	4,1 (3,1-4,9)	22,0 (20,3-23,7)	50,6 (48,6-52,5)	3,0 (2,2-3,8)
6-10	58,1 (57,8-58,4)	6,3 (6,0-6,4)	12,6 (12,4-12,9)	22,4 (22,1-22,7)	0,6 (0,6-0,7)
11-14	61,8 (60,6-62,9)	8,9 (8,2-9,6)	14,7 (13,8-15,6)	14,5 (13,6-15,3)	0,1 (0,0-0,3)
15-17	54,4 (51,8-57,0)	12,5 (10,6-14,4)	15,7 (13,7-17,8)	17,3 (15,2-19,5)	0,1 (0,1-0,4)
18-19	43,8 (42,7-45,1)	16,9 (16,0-17,9)	18,7 (17,6-19,6)	20,6 (19,6-21,6)	n.a.
20-24	41,6 (41,0-42,2)	18,0 (17,5-18,6)	17,1 (16,6-17,6)	23,1 (22,6-23,7)	0,1 (0,1-0,2)
25-34	33,8 (33,5-34,2)	16,0 (15,7-16,3)	20,1 (19,8-20,4)	30,0 (29,7-30,4)	0,1 (0,0-0,1)
35-44	25,4 (24,6-26,1)	14,5 (13,9-15,1)	25,0 (24,2-25,7)	34,8 (34,0-35,5)	0,4 (0,2-0,5)
45-54	19,7 (19,3-20,1)	12,2 (11,9-12,6)	28,6 (28,2-29,1)	39,3 (38,8-39,8)	0,2 (0,1-0,2)
55-59	15,0 (13,8-16,2)	10,2 (9,2-11,2)	33,5 (32,0-34,9)	41,2 (39,7-42,7)	0,1 (0,1-0,3)
60-64	13,9 (12,9-14,9)	8,4 (7,6-9,3)	38,8 (37,5-40,1)	38,8 (37,4-40,1)	0,1 (0,1-0,2)
65-74	9,8 (9,4-10,1)	7,3 (7,0-7,6)	40,1 (39,6-40,7)	42,5 (42,0-43,1)	0,2 (0,2-0,3)
75 ed oltre	4,8 (4,4-5,2)	2,5 (2,2-2,8)	29,7 (29,0-30,5)	62,8 (62,0-63,5)	0,2 (0,1-0,4)
<b>Totale</b>	<b>26,0 (25,7-26,3)</b>	<b>11,1 (10,9-11,3)</b>	<b>26,4 (26,1-26,7)</b>	<b>36,2 (35,9-36,6)</b>	<b>0,3 (0,3-0,3)</b>
<b>FEMMINE</b>					
3-5	20,5 (18,8-22,1)	3,3 (2,5-4,1)	23,8 (22,1-25,5)	49,7 (47,8-51,7)	2,8 (2,1-3,6)
6-10	49,3 (48,9-49,6)	5,2 (5,1-5,4)	17,8 (17,5-18,0)	27,2 (26,9-27,5)	0,6 (0,5-0,7)
11-14	46,6 (45,3-47,8)	7,6 (6,8-8,3)	21,3 (20,2-22,3)	24,2 (23,0-25,2)	0,4 (0,2-0,7)
15-17	37,1 (34,4-40,0)	9,3 (7,4-11,1)	25,3 (22,8-27,9)	28,2 (25,6-30,9)	n.a.
18-19	27,0 (25,9-28,2)	12,4 (11,4-13,2)	25,8 (24,8-27,0)	34,5 (33,4-35,8)	0,3 (0,0-0,4)
20-24	24,3 (23,7-24,8)	13,7 (13,2-14,1)	29,4 (28,9-30,0)	32,6 (32,0-33,2)	*
25-34	20,2 (19,9-20,5)	10,3 (10,1-10,6)	29,7 (29,4-30,1)	39,7 (39,4-40,1)	*
35-44	16,7 (16,1-17,4)	10,4 (9,8-10,9)	31,2 (30,5-32,0)	41,6 (40,8-42,3)	0,1 (0,0-0,2)
45-54	13,9 (13,5-14,3)	8,5 (8,2-8,8)	36,0 (35,5-36,4)	41,3 (40,8-41,8)	0,2 (0,2-0,3)
55-59	12,6 (11,5-13,7)	6,8 (5,9-7,7)	36,8 (35,3-38,2)	43,6 (42,1-45,1)	0,3 (0,0-0,5)
60-64	11,7 (10,7-12,6)	5,6 (4,9-6,3)	37,6 (36,3-38,9)	44,6 (43,3-45,9)	0,5 (0,2-0,7)
65-74	7,8 (7,5-8,1)	3,7 (3,5-4,0)	32,5 (32,0-33,0)	55,7 (55,3-56,2)	0,2 (0,1-0,2)
75 ed oltre	2,9 (2,6-3,1)	1,2 (1,0-1,3)	16,8 (16,3-17,3)	78,6 (78,1-79,1)	0,5 (0,4-0,6)
<b>Totale</b>	<b>17,2 (17,0-17,5)</b>	<b>7,3 (7,1-7,5)</b>	<b>29,4 (29,1-29,7)</b>	<b>45,8 (45,5-46,1)</b>	<b>0,3 (0,3-0,4)</b>
<b>TOTALE</b>					
3-5	20,4 (19,3-21,5)	3,7 (3,1-4,2)	22,9 (21,7-24,0)	50,1 (48,8-51,4)	2,9 (2,4-3,5)
6-10	53,8 (53,6-54,0)	5,7 (5,6-5,9)	15,1 (15,0-15,3)	24,7 (24,6-24,9)	0,6 (0,6-0,6)
11-14	54,5 (53,7-55,3)	8,3 (7,8-8,7)	17,8 (17,2-18,5)	19,1 (18,4-19,8)	0,3 (0,2-0,4)
15-17	46,3 (44,4-48,1)	11,0 (9,7-12,2)	20,2 (18,7-21,8)	22,5 (20,9-24,1)	*
18-19	35,8 (35,1-36,6)	14,8 (14,1-15,3)	22,1 (21,4-22,8)	27,2 (26,4-27,9)	0,1 (0,0-0,2)
20-24	33,0 (32,6-33,3)	15,8 (15,5-16,2)	23,3 (22,9-23,6)	27,8 (27,5-28,2)	0,1 (0,0-0,1)
25-34	27,1 (26,9-27,3)	13,2 (13,0-13,4)	24,9 (24,6-25,1)	34,8 (34,6-35,1)	*
35-44	21,0 (20,6-21,5)	12,4 (12,1-12,8)	28,1 (27,6-28,6)	38,2 (37,6-38,7)	0,2 (0,2-0,3)
45-54	16,7 (16,4-17,0)	10,3 (10,1-10,6)	32,4 (32,1-32,7)	40,3 (40,0-40,7)	0,2 (0,2-0,3)
55-59	13,8 (13,0-14,5)	8,5 (7,9-9,1)	35,1 (34,2-36,1)	42,4 (41,4-43,4)	0,2 (0,1-0,3)
60-64	12,8 (12,1-13,4)	7,0 (6,5-7,5)	38,2 (37,3-39,1)	41,8 (40,9-42,6)	0,3 (0,1-0,4)
65-74	8,7 (8,5-9,0)	5,4 (5,3-5,6)	36,1 (35,8-36,4)	49,5 (49,2-49,9)	0,2 (0,2-0,2)
75 ed oltre	3,6 (3,4-3,8)	1,7 (1,5-1,8)	21,8 (21,4-22,2)	72,5 (72,1-72,9)	0,4 (0,3-0,5)
<b>Totale</b>	<b>21,5 (21,3-21,6)</b>	<b>9,1 (9,0-9,3)</b>	<b>27,9 (27,7-28,1)</b>	<b>41,2 (41,0-41,4)</b>	<b>0,3 (0,3-0,3)</b>

n.a. = non applicabile.

\*Dato non attendibile.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2014.